

معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ باروش لاپاروسکوپی

فاطمه فروزانفر*، دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه براتی، دانشجوی سال چهارم دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
کامران شریفی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا دوازده امامی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

تکنیک دو مرحله‌ای: مرحله اول در حالت ایستاده گودی paralombar چپ و سه دنده آخر استریل می‌شوند. دو شکاف زده کانول تروکار داخل گودی تهیگاهی قرار گرفته، laparoscope را داخل canula گذاشته اکتشاف در حفره شکمی انجام می‌شود. Toggle bar در شیردان گذاشته می‌شود. toggle bar از بین تروکار گذشته وارد مجرای شیردان می‌شود. سپس laparoscope و toggle bar را برداشته و بخیه می‌زنیم. در مرحله دوم حیوان را به پشت خوابانده ناحیه paramedian راست استریل می‌شود. laparoscope و forceps داخل پورتال گذاشته سپس شیردان در موقعیت آناتومیکی درست قرار می‌گیرد، laparoscope و cannula را برداشته و بخیه می‌زنیم. تکنیک یک مرحله‌ای: حیوان را به پشت خوابانده و سه شکاف در موقعیت‌های (۲cm چپ ناف، ۵cm به راست و ۳cm به جلوی ناف، ۳cm به عقب و ۷cm به راست زائده خنجری جناغ) ایجاد می‌کنیم. موقعیت شیردان را با forceps مشخص کرده شیردان را از قسمت میانی خم بزرگ گرفته سوزن را وارد ماهیچه‌های شکم کرده با کشیدن نخ بخیه به طرف دیواره شکم، شیردان جا افتاده و موضع بخیه می‌شود. این روشها برای اصلاح LDA، کاهش عوارض بیماری و کاهش دورریختن شیرمناسب می‌باشد و باعث کم شدن زمان و هزینه جراحی و کاهش زمان التیام می‌شوند.