

بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان

*سارا وکیلیان^۱، دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی^۲، دکتر سید محمود طباطبائی^۲

^۱کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، استادیار گروه روان شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد،

^۲آستاد گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خلاصه

مقدمه: انسان موجودی اجتماعی است و با دیگر همتوغان خود در جامعه رابطه برقار می کند، بنابراین وجود هراس اجتماعی در برخورده ارتباط با دیگر اعضای جامعه برای وی مشکلات زیادی را به همراه می آورد. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان انجام پذیرفت.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی) می باشد. آزمودنی ها پس از انجام مصاحبه ای بالینی ساخت یافته بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی (ویرایش چهارم) و اجرای آزمون هراس و اضطراب اجتماعی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (۱۳ نفر برای هر گروه) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش با مداخله ای تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری (GCBT) و آموزش مهارت های اجتماعی (SST) و گروه کنترل (گروه درمانی شناختی رفتاری) قرار گرفتند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه ای (سه ماه و هفتة ای یک جلسه دو ساعته) درمان در گروه ها، به منظور سنجش متغیر وابسته (هراس اجتماعی)، مجددا آزمون هراس و اضطراب اجتماعی به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد.

نتایج: نتایج تحلیل های آماری آزمون ^t نشان داد که افزودن گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی رفتاری سبب کاهش معنی دار هراس اجتماعی (با ارزش معناداری $P < 0.001$) در دانشجویان می گردد.

بحث: با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود مولفه ای آموزش مهارت های اجتماعی به درمان های رایج هراس اجتماعی افزوده گردد.

واژه های کلیدی: گروه درمانی شناختی رفتاری، مهارت های اجتماعی، هراس اجتماعی، دانشجویان

مقدمه

تجربه ای اضطراب در موقعیت های اجتماعی نادر نیست، اما معمولاً این اضطراب آن قدر شدید نیست و حتی ممکن است عملکرد فرد را ارتقا بخشد. اما در برخی از افراد اضطراب حین حضور در موقعیت های اجتماعی آن قدر زیاد می شود که حتی هنگام پیش بینی مواجهه با این موقعیت ها نیز شدیداً مضطرب شده (۱) و ممکن است نشانه های فیزیولوژیک (۲)، نشانه های شناختی و نشانه های هیجانی را از خود نشان دهند (۳).

انسان در تمام دوران تاریخ برای برآورده ساختن نیازهای مختلف (به ویژه نیازهای روانی) به همتوغان خود نیازمند بوده و زندگی اجتماعی را برگزیده است. به این منظور فرد باید بدون ترس از انتقاد، طرد یا ارزیابی دیگران وارد موقعیت های جمعی شود و خود را به عنوان یک انسان ارزشمند بداند.

^۱آدرس مولف مسئول: ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی، داشکده علوم تربیتی

تلفن تماس: ۰۵۱۱-۸۷۸۳۰۰۸

Email: saravakilian@yahoo.com

تاریخ ثاید: ۸۷/۳/۲۶

تاریخ وصول: ۸۶/۱۲/۲۳

آن بسیار اندک است و با توجه به نقش مهم این اختلال در عملکرد اجتماعی و شخصی فرد، درمان هراس اجتماعی به منظور کاهش مشکلات فردی و ارتباطی ایشان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. هم چنین از آن جایی که قشر بزرگی از جامعه‌ی ما را دانشجویان تشکیل می‌دهند که بیشتر از دیگران با فعالیت‌های اجتماعی از قبیل سخنرانی در جمیع فعالیت‌در حضور دیگران و ... سر و کار دارند، به کار بردن شیوه‌های درمانی کارآمد و متناسب با سطح شناخت، آگاهی و شرایط فکری دانشجویان مفید به نظر می‌رسد.

در زمینه‌ی درمان این اختلال هم روان درمانی و هم دارو درمانی کاربرد دارند^(۲). در میان رویکردهای روان شناختی به کار گرفته شده برای درمان هراس اجتماعی، کارآمدی^۳ درمان‌های رفتاری و شناختی رفتاری مورد تایید قرار گرفته و از این بین گروه درمانی شناختی رفتاری توسط هیمبرگ و همکاران ابداع و به عنوان یک روش درمانی تایید شده‌ی تجزیی به کار گرفته شده است (هیمبرگ و بارلو، ۱۹۹۱؛ به نقل از ۱۱). گروه درمانی شناختی رفتاری چرخه‌ی معیوب^۴ اضطراب اجتماعی را هم در فضای درمان و هم در دنیای مراجع از طریق بازسازی شناختی و تکنیک‌های مواجهه می‌شکند. این روش دارای سه مولفه‌ی بنیادی است که عبارتند از: ۱- مواجهه‌ی درون جلسات با موقعیت‌های ترس آور اجتماعی.

۲- بازسازی شناختی.

۳- قرارداد تکلیف خانگی، به منظور مواجهه‌ی واقعی و بازسازی شناختی تحت کنترل خود (بیمار، ۱۲). بازسازی شناختی (در شناخت درمانی) نقشی مهم در شکستن چرخه‌ی اضطراب اجتماعی بازی می‌کند^(۱۳)، هم چنین امکان چالشی مستقیم با باورها، فرضیات و انتقالات مراجعتان را فراهم می‌کند و به این ترتیب به افراد کمک می‌کند باورهای منفی خود را به وسیله‌ی توجه به تفسیرهای جایگزین و آزمون کردن شواهد در حمایت یاراد افکار "خود به خودی" منفی شان تغییر دهند^(۱۴).

هراس اجتماعی که آن را اختلال اضطراب جمع^۱ نیز می‌خوانند (۴) از دیگر انواع هراس‌ها پیچیده‌تر است چون بر پایه‌ی ترس از رویدادهای غیر قابل مشاهده مانند ارزیابی منفی، انتقاد و ... بوده و افکار ناراحت کننده نقش مهمی در این اختلال دارند^(۳). این سبک شناختی نه تنها به وحشت اضطراب اجتماعی شدت می‌بخشد بلکه در تداوم این اختلال نیز نقشی مهم ایفا کرده و بر جنبه‌های مختلف زندگی آن‌ها تأثیر داشته و عملکرد فرد را از سطح مورد انتظار و بهینه تنزل می‌دهد^(۵,۶,۷).

هراس اجتماعی معمولاً در اوایل دوره‌ی کودکی و اوایل نوجوانی (۱۰-۲۰ سالگی) شروع می‌شود. سیر اختلال اغلب پیوسته و مزمن است که می‌تواند در طی سالیان متعدد مشکلات عمیقی در زندگی فرد مبتلا ایجاد نماید^(۴,۶,۷).

شیوه مادام عمر این اختلال طبق گزارش‌های موجود بین ۱۳-۲۳٪ بیان شده است. در درمانگاه‌های سرپایی میزان هراس اجتماعی بین ۱۰-۲۰٪ افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی است^(۶). متوسط عمر این اختلال ۲۰ سال بوده و بهبود خود به خودی آن غیرمحتمل است (لکروبری، ۱۹۹۸؛ به نقل از ۸). مطالعات همه گیر شناسی نشان می‌دهد که تنها یک چهارم مبتلایان بهبود می‌یابند. ضمن آن که بهبودی در بیماران با تحصیلات بالاتر، سن شروع بالاتر و بدون همراهی با اختلالات روانی دیگر بیشتر است. بیماران بزرگسال مبتلا به هراس اجتماعی، نفایص جدی در مسائل اجتماعی، شغلی و تحصیلی دارند، هم چنین هراس اجتماعی با مشکلات تحصیلی و شغلی شامل استخدام نشدن و افت تحصیلی همراه است (استین و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از ۹). ۱۷٪ از افراد دارای هراس اجتماعی دچار افت عملکرد تحصیلی شده‌اند، ۹۵٪ مشکلاتی در زمینه‌ی شغلی پیدا کرده‌اند، ۵۹٪ در عملکرد اجتماعی دچار آسیب فرآیند و ۵۰٪ افراد مجرد از لحاظ عملکرد اجتماعی متناسب با جنسیت خود دچار محدودیت بوده‌اند^(۱۰). با توجه به این که این اختلال بسیار فرآیند و ناتوان کننده در سین اوج استقلال طلبی فرد بروز کرده و بهبود خود به خودی

^۳. Efficacy

^۴. Vicious Cycle

^۱. Social Anxiety Disorder

^۲. Leikrobier

تا ارتباطات خود را بهبود ببخشد، با دیگران آسان تر رفت و آمد کند و نیز اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد (کینگزرس گ^۸، ۲۰۰۵، به نقل از ۱۴). در مهارت آموختی، درمان گران معمولاً رفتارهای اجتماعی مناسب را به عنوان الگو قرار می دهند و مراجعان شان را تشویق می کنند که آن ها را در خارج از محیط درمان اجرا کنند.

یکی از دلایل به کار گیری آموزش مهارت های اجتماعی در درمان اختلال هراس اجتماعی این است که این اختلال همراه با ناتوانی در عملکرد اجتماعی می باشد که ممکن است حداقل در برخی از افراد، بازتابی از کمبودهای مهارتی واقعی باشد (مثلًا ناتوانی در عملکرد مناسب در بافت اجتماعی خاص). اگر چه یک اتفاق نظر کلی و عمومی وجود دارد که رفتارهای اجتماعی شخص دارای اختلال اضطراب اجتماعی تا حدی ضعیف است، با این وجود، نویسندهای متعددی متذکر شده اند که لزوماً این ناتوانی، بازنمودن کمبودهای مهارتی پایه ای نمی باشد (هربرت^۹، ۱۹۹۵؛ نورتن^{۱۰} و هوپ، ۲۰۰۱، به نقل از ۱۷).

در نهایت با توجه به قابلیت اعطاف پذیری این رویکرد، این طور به نظر می رسد که تلفیق آموزش مهارت های اجتماعی برای افرادی که کمبود مهارت های پایه ای دارند، می تواند موثر باشد و اضطراب و اجتناب شان را کاهش دهد و همین طور برای افرادی که کمبود مهارت های پایه نیز نداشته باشند می تواند به عنوان تسهیل گری برای افزایش خودکارآمدی، توانایی مقابله با اضطراب و اجتناب اجتماعی عمل کند (۱۶، ۱۸). در نتیجه، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر افزودن روش آموزش مهارت های اجتماعی به روش درمانی گروه درمانی شناختی رفتاری و مقایسه ای اثربخشی این روش تلفیقی با به تنها بی درمان اختلال هراس اجتماعی، انجام پذیرفت.

مواجهه های درون جلسات از طریق ایفای نقش انجام می پذیرد که امکان انجام مواجهه ای باشد مناسب و در محیط کمتر مخاطره آمیز و کنترل شده ای تحت نظارت درمان گر را به مراجعان می دهد. مواجهه در فاصله ای بین جلسات از طریق موقعیت های اجتماعی واقعی و طبق قرارداد تکلیفی تعیین شده صورت می گیرد. هدف نهایی این نکالیف این است که هر مراجعتی، درمان گر شناختی رفتاری خود باشد و هر فردی به گونه ای مجهز شود که بتواند در حال و آینده به طور سازگارانه ای با موقعیت های هراس آور رویرو شود (۱۱، ۱۴).

با وجود این که مطالعات متعددی اثربخشی درمان گروهی و فردی شناختی رفتاری را ثابت کرده اند (چامبلس^۱ و همکاران، ۱۹۹۷؛ هوپ و همکاران^۲، ۱۹۹۵؛ وودی و ادسکی^۳، ۲۰۰۴)، به نقل از ۱۵)، این درمان منجر به بهبودی در همه می بیماران نشده است و حتی در میان افرادی که جواب داده است برخی از نشانه ها و علایم در طی فرآیند درمان برطرف نشده است (۱۵).

یکی از روش های بهبود بخشیدن کارآمدی گروه درمانی شناختی رفتاری، اضافه کردن مولفه های روان درمانی های دیگر از قبیل آموزش مهارت های اجتماعی به این روش درمانی می باشد (۱۶).

سابقه ای طولانی اجتناب اجتماعی ممکن است استفاده ای شخص از فرصت های خود برای یادگیری مهارت های اجتماعی مناسب را محدود کند. در نتیجه، آموزش مهارت های اجتماعی برای برخی از افراد دارای هراس اجتماعی می تواند مفید باشد.

مهارت های اجتماعی که در خلال این درمان آموزش داده می شوند عبارتند از: ابراز وجود، تماس چشمی^۴، ارتباط کلامی و غیرکلامی^۵، جرات ورزی^۶، کنترل خشم و پرداختن به تعارضات^۷. این آموزش ها به افراد کمک می کند

^۱. Chambless

^۲. Hope

^۳. Woody, Adessky

^۴. Eye Contact

^۵. Verbal-NonVerbal Communication

^۶. Assertiveness

^۷. Dealing with Conflicts

^۸. Kingsberg

^۹. Herbert

^{۱۰}. Norton

روش کار

کردن (اصل رازداری). هم چنین به منظور تایید همگن و معادل بودن نمرات پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل، از آزمون α مستقل بین نمرات پیش آزمون هراس اجتماعی دو گروه استفاده شد. به این ترتیب، تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس هراس اجتماعی وجود ندارد و دو گروه در مرحله پیش آزمون همگن بودند ($P = 0.841$). هر دو گروه با تعداد اعضا ۱۳ نفر (در هر گروه دو نفر ریزش اولیه وجود داشت و در نتیجه نتایج به دست آمده از ۱۱ آزمودنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت)، یک درمان گر زن و یک کمک درمان گر مرد (هر دو کارشناس ارشد روان شناسی بالینی)، آغاز به کار کردند. تعداد جلسات ۱۲ جلسه‌ی (۳ ماه در هفته یک جلسه) حدوداً ۲ ساعته بود و مکان تشکیل گروه در اتاق مخصوص گروه درمانی کلینیک دانشکده‌ی روان شناسی بود. در این اتاق میل‌ها به صورت گرد چیده شده بودند که امکان دیدن و دیده شدن تمامی اعضا و درمان گر و کمک درمان گر را فراهم کرده بود. هم چنین اتاق مجهز به ویدیو پروژکتور، دوربین مدار بسته و گوشی‌های هدفون مخصوص درمان گر و کمک درمان گر بود و به این ترتیب، تمامی جلسات گروه تحت نظر انتخاب شدند، این انتخاب پس از انجام مصاحبه‌ی بالینی ساخت یافته بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی ویرایش چهارم (SCID-I)^۱ توسط روان پژوهشک و روان شناس بالینی و غربالگری براساس نمراتشان در آزمون هراس و اضطراب اجتماعی نمره به دست آمده و توانایی شرکت در جلسات گروه به لحاظ تعداد و زمان برگزاری جلسات، انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، قرار گرفتند. اعضا هر دو گروه با اطلاع از طرح پژوهشی درمانی رضایت خود را جهت شرکت در گروه اعلام کردند. به این ترتیب تمامی اطلاعات مربوط به انجام مصاحبه‌های بالینی و نتایج تست‌های مراجعتی در پرونده‌های ایشان ثبت شده و تنها در دسترس درمان گران گروه قرار داشت. هم چنین در جلسه‌ی اول تشکیل گروه، نحوه‌ی اداره‌ی گروه (تحت نظر انتخاب سوپر وایزر) و تجهیزات مورد استفاده برای اعضا توضیح داده شد و تمامی اعضا درمان گران تعهد خود را جهت محترمانه نگه داشتن مسائل مطرح شده در گروه اعلام

به شرح زیر بود:

پژوهش حاضر جزو دسته پژوهش‌های کاربردی بوده و طرحی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی، می‌باشد.

نمونه‌ی پژوهش حاضر عبارت بودند از افرادی از جامعه‌ی آماری که به کلینیک مراجعه کرده و پس از غربالگری به وسیله‌ی انجام مصاحبه‌ی بالینی و انجام تست، ملاک‌های شرکت در گروه را دارا بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر ۲۶ نفر (۱۳ نفر در گروه آزمایش و ۱۳ نفر در گروه کنترل) و زمان برگزاری گروه‌ها از آذر تا بهمن ماه ۱۳۸۶ بود.

در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. پس از اعلان عمومی جلسات، از تمامی دانشجویان دختر و پسر متقاضی و علاقه‌مند به شرکت در گروه درمانی در کلینیک دانشکده‌ی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت نام به عمل آمد. به این ترتیب اعضا دو گروه آزمایش و کنترل (۱۳ نفر برای هر گروه)، از میان تمام مراجعه کنندگان دانشجو (۵۰ نفر) انتخاب شدند، این انتخاب پس از انجام مصاحبه‌ی بالینی ساخت یافته بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی ویرایش چهارم (SCID-I)^۱ توسط روان پژوهشک و روان شناس بالینی و غربالگری براساس نمراتشان در آزمون هراس و اضطراب اجتماعی نمره به دست آمده و توانایی شرکت در جلسات گروه به لحاظ تعداد و زمان برگزاری جلسات، انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، قرار گرفتند. اعضا هر دو گروه با اطلاع از طرح پژوهشی درمانی رضایت خود را جهت شرکت در گروه اعلام کردند. به این ترتیب تمامی اطلاعات مربوط به انجام مصاحبه‌های بالینی و نتایج تست‌های مراجعتی در پرونده‌های ایشان ثبت شده و تنها در دسترس درمان گران گروه قرار داشت. هم چنین در جلسه‌ی اول تشکیل گروه، نحوه‌ی اداره‌ی گروه (تحت نظر انتخاب سوپر وایزر) و تجهیزات مورد استفاده برای اعضا توضیح داده شد و تمامی اعضا درمان گران تعهد خود را جهت محترمانه نگه داشتن مسائل مطرح شده در گروه اعلام

¹. Structural Clinical Interview for DSM IV-axis I

در مورد یک موقعیت اضطراب زای اجتماعی، ارایه‌ی باز خورد با جهت گیری بر تکیک‌های گوش دادن فعال و هدفمند. جلسه‌ی هشتم: (الف) تحلیل منطقی باورها، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس، ایفای نقش در مورد یک موقعیت اضطراب زای اجتماعی، ارایه‌ی باز خورد با جهت گیری بر تکیک‌های صحبت کردن کار آمد و گوش دادن فعال و هدفمند.

جلسه‌ی نهم: (الف) ساخت سلسله مراتب اضطراب، باور مخالف، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس، ایفای نقش در مورد یک موقعیت اضطراب زای اجتماعی، ارایه‌ی باز خورد با جهت گیری به سمت تکیک‌های ابراز وجود و قاطعیت. جلسه‌ی دهم: (الف) تغییر ادراکی و تکیک بازداری ارادی کورتکس، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس، ایفای نقش در مورد یک موقعیت اضطراب زای اجتماعی، ارایه‌ی باز خورد با جهت گیری به سمت تکیک‌های تکمیلی ابراز وجود و قاطعیت.

جلسه‌ی یازدهم و دوازدهم: (الف) خود تنبیهی خود پاداش دهی، تغییر پایدار، بررسی و مرور کلی مباحث مطرح شده، تمرین و بحث مجدد درباره‌ی موضوعات مشکل تر برای اعضای گروه، جمع‌بندی کلی مطالب و ارایه‌ی راهکارهای تداوم بخش درمان پس از اتمام گروه، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس و ایفای نقش و باز خورد با توجه به جمع‌بندی مطالب قبلی، بررسی و مرور برنامه (جمع‌بندی نهایی)، نظرسنجی از اعضا و ارایه‌ی پیشنهادات، بررسی اهداف مراجعین در جلسه‌ی اول و میزان تحقق آن‌ها، بررسی نقاط ضعف و قوت گروه به صورت کتبی و شفاهی، آماده سازی گروه برای ختم درمان، اختتمیه، گروه کنترل تحت درمان روان‌شناسی رایج هراس اجتماعی یعنی گروه درمانی شناسی رفتاری فرار گرفتند. در گروه کنترل نیز در ۲۰ دقیقه‌ی ابتدایی هر جلسه، تکالیف جلسه‌ی قبل مورد بررسی قرار گرفته و به سوالات و مشکلات اعضا پاسخ داده می‌شد. سپس به مدت ۱ ساعت به بخش شناسنی مورد نظر هر جلسه و بازسازی شناسنی و تمرین آن با اعضا پرداخته می‌شد و پس از

جلسه‌ی اول: الف) آشنایی و معرفی اعضا و درمان گران، بیان قوانین گروه، بیان برنامه‌ی تدوین شده برای گروه، بیان مختصر مشکل و هدف هر یک از اعضا از شرکت در گروه، بررسی انتظارات مراجuhan از تابع درمان، استراحت. ب) ارایه‌ی مدل شناختی رفتاری و مدل A-B-C برای هراس اجتماعی، تعریف آرامش از طریق تصویر ذهنی هدایت شده. جلسه‌ی دوم: الف) بیان نظریه‌ی اختلال هیجانی و بازسازی شناسنی و چهار سیک تفکر توأم با خطای تمرین طبقه‌بندی باورها و فرآیند تفکر، استراحت. ب) ارایه‌ی نقش ارتباط و عناصر کلامی آن، ارایه‌ی کنفرانس^۱ و باز خورد^۲ ابتداءً توسط اعضا و سپس توسط درمان گران با جهت دهی به سمت وجه کلامی ارتباط.

جلسه‌ی سوم: الف) بررسی پیامدهای رفتاری ناشی از باورها، تمرین القای فکر، تحلیل پیکان عمودی رو به پایین، استراحت. ب) ارایه‌ی نقش عناصر غیر کلامی ارتباط، ارایه‌ی کنفرانس و باز خورد یا جهت دهی به سمت وجه غیر کلامی ارتباط.

جلسه‌ی چهارم: (الف) تحلیل پیشرفت‌هی پیکان عمودی رو به پایین، طبقه‌بندی باورها بر اساس محتوا یا کلیت، استراحت. ب) جمع‌بندی عناصر کلامی و غیر کلامی ارتباط، ارایه‌ی کنفرانس و باز خورد با توجه به وجه کلامی و غیر کلامی ارتباط. جلسه‌ی پنجم: (الف) تهیه‌ی فهرست اصلی باورها، تهیه‌ی نقشه‌های شناسنی^۳، استراحت. ب) چگونگی تاثیر انواع و اجزای ارتباط در اثر بخشی آن، ارایه‌ی کنفرانس و باز خورد با جهت دهی به سمت اجزای ارتباط.

جلسه‌ی ششم: (الف) تغییر پذیری باورها، تحلیل عینی باورها، تحلیل استاندارد باورها، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس و باز خورد با توجه به جمع‌بندی مطالب جلسات قبلی در مبحث عناصر ارتباطی، تکیک‌های صحبت کردن کار آمد.

جلسه‌ی هفتم: (الف) تحلیل کار آمدی باورها، تحلیل هماهنگی باورها، استراحت. ب) ارایه‌ی کنفرانس، ایفای نقش

¹. Lecture
². Feedback
³. Cognitive Map

هومن، ۲۰۰۰، ریس و همکاران، ۱۹۹۸، به نقل از ۱۶).

این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ی اصلی تجزیه و تحلیل آماری بر روی نمره‌ی کلی هراس اجتماعی آزمون هراس و اضطراب اجتماعی، انجام پذیرفته است. تشخیص اختلالی بر اساس نمره‌ی آزمودنی در این آزمون به این شرح است: اگر نمره‌ی هراس اجتماعی آزمودنی کمتر از ۳۴ باشد، احتمال وجود هراس اجتماعی بعید^۳ است. اگر نمره‌ی هراس اجتماعی آزمودنی بین ۳۴-۵۹ باشد، احتمال خفیف هراس اجتماعی وجود داشته و اگر این نمره بین ۷۹-۸۰ باشد، احتمال^۴ هراس اجتماعی وجود دارد و تمرات بیشتر و یا مساوی با ۸۰ امکان بالای^۵ تشخیص هراس اجتماعی را دارند (۲۰).

پایابی (اعتبار) و روایی پرسش نامه‌ی هراس و اضطراب اجتماعی: ترنر و همکاران (۱۹۸۹)، برای سنجش پایابی این پرسش نامه از روش "آزمون-آزمون مجدد" با فاصله‌ی ۲ هفته استفاده کردند و ضریب پایابی ۰/۸۶ را گزارش نمودند. هم چنین آسمان و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش پایابی برای روش همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۴-۰/۹۶ را گزارش کردند (۱۶).

بلند نظر (۱۳۸۰) برای سنجش پایابی این پرسش نامه از دو روش "همسانی درونی" و "آزمون-آزمون مجدد" با فاصله‌ی ۴ هفته بر روی نمونه‌ی ۳۷ نفری از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، استفاده کرد. ضرایب همبستگی بین دو نوبت برای خرده مقیاس هراس اجتماعی (SP): ۰/۹۵، برای خرده مقیاس گذر هراسی (AG): ۰/۹۰ و برای خرده مقیاس هراس اجتماعی - گذر هراسی (SP-AG): ۰/۹۷ می‌باشد. هم چنین برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ برای نمونه‌ی اصلی پرسش نامه (n=۳۶۵) محاسبه شد که این ضریب برای کل آزمودنی ها ۰/۹۹ به دست آمد (۲۰). هم چنین به منظور سنجش روایی این پرسش نامه،

یک استراحت ۱۰ دقیقه‌ای همراه با پذیرایی، در ۳۰ دقیقه‌ی پایانی هر جلسه به بخش رفتاری خاص هر جلسه و تمرین آن و در نهایت به جمع بندی و تکالیف مربوط به جلسه‌ی بعدی، پرداخته می‌شد.

پس از اتمام دوره‌ی ۱۲ جلسه‌ای گروه درمانی در گروه‌های آزمایشی که ۳ ماه به طول انجامید، مجدداً آزمون هراس و اضطراب اجتماعی به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسش نامه‌ی هراس و اضطراب اجتماعی و مصاحبه‌ی بالینی ساخت یافته بر اساس راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی (ویرایش چهارم) بودند.

پرسش نامه‌ی هراس و اضطراب اجتماعی، یک پرسش نامه‌ی خودسنجی است که توسط ترنر^۱ و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است. این پرسش نامه از نظر تجربی از ابزار پاسخ‌های ترکیبی ابعاد شناختی، جسمی، رفتاری و ترس اجتماعی مشتق شده است. این پرسش نامه دارای ۴۵ سؤال می‌باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی هراس اجتماعی و گذر هراسی می‌باشد. ۳۲ سؤال آن مربوط به هراس اجتماعی و ۱۳ سؤال دیگر آن برای ارزیابی گذر هراسی است. پیوستار پاسخ‌ها بر پایه‌ی طبق "هرگز، خیلی کم، کم، گاهی اوقات، زیاد، خیلی زیاد و همیشه" رتبه بندی شده است و به ترتیب نمره‌های ۰-۶ (۰-۶) بر هر پاسخ اختصاص یافته است (۲۰).

خرده مقیاس هراس اجتماعی (SP) در این تست در مقایسه با خرده مقیاس‌های تست‌های دیگر، بازنمون بهتری از نشانه‌های اختلال هراس اجتماعی می‌باشد (هربرت و همکاران، ۱۹۹۱، ریس^۲ و همکاران، ۱۹۹۸، به نقل از ۱۶). تحقیقات متعددی نیز نشان داده اند که این تست نسبت به اثرات درمانی بسیار حساس بوده و در کل در مقایسه با تست‌های دیگر طراحی شده برای این اختلال، از کارآمدی بیشتری برخوردار است (هربرت و همکاران، ۲۰۰۲؛ ۲۰۰۴).

³. Unlikely

⁴. Possible

⁵. Probable

¹. Turner

². Ries

در مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل از آزمون t برای گروه‌های مستقل، استفاده شد.

نتائج

دامنه‌ی سنج آزمودنی‌های شرکت کننده در گروه آزمایش، ۱۸-۲۳ سال و میانگین سنج ایشان، ۲۰/۷۳، دامنه‌ی سنج در گروه کنترل، ۲۵-۱۸ سال و میانگین سنج، ۴۵/۲۱ بود. هم چنین ۶ آزمودنی دختر و ۵ پسر در گروه آزمایش و ۷ آزمودنی دختر و ۴ پسر در گروه کنترل شرکت داشتند. نتایج بررسی گروهی داده‌های (پیش و پس آزمون) آزمودنی‌های گروه آزمایش و کنترل در مولفه‌ی هراس اجتماعی (SP) آزمون هراس و اضطراب اجتماعی؛ در جدول شماره (۱) آمده است.

بلند نظر (۱۳۸۰) با استفاده از آزمون "اضطراب اجتماعی" و
دو مقیاس آن یعنی: اجتناب اجتماعی و ترس از ارزش‌سیابی
منفی، روایی پرسش نامه‌ی "هراس و اضطراب اجتماعی
(SPAI)" را مورد بررسی قرار داد. ضرایب همبستگی بین
پرسش نامه‌ی اضطراب اجتماعی با خوده مقیاس‌های "هراس
اجتماعی (SP)، گذرا هراسی (AG) و هراس اجتماعی -
گذرا هراسی (SP-AG)" پرسش نامه‌ی (SPAI) به ترتیب
برآورد نا: ۰/۳۱، ۰/۳۱ و ۰/۰۳ می‌باشد (۲۰).

با توجه توزیع بهنجار جامعه‌ی آماری و فاصله‌ای بودن مقیاس متغیر اندازه‌گیری شده، برای آزمون فرضیه‌ی این پژوهش از آزمون t استفاده شد. به این منظور برای بررسی معنی‌داری تفاصل میانگین نمره‌ی هر اس اجتماعی آزمودنی‌ها

حدو١-ا- پرسه، گوهن، داده‌های نوصیفی گروه آزمایش و کنترل در پیش-پس آزمون

شناختی رفتاری و آموزش مهارت‌های اجتماعی به طور معنی داری بیش از گروه درمانی شناختی رفتاری، در کاهش هراس اجتماعی دانشجویان موثر است، از آزمون α برای گروه‌های مستقل استفاده شد.

به این ترتیب که میانگین تفاضل نمرات پیش و پس آزمون (d) آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل، در مقیاس هراس اجتماعی آزمون هراس و اضطراب اجتماعی به وسیله ی آزمون t برای گروه های مستقل با هم مقایسه شدند. نتایج در جدول شماره (۲) و نمودار شماره (۱)، آمده است.

بالاترین نمره‌ی آزمودنی‌ها در مرحله‌ی پیش-پس آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر با ۱۲۱/۳۳ و ۹۰/۷۵، به همین ترتیب برای گروه کنترل برابر با ۱۵۵/۸۶ و ۱۴۳/۰۰ می‌باشد. هم چنین پایین‌ترین نمره‌ی آزمودنی‌ها در مرحله‌ی پیش-پس آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر با ۳۷/۰۰ و ۹/۰۰، به همین ترتیب برای گروه کنترل برابر با ۴۴/۷۳ و ۳۸/۰۸ بوده و دامنه‌ی تغیرات در پیش-پس آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر با ۸۴/۳۳ و ۸۱/۷۵ و برای گروه کنترل برابر با ۱۱۱/۱۳ و ۱۰۹/۹۲ می‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌ی این پژوهش (افزودن گروه درمانی

جدول ۳- آزمون رای تعبیر معناداری هر اس اجتماعی در مولفه هر اس اجتماعی آزمون SPAI

مولده	فرواني	تفاصل	خطای میانگین	انحراف استاندارد	تفاوت میانگین ها	خطای استاندارد	درجه اي آزادی	خطای استاندارد	سنج
گروه ها	آزمایش	نی	۵/۲۷	۱۷/۶۹	۲۰/۷۴	۳/۶۸	۲۰	۳/۶۳	معناداري
			۵/۲۷	۱۷/۶۹	۲۰/۷۴	۳/۶۸	۲۰	۳/۶۳	
			۶/۹۷	۲/۱۰	۹/۱۰	۶/۱۰	۱۱	۱۱	کنترل

کنترل تنها به مفاهیم شناختی و رفتاری پرداخته شده و هیچ کدام از مباحث مربوط به آموزش مهارت‌های اجتماعی مطرح نگردد. در نتیجه می‌توان گفت که این تفاوت آماری به دست آمده، ناشی از دو روش مختلف اعمال شده‌ی درمانی بوده است.

نتایج این مطالعه همسو با مطالعه‌ی هبرت و همکاران (۲۰۰۵) می‌باشد که اظهار کردند، الحق آموزش مهارت‌های اجتماعی اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری برای اختلال هراس اجتماعی را افزایش می‌شود. هم‌چنین هبرت و همکاران (۲۰۰۲)، نتایج امیدوار کننده‌ای را برای یک برنامه‌ی درمانی کوتاه مدت (۶ هفته‌ای) به دست آوردند که در آن آموزش مهارت‌های اجتماعی همراه با بازسازی شناختی و مواجهه ساختگی به صورت انفرادی ارایه شده بود (۱۶، ۱۷).

در مطالعه‌ی مقدماتی کنترل نشده‌ی دیگری، فرانکلین^۱ و همکاران (۲۰۰۱) به نقل از (۱۷)، نتایج نوید بخشی را برای برنامه‌ی ۱۴ هفته‌ای تلفیقی از آموزش مهارت‌های اجتماعی و بازسازی شناختی گزارش کردند.

هم‌چنین در بررسی‌های متا‌آنالیز^۲ نشان داده شد که: مواجهه به تنهایی (رفتاری) و ترکیب مواجهه با بازسازی شناختی (شناختی رفتاری) موثرتر از گروه کنترل (لیست انتظار^۳) بود (فدوروف و تیلور،^۴ ۲۰۰۱؛ فسک و چامبلس،^۵ ۱۹۹۵؛ گولد^۶ و همکاران، ۱۹۹۷؛ تیلور،^۷ ۱۹۹۶ به نقل از ۲۱).

موربرگ و همکاران (۲۰۰۶) نیز، در مطالعه‌ای بر روی بیماران دارای هراس اجتماعی با شیوه‌ی گروه درمانی شناختی رفتاری فشرده^۸، کارآمدی این شیوه را نشان دادند. بعد از سه هفته از درمان، بیماران کاهش چشمگیری در اضطراب و اجتناب اجتماعی نشان دادند که این نتیجه تا پی‌گیری‌های یک سال بعد حفظ شده و در مواردی بهبودی بیشتر نیز مشاهده شد (۲۱).

¹. Franklin


². Meta Analytic

³. Waiting List

⁴. Fedoroff, Taylor

⁵. Gould

⁶. Intensive Group Cognitive Behavior Therapy (IGCBT)



نمودار ۱- نمودار مستونی مقایسه‌ی پیش - پس آزمون هراس اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل

با توجه به نتایج جدول شماره (۲)، ارزش معناداری $P=0.002$ به دست آمده است که این ارزش معناداری از 0.1 کوچک‌تر بوده و در نتیجه با اطمینان ییش از 99% فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهشی تایید می‌گردد.

این امر به آن معنا است که تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت‌های اجتماعی به طور معنی داری بیش از گروه درمانی شناختی رفتاری، در کاهش هراس اجتماعی دانشجویان موثر است.

بحث و نتیجه گیری

تحلیل نتایج در مقیاس هراس اجتماعی آزمون، نشان داده است که شرکت کنندگانی که مداخله‌ی تلفیقی گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت‌های اجتماعی را دریافت کرده بودند به طور معنی داری ($P=0.002$) بهبودی بیشتری نسبت به افرادی که تنها مداخله‌ی رایج گروه درمانی شناختی رفتاری را گرفته بودند، نشان دادند. به دلیل این که هر دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد جلسات برابر در فرآیند درمان شرکت کرده بودند، این تفاوت میزان بهبودی نمی‌توانست ناشی از کمیت درمان ارایه شده باشد. هم‌چنین هر دو گروه را درمان گران بکسانی هدایت کردند تا اثر تفاوت‌های شخصیتی درمان گران مختلف نیز خنثی گردد و تلاش شد تا در گروه

رسید. به همین ترتیب میزان تعهد و رضایت از درمان در شرکت کنندگان هر دو گروه تفاوتی نداشت (۲۴).

همان طور که بیان شد، با توجه به این که گروه درمانی شناختی رفتاری، منجر به بهبودی در تمام افراد مبتلا به هراس اجتماعی نشده (مخصوصاً افراد مبتلا به هراس اجتماعی فرآگیر)، اضافه کردن دیگر مولفه های روان درمانی به این درمان می تواند به کارآمدی آن یافراشد، که یکی از این مولفه ها آموزش مهارت های اجتماعی می باشد (۱۶، ۱۵).

با وجود بارز شدن نقش مهم آموزش مهارت های اجتماعی حداقل در برخی افراد مبتلا به هراس اجتماعی، این امر به این معنا نیست که لزوماً این افراد با کمبود مهارت های پایه ای مواجه هستند و در واقع شواهد اندکی وجود دارد که افراد دارای هراس اجتماعی کمبود دائم در مهارت های اجتماعی خود داشته باشند (استراوینسکی و آمادو^۵؛ ۲۰۰۱؛ به نقل از ۱۶). به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که این ناتوانی اجتماعی واقعاً بازتاب کمبود مهارت ها و قابلیت عملکرد مناسب و موثر در شخص باشند، ولی به همین ترتیب این احتمال وجود دارد که این مشکلات عملکردی بازتاب فرآیندی دیگر مثلاً تاثیرات مخرب اضطراب (راپی، ۱۹۹۵) و یا تاثیرات رفتارهای ایمن باشد (۲۵). در نتیجه این گونه به نظرمی رسد که این افراد مهارت های اجتماعی خود را در دست یابی به اهداف مهارتی و دریافت استانداردهای مهارتی نامناسب ارزیابی می کنند. ادراک هر فرد از مهارت های اجتماعی خود جنبه ای از خود ادراکی فرد است و در طی درمان مانند دیگر جنبه های تحریف یافته ای خود ادراکی فرد، تغییر می یابد (۱۶). درمان موثر معمولاً منجر به بهبود ادراک بیماران از مهارت های اجتماعی خود می شود (نیومن و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از ۲۴).

یکی از مولفه های مهم این برنامه ای گروه درمانی تلفیقی، قابلیت بالای انعطاف پذیری آموزش مهارت های اجتماعی بود که امکان تعیین شدت و محتوای آموزش این مهارت ها را برای اعضای گروه میسر می ساخت. مولفه های آموزش مهارت ها احتمالاً هم مهارت های رفتاری آن دسته از افراد با

مشاوری و همکاران (۱۳۸۲)، در بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان، به این نتیجه رسیدند که بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (۲۲).

برز گر (۱۳۸۳) نیز، در بررسی تأثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی و جرات مندی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسید که این روش درمانی باعث کاهش معنی دار علایم هراس اجتماعی و افزایش رفتارهای جرات مندانه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری شد (۲۳).

هم چنین مطالعات متعددی دریافتند که آموزش مهارت های اجتماعی برای اختلال اضطراب اجتماعی موثر واقع می شود، حتی اگر به عنوان تنها مداخله ای درمانی به کار رود (مرسج^۱ و همکاران، ۱۹۸۹؛ استراوینسکی^۲ و همکاران، ۱۹۸۲؛ والزو^۳ و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از ۲۴) و یا بخشی از برنامه ای درمانی چند مولفه ای که در آن آموزش مهارت های اجتماعی به مواجهه ملحق شده باشد (ترنر و همکاران، ۱۹۹۵؛ ترنر و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از ۲۴).

وندم-بگن و کرایمات^۴ (۲۰۰۰)، در بررسی مقایسه ای شناخت درمانی گروهی و آموزش مهارت های اجتماعی گروهی برای اختلال اضطراب اجتماعی دریافتند که، هر دو رویکرد در کاهش هراس اجتماعی و اضطراب عمومی، کاهش شدت آسیب شناسی و افزایش مهارت های اجتماعی و خودکنترلی موثر بوده اند. بیماران شرکت کننده در گروه آموزش مهارت های اجتماعی کاهش چشمگیرتری در اضطراب اجتماعی و افزایش بیشتری در مهارت های اجتماعی نسبت به گروه شناخت درمانی نشان دادند. هم چنین نمرات هراس اجتماعی و مهارت های اجتماعی کاهش چشمگیرتری در اضطراب آموزش مهارت های اجتماعی به سطح گروه کنترل طبیعی

¹. Mersch

². Stavinsky

³. Wlazlo

⁴. Van Dam-Baggen, Kraaimaat

شناختی رفتاری (گروه کنترل)، باعث کاهش معنی دار هراس اجتماعی در دانشجویان می شود، انجامید.

لذا نتایج این پژوهش نشان می دهد که به کار گیری شیوه های ترکیبی درمان های روان شناختی و خصوصا آموزش مهارت های اجتماعی می تواند مداخله ای موثر در زمینه های درمان این اختلال به شمار رود. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به اجرای تحقیق بر روی نمونه در دسترس، محدود بودن نمونه پژوهشی به شرکت کنندگان دانشجوی ۱۸ تا ۲۶ سال (که امکان تعیین نتایج به عموم را به علت داشتن تحصیلات بالا محدود کرده)، عدم انجام مطالعات پیگیری به علت محدودیت زمانی و عدم دسترسی به مراجعان و فقدان پیشینه ی قوی در ایران اشاره کرد. به همین جهت برای اظهار نظر فطعی تر در مورد نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که مطالعات پی گیری به منظور مشخص کردن پایداری تاثیرات درمانی انجام پذیرد.

هم چنین تحقیقات بیشتری برای روشن ساختن الگوریتم و نحوه ی الحاق آموزش مهارت های اجتماعی به گروه درمانی شناختی رفتاری مورد نیاز می باشد و انجام پژوهش های مشابه دیگر با نمونه ی بالینی غیردانشجوی مبتلا به این اختلال و نمونه ی بالینی از افرادی که به دیگر اختلالات اضطرابی مبتلا هستند، می تواند زمینه ساز بسترهای برای امکان مقایسه ی بهتر نتایج و افزایش قدرت تعیین پذیری آن گردد.

تشکر و قدردانی

از همکاری صمیمانه ی مستولین و کارکنان کلینیک دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی در اجرای این طرح، تشکر می نماییم. شایان ذکر است که مطالعه حاضر بدون حمایت مالی سازمان های دولتی و غیر دولتی انجام شده است.

کمبودهای مهارتی پایه ای و واقعی را بهبود می بخشد و هم به طور مستقیم باعث بهبود عملکرد، کاهش اضطراب و اجتناب افراد می گردد. برای آن دسته از اعضایی هم که نسبتاً از مهارت های خوب و قوی برخوردار بودند، این آموزش ها می توانست به عنوان تسهیل گری برای افزایش خودکار آمدی همراه با احترام به خود در موقعیت های اجتماعی، هم چنین بهبود در نوانایی مقابله با اضطراب این افراد و در نتیجه کاهش اجتناب اجتماعی آنان، قرار بگیرد (۱۶، ۱۸).

یکی از دلایل دیگر افزودن این مولفه به گروه درمانی شناختی رفتاری این بود که در طی دوران آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی (دبستان، راهنمایی، دیپلماتان و حتی دانشگاه ها) جامعه ی ما، معمولاً ضعف و کمبود آموزش مهارت های اجتماعی به شدت چشمگیر است که این امر به نوعی خود می تواند یکی از عوامل موثر در شیوع این اختلال به شمار رود، (البته در روند جدید برنامه های آموزشی مدارس سال های اخیر کم کم به آموزش این مهارت های نیز پرداخته شده است). به این ترتیب نه تنها دانشجویان مبتلا به هراس اجتماعی، بلکه دیگر دانشجوها و جوانان و نوجوانان جامعه ی ما نیاز به گذراندن این گونه آموزش ها برای برقراری ارتباطات موثر و موفقیت های بیشتر دارند.

در نهایت به دلیل خلاصه آموزش مهارت های اجتماعی موجود و نقش مهم این مهارت ها در پیشرفت اختلال هراس اجتماعی و با توجه نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه، مطالعه ی حاضر انجام پذیرفت. تحلیل نتایج آماری به تایید فرضیه ی اصلی پژوهش (تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی

منابع

1. Abdollahi S. [The relationship between social phobia and self esteem, comparison of self esteem in social phobic and normal persons]. MA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi university, College of psychology, 1998: 2-3. (Persian)
2. Sadock B, Sadock V. [Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry]. Rafiee H, Rezaee F. (translators). First ed. Tehran: Arjmand; 2003: 135-60. (Persian)
3. Hawton K, Salkowskis C. [Cognitive behavior therapy]. Ghasem Zade H. (translator). 3rd ed. Tehran: Arjmand; 2005: 135-76. (Persian)

4. Sadock B, Sadock V, Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005: 609-16.
5. Cloitre M, Heimberg R, Leibowitz MR, Gitow A. Perceptions of control in panic disorder and social phobia. *Cognit Ther Res* 1992; 16: 569-77.
6. American psychiatry association. [Diagnostic and statistical manual of mental disorder- forth edition- text revised (DSM-IV-TR)]. Nikkhoo MR, Hamayak AY. (translators). 4th ed. Tehran: Sokhan; 2002: 29-39. (Persian)
7. Sarason EJ, Sarason B. [Abnormal Psychology]. Najjarian B, Asghari Moghadam MA, Dehghani M. (translators). 4th ed. Tehran: Roshd; 2002: 370-85. (Persian)
8. Tahmasebi SH. [The effectiveness of hypnotic-cognitive therapy on social phobia]. MA. Dissertation. Tehran: Shahid Beheshti university, College of psychology, 2002: 30-42. (Persian)
9. Rapee RM, Heimberg RG. A cognitive behavioral model of anxiety in social phobia. *Behav Res Ther* 1997; 35: 741-65.
10. Shirazi H, Sardarabadi M. [The prevalence of social phobia, anxiety, depression and stress in students of Mashhad university]. BA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi university, College of psychology, 2006: 10-20. (Persian)
11. Heimberg RG. Current status of psychotherapeutic interventions for social phobia. *J Clin Psychiatry* 2001; 62: 36-42.
12. Heimberg RG, Becker RE. Cognitive behavioral group therapy for social phobia: Basic mechanisms and clinical strategies. New York: Guilford; 2002: 200-30.
13. Hope DA, Heimberg RG, Juster H, Turk CL. Managing social anxiety: A cognitive behavioral therapy approach. Sanantonio, TX: Psychological corporation; 2000: 50-70.
14. Antony MM. Assessment and treatment of social phobia. *Can J Psychiatry* 1997; 42: 826-34.
15. Herbert JD, Rheingold AA, Gaudiano BA, Meyers VH. Standard versus extended cognitive behavior therapy for social anxiety disorders: A randomized controlled trial. *BABCP* 2004; 32: 131-47.
16. Herbert JD, Gaudiano BA, Rheingold AA, Meyers VH, Dalrymple K, Nolan EM. Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. *Behav Ther* 2005; 36: 125-38.
17. Herbert JD, Rheingold AA, Goldstein SG. Brief cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. *Cogn Behav Pract* 2002; 9: 1-8.
18. Gaudiano BA, Herbert JD. Preliminary psychometric evaluation of a new self efficacy scale and its relationship to treatment outcome in social anxiety disorder. *Cognit Ther Res* 2003; 27: 537-55.
19. First MB. [Structural clinical interview for DSM IV-axis I]. Kaviani H. (translator). First ed. Tehran: Mehr Kavian; 2005:77. (Persian)
20. Bolandnazar K. [Normalization SPAI test in students]. MA. Dissertation. Mashhad: Ferdowsi university, College of psychology, 2001: 129-50. (Persian)
21. Mortberg E, Karlsson A, Fyring C, Sundin O. Intensive cognitive behavioral group treatment (CBGT) of social phobia: A randomized controlled study. *J Anxiety Disord* 2006; 20: 646-60.
22. Barzegar F. [The effects of group behavior therapy on symptom of social phobia in students]. MA. Dissertation. Isfahan: Isfahan university, College of psychology, 2004: Abstract. (Persian)
23. Moshaveri AH. [The effectiveness of cognitive behavioral education on social phobia in students]. MA. Dissertation. Isfahan: Isfahan university, College of psychology, 2003: Abstract. (Persian)
24. Van Dam-Baggen R, Kraaimaat F. Group social skills training or cognitive group therapy as the clinical treatment of choice for generalized social phobia. *J Anxiety Disord* 2000; 14: 437-51.
25. Hopko DR, McNeil DW, Zvolensky MJ, Eifert GH. The relation between anxiety and skill in performance based anxiety disorders: A behavioral formulation of social phobia. *Behav Ther* 2001; 32: 185-207.