

مطالعه مقایسه‌ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ

ابوالقاسم‌نی‌پور^{۱*} احمد‌رضا‌راجی^۲ محمد‌رضا‌باسامی^۳ ماندانا‌بابازاده^۴

(۱) گروه علوم پایه، دانشکده دامپردازی داشتگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

(۲) گروه علوم دامپردازی، دانشکده دامپردازی داشتگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

(۳) دانش آموخته دانشکده دامپردازی داشتگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

(دریافت مقاله: ۲ تیر ماه ۱۳۸۷، پذیرش نهایی: ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۷)

چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی بالای شتر مرغ و همین طور برخی های منحصر به فرد این پرنده، داشتن اطلاعات کافی در زمینه‌های مختلف علمی بخصوص در ارتباط با خصوصیات دقیق بافتی و هیستوشیمیایی ارگان‌های بدن شتر مرغ ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق ساختار بافتی بعضی‌های مختلف مری در ۴ قطعه جوجه‌شتر مرغ مودود بررسی قرار گرفت. مقاطع بافتی تهیه و با روش‌های متداول بافت‌شناسی رنگ‌آمیزی شدند. اپتیلیوم مری از نوع سنگفرشی مطبق و به میزان سیار کم شاخی بود. لایه پارین شامل بافت همبندی متراکم و دارای میزان اندک رشته‌الاستیک بود. این لایه دارای عدید موکوسی، از نوع ساده و بی‌مشکل لوعلایی-آلونول (عدم‌تألوانی) بود. ترشحات غدد دارای کربوی‌هیدرات از نوع موکوبی‌سالکارید خشنا و اسیبدی بود. ماهیچه مخاطن در تمام طول مری به صورت ساختاری کامل وجود داشت و از نوع ماهیچه صاف بود. طبقه زیر مخاطن از نوع بافت همبندی سست و دارای میزان اندک رشته‌الاستیک بود. طبقه ماهیچه‌ای دارای دو لایه خضیرت تلقیقی داخلی و لایه نازک تر طولی خارجی بود. طبقه سروزی و دادوتنی از نوع بافت همبندی نسبتاً متراکم بود. در این تحقیق نتایج حاصله، با اطلاعات موجود در خصوص سایر پرندگان و همچنین انسان و سایر پستانداران مقایسه شد که شباهت‌ها و تفاوت‌های بین مری جوجه‌شتر مرغ و سایر گونه‌ها وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: واژه‌های کلیدی: شتر مرغ، مری، غدد مری، بافت‌شناسی، هیستوشیمی.

شماره‌گذاری در ظروف حاوی بافر فرمائین ۱۰ درصد قرار گرفت. عملیات آماده‌سازی بافت شامل آب‌گیری، شفاف نمودن، پلاستیک‌شدن و قالب‌گیری به روش‌های معمول بافت‌شناسی انجام شد. از تمام بلوك‌ها (قالب‌ها) برش‌هایی به ضخامت ۵ میکرون تهیه شد و مقاطعه دارای کیفیت مناسب رنگ آمیزی گردید. رنگ آمیزی‌ها شامل: هماتوکسیلین و انژنین، ماسون تری کروم سبز، آر. آ. س. (Periodic Acid Schiff) P.A.S، آکسین‌بلو-ون گیسین، آکسین‌بلو-ون گیسین بودند.^(۱) از رنگ آمیزی ماسون تری کروم سبز جهت تمیزی بافت همبندی و ماهیچه، از رنگ آمیزی P.A.S. آکسین‌بلو-ون گیسین جهت تشخیص و مشخص کردن میزان کربوی‌هیدرات‌ها و نوع موکوبی‌سالکارید و از رنگ آمیزی ورهوف به منتظور شخص کردن رشته‌های الاستیک استفاده شد. برش‌های رنگ آمیزی شده در بزرگنمایی‌های مختلف با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت و مورفولوژی و ساختار بافتی قسمت‌های مختلف مری مطالعه شد. همچنین میانگین ضخامت بعضی از لایه‌های مری (اپتیلیوم، ماهیچه مخاطن و طبقه ماهیچه‌ای) به روش استاندارد میکرومتری تعیین و محاسبه گردید.

نتایج

مری جوجه شتر مرغ دارای دو بخش گردنی و سینه‌ای است و در ناحیه گردن تمام‌ا در سمت راست نای قرار داشت. میانگین طول بخش گردنی ۴۱ سانتی‌متر و در مورد بخش سینه‌ای ۱۲ سانتی‌متر بود. همچنین قطر مری در نواحی مختلف آن توسط کولیس اندازه‌گیری شد که میانگین آن در هر دو بخش گردنی و سینه‌ای تقریباً یکسان و ۲-۲/۰ سانتی‌متر بود. ضمناً چینه دان در جوجه شتر مرغ مشاهده نشد. از لحاظ بافت‌شناسی، اپتیلیوم مری از نوع سنگفرشی


مقدمه

پژوهش شتر مرغ صنعت جدیدی است که به نظر می‌رسد در اینده‌گوشت شتر مرغ به تدریج جایگزین برخی از انواع گوشت‌های سنتی خواهد شد.^(۶) با توجه به درصد پایین چربی گوشت شتر مرغ (تفویپاً ۲۰ درصد)، گوشت آن رامی توان به صورت فراورده‌های گوشتی متعدد مصرف نمود. علاوه بر این به علت درصد پلیمین کلسیترول، غذای سالمی برای مردم به مشارکی رود همچنین پر، تخم و چرم شتر مرغ بروزند مدیریت و تجارت جهانی تاثیر گذاشته است و حتی در تولید مواد آرایشی، پوشک و تزیینات، پیوند قرنیه، پیوند مفاصل و... از این پرنده استفاده شده است.^(۱) از طرفی مری ارگان مهمی در دستگاه گوارش می‌باشد که نقش انتقال مواد غذایی را به عهده دارد که با داشتن بافت‌های مخصوص به خود این عمل را ناجام می‌دهد. نظر به اهمیت فوق العاده مری در تغذیه و پرورش (بخصوص در جوجه‌های در حال رشد) و همچنین ارزش اقتصادی بالای این پرنده و همین طور نقش مهم پرندگان در بهداشت عمومی^(۲) این تحقیق انجام شد تا اطلاعاتی از مراد خصوص ساختار بافتی و هیستوشیمی مری در جوجه شتر مرغ را فراهم نماید. این اطلاعات می‌تواند مورد استفاده دانش پژوهان و متخصصین رشته‌های مختلف از جمله بافت‌شناسی، طبیور، فیزیولوژی و بیولوژی قرار گیرد.


مواد و روش کار

تعداد ۴ قطعه جوجه شتر مرغ ۱-۲ ماهه از تولد کانادایی اصلاح شده مورد استفاده قرار گرفت. پس از دیج، از شروع مری تا پایان آن و با فواصل ۳ سانتی‌متری مونه‌گیری انجام شد. نمونه‌ها با سرم فیزیولوژی شستشو داده شد و پس از






تصویر ۲- شکل واحدهای سطحی و رنگ پذیری شدید ترشحات عدد مری خوجه
شترم غیر EG: اپیتلیوم، EP: لایه پایین، EG: غده مری، پیکن: سالول «کریسی»، D: مجرای
رنگ آمیزی اختصاصی (رنگ آمیزی همانوکسیلین و اتوژین ۳۰٪).




تصویر ۳- لایه‌های مختلف بخش گردی مری خوجه شترم غیر EG: اپیتلیوم، EG: غده
ماری، MM: ماهیچه مخاطی، TS: طبقه زیرمخاطی، ICL: لایه حلقی داخنی طبقه
ماهیچانی، LA: لایه طبلی خارجی طبقه ماهیچه‌ای، TA: طبقه ادوانیس، (رنگ آمیزی
همانوکسیلین و اتوژین ۳۰٪).


۵/۷۷ میکرون بود. لازم به ذکر است ضخامت اپیتلیوم از اندیاب بخش گردی تا
واخر بخش سینه‌ای تدریجاً افزایش می‌یافتد، ولی در قسمت انتهایی بخش
سینه‌ای کاهش پادشاهی بود. لایه پایین (lamina propria) شامل یافته همیندی
متراکم و دارای میزان اندکی راشته‌ای است. همچنین این لایه حاوی غدد
تماماً موکوسی از نوع ساده و به شکل لوبی (alveoli) (عده‌تا اولهای) بود.
میزان غدد مذکور در اندیاب بخش گردی مری بیشتر از اندیاب توأی گردی و همچنین
بیشتر از بخش سینه‌ای بود. از نظر نوع کربوهیدرات موجود در ترشحات عدد
این کربوهیدرات‌ها از نوع موکوبلی ساکارید خشی و اسیدی بود و بزرگ ترین
عدد بر رنگ آمیزی P.A.S. و السین-بلو-ون گیسن رنگ گرفته و مشتمل بودند
(تصاویر ۲-۳) ماهیچه مخاطی (mucosalis mucosa) از نوع ماهیچه صاف و
در تمام طول مری به صورت پیوسته و بصورت یک‌باشد مخصوص باز ایاض طولی
و جود داشت. میانگین ضخامت این لایه در خوجه شترم غیر ۳۰ میکرون بود.
طبقه زرمخاطی (funica submucosa) شامل پافت همیندی سست و



تصویر ۴- اپیتلیوم سطحی مطبق در خوجه شترم غیر EG: اپیتلیوم، پیکن: سالول
سمنکفرشی، (رنگ آمیزی همانوکسیلین و اتوژین ۳۰٪).



تصویر ۵- رنگ پذیری شدید ترشحات عدد مری خوجه شترم غیر SU: واحد ترشحی
(رنگ آمیزی اختصاصی السین-سو-بون گیسن ۶۶٪).



تصویر ۶- شکلهای مخصوص از بین ده لایه طبلی، اندیاب، اوتوزین، OLL: لایه غلظی خارجی، پیکن: یافته
لایه حلقی داخنی، AP: شکلهای مخصوص اندیاب، ICL: لایه غلظی داخنی، (رنگ آمیزی همانوکسیلین و اتوژین ۳۰٪).

مطبق و به میزان بسیار کم شاخی بود (تصویر ۱). میانگین ضخامت آن ۹۲/۵



قرار دارند و عمدتاً از نوع ماهیچه مخططف هستند. سلول ماهیچه صاف نیز به صورت پراکنده در این طبقه وجود دارد که در محل اتصال مری به عده به شدت افزایش می‌پابد (۱۰). در شخوارکنندگان و سگ طبقه ماهیچه‌ای در تمام طول مری از نوع ماهیچه مخططف است (۱۷). در خوک قسمت گردانی از نوع ماهیچه مخططف، قسمت سینه‌ای مخلوط از نوع مخططف و صاف و قسمت شکمی از نوع ماهیچه صاف است (۱۶). در اسب و گزنه طبقه ماهیچه‌ای تا نیمه مری از نوع مخططف و پس از آن از نوع ماهیچه صاف می‌باشد (۱). طبقه ماهیچه‌ای در ماکیان تمام از نوع ماهیچه صاف و دارای مرغ تفاوت خاصی پاسایر گونه‌های دارند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله‌ای حوزه پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بدجهت تامین مالی طرح (شماره ۲/۲۳۴)، آقای قاسم پورادبیی به حاطر همتکاری در بخش عملی و همچنین آقای نعمانی مدیر محترم موزه پرورش شترمرغ تشکر و قدردانی می‌نمایند.

References

1. Banks, W. J. (1993) Applied veterinary histology. Mosby-Year Book, London, UK.
2. Dellmann H. D., Eureil, J. (1998) Textbook of veterinary histology. (5thed.) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.
3. Fawcett, D. W. (1994) A textbook of histology. (12thed.) Chapman and Hall, New York, USA.
4. Garcia-Garcia, J., Ramos, C. (2006) Influenza an existing public health problem. Salud pública. Max. 48:244-267.
5. Ghazi, S. R., Tajalli, M., Gholami, S. (2001) Anatomy of the domestic birds. (2thed.), Shiraz University Press. Shiraz, Iran.
6. Hamidi, M. S. (2001) Management and economic breeding of ostrich in Iran. Beinolmalal shargh. Tehran, Iran.
7. Hudson, L. C. (1993) Histological identification of the striated muscle of the canine esophagus. Anat. Histol. Embryol. 22:101-104.
8. Junqueira, L. C., Carneiro, J. (1989) Basic histology. (6thed.) Lange Medical Publication, Los Altos, California, USA.

دارای میزان اندک رشته‌ای است، فاقد هرگونه غده‌دارای غصب بر سانی اندک بود. طبقه ماهیچه‌ای در تمام طول مری از نوع ماهیچه صاف و دارای دو لایه حلقوی داخلی و طلایی خارجی بود که ضخامت لایه داخلی بیشتر بود (تصویر ۴). میانگین ضخامت این طبقه ۴-۵ میکرون بود و سلول‌های ماهیچه‌ای توسط بافت همسندي است در بر گرفته شده که این بافت همسندي علاوه بر عروق خونی دارای شکله عصبي یارا سمپاتيکي اتریاخ (مايتربک) نیز می‌باشد (تصویر ۵). طبقه سروزی وادواتنس از نوع بافت همسندي نسبتاً متراکم و دارای هیجان اندک رشته‌های الاستینک و همچنین عروق خونی فراوان و دارای میزان کم رشته‌های عصبی بود.

بحث

در جوجه ۱-۲ ماهه شترمرغ میزان شاخی شدن ایمیلیوم اندک است. ممکن است علت کمتر بودن شاخی شدن ایمیلیوم در جوجه شترمرغ، وجود میزان زیاد غدد مری در لایه پارین و همچنین وجود این غدد در تمام طول مری باشد. ایمیلیوم مری در پرینگل کامل‌شاخی شده است (۱). ایمیلیوم مری در شترمرغ میزان کوکوهانه نیز اندک شاخی است (۱۰). در خوک اندک شاخی در اسب به میزان پیشتر و در شخوارکنندگان شدیداً شاخی است (۱۲). ایمیلیوم مری در انسان، غیر شاخی و در گوشت‌خواران معمولاً غیرشاخی است (۲۸). غدد مری در لایه پارین و به میزان زیاد و در تمام طول مری جوجه شترمرغ وجود دارد، این غدد از نوع موکوسی و لوله‌ای - آتوئولی و میزان آن هادر قسمت ابتدائي مری پیشتر است. غدد: کوکوپرینگل در لایه پارین و از نوع موکوسی می‌باشد (۲). غدد مری در سایر حیوانات در طبقه زیرمخطاطی قرار دارند و از نوع لوله‌ای - آتوئولی می‌باشد. این غدد در گزنه، اسب و شخوارکنندگان فقط در محل اتصال مری به عده به شدت افزایش می‌باشد (۱۰). غدد مذکور در انسان در انتهای‌ها، بالاچی و پایینی، مری به طبقه زیرمخطاطی قرار دارند و میزان غندیده طبق شکل لوله‌ای - آبستی و در تمام طول مری وجود دارند و میزان غندیده طبق انتهای‌ها مری کاهش می‌پابد (۱۰). ماهیچه مخطاطی در سی‌ماکیان نیز از نوع از نوع ماهیچه صاف و در تمام طول مری به صورت پیوسته وجود دارد و ضخامت آن تعییر چندانی نشان نمی‌دهد. ماهیچه مخطاطی در سی‌ماکیان نیز از نوع ماهیچه صاف و در آنها مری و وجود دارد (۲). در شترسلول‌های ماهیچه مخطاطی به طرف انتهای‌ها مری تدریجاً افزایش می‌پابد (۱۰). ماهیچه مخطاطی در انتهای‌ها قدراري می‌سگ و خوک وجود ندارد. ولی در گزنه، اسب و شخوارکنندگان به صورت دستگاه ماهیچه صاف مجزا در تزدیک حلق وجود دارد که به میزان آن به طرف تاچه حلقوی می‌افزوده می‌شود (۲). این لایه در انسان به صورت کامل و ضخیم می‌باشد (۱۱). طبقه ماهیچه‌ای مری جوجه شترمرغ از نوع ماهیچه صاف و دارای دو لایه ضخیم، تراکمی و نازکتر خارجی است. لایه‌های طبقه ماهیچه‌ای مری شترمه صورت داره و نامنظم



9. Luna, L. G. (1968) Manual of histologic staining methods of the armed forces institute of pathology. (3rd ed.) MC Graw-Hill, New York, USA.
10. Nabipour, A., Khanzadi, S., Ghasemi, M. J. (2001) Anatomical and histological study of the esophagus of one-humped camel. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 4:113-117.
11. Nazaralian, Y. (2000) A Guide for Successful Ostrich Breeding. (1st ed.) Nashre Eslami Farhang Malal. Tehran, Iran.



A COMPARATIVE STUDY ON THE HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL FEATURES OF ESOPHAGUS IN OSTRICH CHICK

Nabipour, A.^{1*}, Raji, A. R.¹, Basami, M. R.², Babazade, M.³

¹Department of Anatomical Sciences, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran.

²Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran.

³Graduate from the Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran.

(Received 2 June 2006 , Accepted 3 July 2007)

Abstract:

Due to economical worth of ostrich and also some unique characteristics of ostrich, having enough information about different scientific fields of ostrich, particularly its histological and histochemical features are necessary. On this research, histological structure of different parts of the esophagus was studied in 4 ostrich chicks. Tissue sections were prepared and stained by routine histological methods. The epithelium of the esophagus was stratified squamous and slightly keratinized. The lamina propria was consisted of a dense connective tissue with a few numbers of elastic fibers. This layer had simple tubuloalveolar mucus glands which were mainly tubular glands. The gland's secretions were contained carbohydrates. The type of carbohydrates was both neutral and acidic mucopolysaccharides. The lamina muscularis was present as a complete structure in the whole length of the esophagus. It was consisted of smooth muscle. The tunica submucosa was consisted of loose connective tissue and was composed of a few elastic fibers. The tunica muscularis was consisted of two layers of smooth muscle; the more thick inner circular and thinner outer longitudinal layers. The tunica serosa and adventitia contained relatively dense connective tissue. The results were compared with the available data on the other birds and also human and other mammals. There were similarities and differences between the ostrich and other species.

Key words: ostrich, esophagus, esophageal glands, histology, histochemistry.

*Corresponding author's email: nabipour@ferdowsi.um.ac.ir; Tel: 0511-8788944 Fax: 0511-8763852

