

ارزیابی تحمل به بخ زدگی ارقام کلزا (*Brassica napus* L.) پس از خو سرمائی در شرایط کنترل شده

احمد نظامی^۱، اعظم بروزی^۲، مریم جهانی^۳، مهدی عزیزی^۳، محمد جواد موسوی^۴

چکیده

به منظور بررسی تحمل به بخ زدگی ارقام کلزا در شرایط کنترل شده آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت آزمایش اسپلیت‌پلات فاکتوریل با دو تکرار به اجرا درآمد. ترکیب ده رقم کلزا به نامهای لیکورد، الیت، SLMO46، اکاپی، سیمبل، کالورت، اپرا، اینیت، آلیس و زرفام به همراه پنج تیمار دمایی (۰، -۴، -۸، -۱۲ و -۱۶ درجه سانتی‌گراد) به صورت فاکتوریل در پلات‌های فرعی و تیمار خوسما می (خوسما می و عدم خوسما می) در پلات اصلی در نظر گرفته شدند. گیاهان تا مرحله ۳-۵ برگی در گلخانه رشد یافته و سپس گیاهان تیمار عدم خو سرمائی بلا فاصله و گیاهان تیمار خوسما می پس از قرار گرفتن در شرایط خوسما می به مدت سه هفته، در فریزر ترمومگرadiان در معرض تیمارهای دمایی قرار گرفتند. سه هفته بعد از زمان اعمال دمایی بخ زدگی، درصد بقاء، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفیل متر، دمای کشنده 50°C درصد گیاهان (LT_{50}) و دمای کاهنده 50°C درصد وزن خشک گیاهان (RDMLT_{50}) ثبت شد. رقم‌های کالورت، سیمبل و زرفام با 77°C درصد و رقم اپرا با 63°C درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بقاء را دارا بودند. ارقام از لحظه وزن خشک، LT_{50} و سطح برگ سه هفته پس از بازیافت نیز با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند به طوری که اغلب صفات مورد بررسی از تیمار دمایی -۸ درجه سانتی‌گراد به پائین کاهش معنی داری نسبت به شاهد عدم بخ زدگی (تیمار صفر درجه سانتی‌گراد) داشتند. تیمار خوسما می سبب بهبود درصد بقاء (۳۴٪)، وزن خشک بوته (۴۸٪) و (۸۰٪) نسبت به تیمار خوسما می شد.

واژه‌های کلیدی: بقاء، خو سرمائی، LT_{50} , RDMLT_{50}

مقدمه

اصلاح شده آن از اوایل دهه ۷۰ آغاز گردید. از آنجایی که میزان روغن حاصل از دانه‌های روغنی تولید داخل حدود ۸٪ نیاز خام کشور را تامین می کند لذا توسعه کشت کلزا بدلیل دارا بودن صفات مطلوبی مانند مقاومت به سرما، کم آبی، تحمل شوری، ارزش تناوبی بالا (کشت پاییزه کلزا در تناوب با غلات بویژه گندم باعث غنا بخشیدن به خاک می شود) و ... موردن توجه قرار گرفته است (۲).

زیانهای اقتصادی سرما و یخbandان به محصولات کشاورزی کشور به مراتب بیشتر از زیانهای سایر پدیده‌های

دانه‌های روغنی و از جمله کلزا پس از غلات دومین ذخیره غذایی جهان را تشکیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخائر غنی اسید چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند. طبق آمار فائق در سال ۱۹۹۹ کلزا پس از سویا و نخل روغنی سومین منبع تولید روغن نباتی جهان بشمار می آید. بطوریکه کل تولید روغن گیاهی جهان را به ۱۴,۷٪ خود اختصاص داد. در ایران نیز نوعی کلزا در حدود ۵۰۰ سال پیش به عنوان منابع شناخته شده بود ولی کشت ارقام

۱- به ترتیب عضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی طرق و عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

2- Lethal Temperature 50 (LT_{50})

3- Reduced Dry Matter Temperature 50 (RDMLT_{50})

ژنوتیپ‌های تطبیق یافته به سرما و ژنوتیپ‌های تطبیق نیافته تفاوت معنی داری با یکدیگر داشته و در ژنوتیپ‌های تطبیق یافته به سرما LT_{50} کمتر بود. اولد و همکاران (۱۰) با بررسی تحمل به سرمائی ژنوتیپ‌های نخود فرنگی در شرایط مزرعه و شرایط کنترل شده مشاهده کردند که با کاهش دما در صد بقاء لاین‌های نخود فرنگی در هر محیط کاهش یافت.

سودهن و همکاران (۱۹) اظهار نمودند که پایداری کلروفیل شاخصی از مقاومت گیاه به تنش‌های محیطی است. پایداری کلروفیل باعث دریافت بهتر تشبع توسط گیاه تحت شرایط تنش شده و در نتیجه سرعت فتوستز و متعاقباً تولید ماده خشک و عملکرد افزایش می‌یابد.

اهداف این آزمایش عبارت بودند از (الف) بررسی اثر خوسرمایی بر تحمل به بخ زدگی ارقام کلزا، (ب) بررسی برخی پارامترهای موثر بر رشد مجدد ارقام کلزا پس از بخ زدگی (ج) تعیین شاخصی مناسب جهت انتخاب ارقام مقاوم و حساس به تنش بخ زدگی.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال ۱۳۸۴ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد (دانشکده کشاورزی) به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از، خوسرمایی (در ۲ سطح شامل خوسرمایی و عدم خوسرمایی)، به عنوان فاکتور اصلی و ارقام کلزا شامل ۱۰ رقم به نامهای (لیکورد، الیت، SLMO46، اُکاپی، سیمبل، کالورت، اپرا، اُبینت و آلیس (ارقام پائیزه) و همچنین رقم زرفام (بهاره - پائیزه) و دمای بخ زدگی شامل ۵ تیمار (صفر، -۴، -۸، -۱۲ و -۱۶ درجه سانتی گراد) که به صورت فاکتوریل به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. تعداد ۵ بذر در گلدان‌های پلاستیکی به قطر ۱۰ سانتی‌متر و در عمق ۱-۲ سانتی‌متری خاک کشت شدند. دمای گلخانه $25/15 \pm 2$ درجه سانتی گراد تنظیم و فتوپریود طبیعی نیز اعمال شد. گیاهان تا مرحله ۳-۵ برگی در شرایط فوق نگهداری و پس از این مرحله، گیاهان یا بلافصله تحت تیمار بخ زدگی قرار گرفتند (تیمار عدم خوسرمایی) و یا به شرایط

مخرب جوی و گهگاهی فزون تر از خسارت‌هایی است که در اثر بیماریها و آفات به گیاهان وارد می‌آید (۱). از نظر کشاورزی در نتیجه وقوع دماهای تشن زای سرد در منطقه بسته به میزان سردی هوا، طول زمان آن و فراوانی آنها تاییج زیبانباری در گیاه حادث می‌شود و بلافصله بعد از وقوع تشن سرما، در صورت افزایش دما، به ندرت گیاهان صدمه دیده بهبود می‌یابند. تابش شدید در طول یا بلافصله بعد از دوره سرما، موجب افزایش صدمه به کلروپلاست‌ها شده بهبود گیاه را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند (۷).

تحمل زمستان توسط گیاه به توانایی تحمل تنش‌هایی نظیر بخ زدگی، آب کشیدگی، پوشش بخ، غرقاب، خفه شدن و بیماری‌های مختلف وابسته است و لذا این تحمل صفت پیچیده‌ای است که مستلزم وقوع فرآیندهای متعدد شیمیایی، فیزیولوژیکی و مورفوولوژیکی در گیاه است (۹). فولر و گاستا (۱۴) برای اندازه‌گیری تحمل به سرما در گندم "شاخص بقاء مزرعه" را ابداع کردند. در این روش توانایی بقاء ژنوتیپ‌های مورد آزمایش با کاشت آنها در مزرعه و قرار گرفتن در معرض سرما و مقایسه با نمونه شاهد ارزیابی می‌شود. ایشان معتقدند که بقاء در مزرعه آزمون مناسبی است ولی در اغلب مواقع تفاوت بقاء در بین آزمون‌های مزرعه‌ای به دلیل بقاء کامل و یا مرگ کامل گیاه در زمستان آشکار نمی‌شود. حتی زمانی که تفاوت در میزان بقاء نیز وجود دارد، کشف تفاوت‌های کوچک در بقاء زمستانه غالباً به دلیلی شرایط ناهمگن مزرعه مانند پوشش متغیر برف، پوشش بخ، رطوبت خاک، حاصلخیزی خاک و پاتوژن‌ها مشکل می‌باشد. به همین علت انواع مختلفی از آزمون‌های یخ‌بندان مصنوعی جهت پرهیز از بعضی محدودیت‌های انتخاب ناپذیر در ارزیابی‌های مزرعه‌ای ابداع شده است.

در این روش گیاهان در شرایط کنترل شده با سرما خوسرمایی^۱ پیدا می‌کنند و در مرحله بعد با قرار دادن آنها در معرض دماهای مختلف بخ زدگی، دمایی که سبب $\%50$ درصد تلفات (LT_{50}) در گیاه که یک روش مناسب برای اندازه‌گیری مقاومت به سرما است محاسبه می‌کنند (۴). فولر و کارلس (۱۴) بیان نمودند که مقادیر LT_{50}

مرحله بعد گلدان‌ها به گلخانه (مشا به شرایط قبل از خوسرمایی) منتقل شده و پس از ۲۱ روز درصد بقاء و بازیافت گیاهان ارزیابی شد. درصد بقاء گیاهان از طریق شمارش تعداد بوته زنده در هر گلدان و از طریق فرمول: $[100 \times (\text{تعداد گیاهان قبل از تیمار بخ زدگی}) / (\text{تعداد گیاهان زنده سه هفته پس از تیمار بخ زدگی})]$

محاسبه شد. همزمان صفات دیگری نظری سطح برگ (با استفاده از دستگاه Leaf Area meter)، عدد کلروفیل متر (با استفاده از دستگاه SPAD مدل 502 (Minolta-502) و وزن خشک (پس از ۴۸ ساعت قرار گرفتن نمونه‌ها در اون ۷۰ درجه سانتیگراد) اندازه گیری شد. RDMLT₅₀ و نیز₅₀ نیز با استفاده از رسم نمودار درصد بقاء و وزن خشک نمونه‌ها در مقابل دماهای بخ زدگی تعیین شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارهای Excel و MSTAT-C انجام گرفت و جهت مقایسه میانگین داده‌ها از آزمون LSD استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج آنالیز واریانس صفات مورد بررسی در ارقام مختلف کلزا در جدول ۱ آورده شده است. ارقام از نظر درصد بقاء تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند ($p < 0.01$)، به نحوی که ارقام کالورت، سیمبل و زرفام به ترتیب با ۷۷، ۷۶ و ۷۵ درصد از ییشترين و رقم اپرا با ۶۳ درصد از کمترین درصد بقاء برخوردار بودند (جدول ۳). تیمار خوسرمائی بر درصد بقاء گیاهان تأثیر معنی داری ($p < 0.01$)

خوسرمایی منتقل شدند. شرایط خوسرمایی در طول سه هفته و به صورت زیر اعمال شد، هفته اول ۱۱/۱۳ ساعت تناوب نوری و تاریکی و دمای روز و شب $8/5 \pm 1$ درجه سانتی گراد، هفته دوم ۱۰/۱۴ ساعت تناوب نوری و تاریکی و دمای روز و شب $6/4 \pm 1$ درجه سانتی گراد و هفته سوم ۹/۱۵ ساعت تناوب نوری و تاریکی و دمای روز و شب $5/3$ درجه سانتی گراد. روش‌نایاب از طریق لامپ فلورسنت ۴۰ وات و تنگستن ۱۰۰ وات به نسبت سه به یک و میانگین شدت 250 ± 30 میکرومول ایشتن بر متر مربع بر ثانیه تأمین شد و گیاهان در موقع نیاز آبیاری شدند. ۲۴ ساعت قبل از تیمار بخ زدگی نیز بوته‌ها آبیاری شدند. در مرحله بعد گلدان‌ها به فریزر ترموگرadiان منتقل شدند. دمای فریزر در شروع آزمایش ۵ درجه سانتی گراد بوده و پس از قرار دادن نمونه‌ها با سرعت ۲ درجه سانتی گراد در ساعت کاهش یافت. این وضعیت شرایط را برای توزیع مجدد آب به بافت‌های گیاهی و جلوگیری از تشکیل بخ در داخل سلولها که در طبیعت به ندرت اتفاق می‌افتد، فراهم می‌کند (۲۰). به منظور ایجاد هستک بخ در گیاهچه‌ها، در دمای ۳ درجه سانتی گراد محلول INAB¹ بر روی گیاهان پاشیده شد و پس از آن دما با سرعت ۲ درجه سانتی گراد در ساعت کاهش یافت. به منظور ایجاد تعادل در دمای محیط، گیاهان در هر تیمار دمائی به مدت یک ساعت نگه داشته شده و سپس گلدان‌ها به اتاکچک با دمای 4 ± 1 درجه سانتی گراد منتقل و به مدت ۲۴ ساعت در آنجا نگهداری شدند. در

جدول ۱: میانگین مربعات صفات درصد بقاء، وزن خشک، سطح برگ و عدد کلروفیل متر ارقام کلزا سه هفته پس از اعمال تیمارهای بخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

منبع تغییر	درجه آزادی	درصد بقاء	وزن خشک	سطح برگ در گیاه	عدد کلروفیل متر
خوسرمائی	۱	$1174/4 \pm 3$	$91/9 \pm 0$	$13664422/1 \pm 0$	$5332/3 \pm 0$
خطای اصلی	۲	$43/8$	$1/0$	$16634/6$	$10/2$
رقم	۹	$397/7 \pm 0$	$4/1 \pm 0$	$757624/2 \pm 0$	$40/6 \pm 0$
رقم × خوسرمائی	۹	$255/4 \pm 0$	$3/2 \pm 0$	$766079/4 \pm 0$	$70/0 \pm 0$
دما	۴	$71788/8 \pm 0$	$17/6 \pm 0$	$624389/9 \pm 0$	$12050/6 \pm 0$
دما × خوسرمائی	۴	$7566/4 \pm 0$	$6/0 \pm 0$	$3646272/4 \pm 0$	$972/8 \pm 0$
دما × رقم	۳۶	$230177/2 \pm 0$	$0/5 \pm 0$	$220177/2 \pm 0$	$42/2 \pm 0$
خطای فرعی	۹۸	$124/5$	$0/4$	$170699/0$	$26/8$

*: عدم اختلاف معنی دار، **: معنی دار در سطح 0.05 ، ***: معنی دار در سطح 0.01 NS

همبستگی معنی داری با بقاء زمستانه در شرایط مزرعه دارد ($t=0/82^{\circ}$). نتایج حاصل از اثر متقابل رقم و خوسرمائی بر درصد بقاء گیاهان نیز نشان داد که میزان افزایش مقاومت به دنبال خوسرمایی در ارقام اپرا و آلیس ۲۶ درصد و در رقمهای سیمبل و کالورت به ترتیب ۸ و ۶ درصد بود (جدول ۴). نظامی و همکاران (۹) نیز با ارزیابی تحمل به بخ زدگی ژنتیک های نخود گزارش کردند که در اثر تیمار خوسرمائی درصد بقاء، در ژنتیک MCC ۵۰۵ برابر با ۲۰/۶ درصد و در دو ژنتیک MCC ۴۲۶ و MCC ۲۵۲ به ترتیب ۱۳/۶ و ۱۰/۷ درصد افزایش یافت.

اثر تیمار دمائی بر درصد بقاء گیاهان معنی دار بود ($p<0/01$)، بطوريکه درصد بقاء گیاهان با کاهش دما به کمتر از -۸ درجه سانتیگراد کاهش معنی داری یافت (جدول ۵). کاهش درصد بقاء گیاهان بین دمای -۴ و -۸ درجه سانتیگراد، ۱/۱ درصد به ازاء هر درجه سانتیگراد کاهش بود، درحالیکه این کاهش بین دمای -۸ تا -۱۲ درجه سانتیگراد به ۷/۷ درصد به ازاء هر درجه سانتیگراد کاهش رسید. بنابراین اثر منفی درجه حرارتی کمتر از -۸ درجه سانتیگراد بر روی درصد بقاء ارقام مورد مطالعه شدیدتر از

جدول ۲: میانگین مربعتات صفات LT_{50} و $RDMT_{50}$ در ارقام کلزا سه هفته پس از اعمال تیمارهای بخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه


منبع تغییر	درجه آزادی	LT_{50}	$RDMT_{50}$
خوسرمائی	۱	۱۵۷/۸۹ ^{**}	۲۴۴/۵۸ ^{**}
رقم	۹	۵/۷۳ [*]	۲/۵۱ ^{ns}
رقم × خوسرمائی	۹	۳/۳۰ ^{ns}	۲/۶۱ ^{ns}
خطا	۲۰	۲/۴۵	۳/۵۵

داشت و میانگین این صفت در تیمار خوسرمائی ۱۵/۴ درصد بالاتر از شرایط عدم خوسرمائی بود (جدول ۳). به نظر می رسد دوره خوسرمائی قبل از مواجهه شدن گیاه با تنفس یخ زدگی از طریق ایجاد تعییرات بیوشیمیائی (۱۸) و فیزیولوژیک (۶) در گیاه، شرایط را برای بهبود تحمل به تنفس در گیاه فراهم کرده است.

ثئوتونیکا و همکاران (۲۲) بیان کردند، خوسرمائی به مدت چند هفته توانایی ارقام کلزا برای بقاء به هنگام قرار گرفتن در معرض دماهای یخ زدگی افزایش می دهد. همچنین این پژوهشگران خاطر نشان کردند که تحمل به یخ زدگی پس از خوسرمائی در شرایط آزمایشگاهی

جدول ۳: میانگین صفات درصد بقاء، LT_{50} ، وزن خشک، $RDMT_{50}$ ، سطح برگ و عدد کلروفیل متر در تیمار خوسرمایی و ارقام مختلف کلزا سه هفته پس از اعمال تیمارهای بخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

تیمار	بقاء (%)	LT_{50} (درجه سانتیگراد)	وزن خشک (میلی گرم)	$RDMT_{50}$ (درجه سانتیگراد)	سطح برگ (سانتیمتر مربع)	عدد کلروفیل متر
خوسرمائی	۷۸/۷	-۱۴/۹	۱۷۸۳	-۱۱/۰	۹۲/۱	۳۵/۳
عدم خوسرمائی	۶۳/۳	-۱۰/۹	۴۲۷	-۶/۱	۲۶/۷	۲۵/۰
LSD (+/-۰۵)	۲/۷	۰/۹	۴۱۴/۶	۰/۸	۲۷/۷	۲/۱
رقم						
زرفام	۷۵/۰	-۱۴/۳	۴۱۵	-۸/۵	۳۴/۴	۳۱/۵
لیکورد	۷۲/۷	-۱۳/۷	۶۸۱	-۷/۹	۲۴/۵	۲۹/۹
الیت	۶۷/۰	-۱۱/۳	۵۷۹	-۹/۰	۳۶/۸	۲۷/۷
SLMO46	۷۲/۲	-۱۲/۷	۹۰۰	-۷/۳	۲۵/۹	۳۰/۶
اکاپی	۶۹/۹	-۱۲/۵	۱۲۶۸	-۹/۸	۱۴۱/۹	۳۰/۴
سیمبل	۷۶/۰	-۱۲/۹	۱۱۳۲	-۹/۳	۱۴۱/۹	۳۱/۳
کالورت	۷۷/۰	-۱۴/۱	۱۴۰۱	-۸/۰	۱۵۷/۱	۳۲/۳
اپرا	۶۳/۰	-۱۱/۰	۱۳۰۷	-۸/۳	۱۵۴/۸	۲۸/۳
اینیت	۷۰/۲	-۱۲/۷	۱۸۵۷	-۷/۹	۱۸۲/۳	۲۹/۷
آلیس	۶۷/۱	-۱۲/۲	۱۴۹۶	-۹/۲	۱۷۴/۴	۲۹/۶
LSD (+/-۰۱)	۹/۳	۲/۳	۵۱۷	۲/۸	۳۴/۷	۴/۳



شکل ۱: رابطه بین درصد بقاء و دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی (LT₅₀) در گیاه کلزا

تنها پس از سه روز و در ارقام پائیزه بین ۶ تا ۹ روز سبب بهبود تحمل به سرما و کاهش دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی گردید.

ارقام کلزا از لحاظ LT₅₀ تفاوت معنی داری (p<0.05) با یکدیگر داشتند (جدول ۲)، به نحوی که ارقام زرفام، کالورت، سیمبل، SLMO46 و لیکورد از کم ترین و رقمهای اپرا و الیت از بیشترین میزان LT₅₀ برخوردار بودند (جدول ۳). نتایج بررسی دیون و همکاران (۱۲) بر روی علف جمنی (Poa annua L.) تفاوت معنی داری از لحاظ LT₅₀ در بین اکو-تیپ‌های این گراس یکسااله نشان داد. همچنین در آزمایش ایشان پس از اعمال شرایط و سرمائی میزان LT₅₀ بسته به اکو-تیپ بین ۲۲/۸- تا ۳۱/۲ درجه سانتی گراد بود. در آزمایشی که عزیزی و همکاران (۴) نیز بر روی تحمل به بیخ‌زدگی ۱۴ رقم گندم انجام دادند، رقم گلنsson با معادل ۱۵/۸- درجه سانتی گراد مقاوم ترین و رقم مارون با حدود ۳/۷- درجه سانتی گراد حساس ترین رقم معرفی شد.

نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین درصد بقاء و LT₅₀ بیانگر آن است که بخش زیادی از تغییرات درصد بقاء به دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی در هر رقم بر می‌گردد (شکل ۱). لذا همانطور که ارقام سیمبل، کالورت و زرفام از بیشترین درصد بقاء برخوردار بودند، منفی ترین دمای LT₅₀ نیز در همین ارقام مشاهده گردید. بررسی بریجر و

درجه حرارت‌های بالاتر از این دما بوده است. رایف و زینلی (۲۱) نیز با انجام آزمایشی بر روی سه رقم کلزا گزارش کردند که درصد بقاء در ماهات ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ به ترتیب ۶۴، ۲۷، ۹ و ۷ درصد بود. بدین لحاظ نتایج مطالعه حاضر مبنی بر کاهش بیشتر این صفت در ماهات کمتر از ۸ درجه سانتی گراد با گزارش پژوهشگران فوق مطابقت دارد. اعمال تیمار خوسرمائی سبب گردید که تلفات گیاهی با کاهش دما از ۱۲ درجه سانتی گراد به پائین افزایش یابد در حالیکه در شرایط عدم خوسرمائی افزایش تلفات گیاهی با کاهش دما از ۸ درجه سانتی گراد به پائین مشاهده شد.

در دمای ۱۲- درجه سانتی گراد، درصد بقاء گیاهانی که در معرض تیمار خوسرمائی قرار داشتند ۹۵ درصد بود، در حالیکه در همین دما میانگین بقاء در شرایط عدم خوسرمائی به ۳۱/۵ درصد کاهش یافت (جدول ۵). وانر و جونتیلا (۲۲) با بررسی تأثیر سرما بر روی مقاومت به یخ‌زدگی گیاه *Arabidopsis* گزارش کردند که بقاء گیاهانی که در دمای ۱ درجه سانتی گراد به مدت یک روز خو گرفتند تا دمای ۷- درجه سانتی گراد حفظ شد، درحالی که در شرایط عدم خوسرمائی گیاهان در دمای ۵- درجه سانتی گراد از بین رفتهند. میانگین درصد بقاء ارقام مختلف در تیمارهای دمائی مورد بررسی در جدول ۶ نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، درصد بقاء ارقام زرفام، SLMO46 و سیمبل تا دمای ۸- درجه سانتی گراد تحت تأثیر قرار نگرفت ولی تیمار دمائی ۱۲- درجه سانتی گراد به ترتیب سبب ۲۵، ۳۸ و ۲۰ درصد تلفات در این ارقام گردید. در حالی که در رقم اپرا درصد بقاء در دمای ۸- درجه سانتی گراد ۷۵ درصد بود و در دمای ۱۲- درجه سانتی گراد به ۴۰ درصد کاهش یافت.

تیمار خوسرمائی به نحو معنی داری (p<0.01) LT₅₀ را تحت تأثیر قرار داد، بطوریکه اعمال این تیمار سبب بهبود LT₅₀ به میزان ۴- درجه سانتی گراد گردید (جدول ۳). در بررسی نظامی و همکاران (۹) مشاهده شد که خوسرمائی سبب بهبود LT₅₀ در ژنو-تیپ‌های حساس و متحمل به سرمای نخود شده است. رایف و زینلی (۲۱) نیز با مطالعه دوره‌های مختلف خوسرمائی بر افزایش تحمل به یخ‌زدگی سه رقم کلزا گزارش کردند که در رقم بهاره خوسرمائی

پائین ایفا می کنند(۱۱ و ۱۵). کازلوسکی و پالاردی(۱۸) بیان نمودند که دماهای کم (غیر از دمای یخ زدگی) سبب تجمع دهیدراتها و سایر پروتئینهای ضد یخ زدگی در برگها، ساقه ها و گلها می شود، لذا به نظر می رسد فرایند سازگاری گیاه به دماهای نامطلوب که از طریق مکانیسمهای بیوشیمیائی و فیزیولوژیک متفاوتی حاصل می شود، خسارت ناشی از تنفس یخ زدگی و کاهش رشد مجدد گیاه را به حداقل می رساند.

ارقام کلزا از نظر وزن خشک در سه هفته پس از اعمال تیمار یخ زدگی تفاوت معنی داری داشتند($p < 0.01$)، به نحوی که ارقام ابینیت، آلیس و کالورت از بیشترین وزن خشک و ارقام زرفام، الیت و لیکورد از کمترین وزن خشک برخوردار بودند(جدول ۳). نتایج حاصل از اثرات متقابل

همکاران(۱۹۹۶) بر روی بقاء زمستانه غلات در مزرعه نشان داد که بین شاخص بقاء مزرعه^۱ و LT_{50} حاصل از گیاهان قرار گرفته در معرض دماهای یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده همبستگی قوی وجود دارد. میرزائی اصل و همکاران(۶) نیز همبستگی بالائی، بین LT_{50} حاصل از طوچه های گیاهان مزرعه با LT_{50} حاصل از گیاهان کشت شده در گلدان های کوچک گزارش کردند($p = 0.98^{**}$).

نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که خو سرمائی تأثیر معنی داری بر وزن خشک گیاهان مورد بررسی داشت و اعمال این تیمار میانگین این صفت را بیش از چهار برابر نسبت به تیمار عدم خو سرمائی افزایش داد (جدول ۳). گزارش شده که خو سرمائی سبب سنتز برخی از گروههای پروتئینی می شوند که نقش مهمی در تحمل گیاه به دماهای

جدول ۴: اثر متقابل ارقام مختلف کلزا و تیمار خو سرمائی بر میانگین صفات درصد بقاء، LT_{50} ، وزن خشک، سطح برگ و عدد کلروفیل متر سه هفته پس از اعمال تیمار یخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

تیمار	درصد بقاء	LT_{50} (درجه سانتیگراد)	وزن خشک (میلی گرم)	RD MT_{50} (درجه سانتیگراد)	سطح برگ در گیاه (سانتیمتر مربع)	عدد کلروفیل متر
خو سرمائی	۸۰	-۸/۱	۵۶۶	-۱۰/۷	۴۵/۲	۳۶/۶
	۷۸	-۱۵/۲	۹۲۴	-۱۰/۰	۳۸/۵	۳۲/۳
	۷۶	-۱۳/۳	۷۵۳	-۱۲/۲	۴۸/۲	۳۲/۹
	۸۰	-۱۱/۳	۱۳۷۹	-۹/۴	۲۴/۴	۳۴/۳
	۷۶	-۱۱/۲	۲۱۱۹	-۱۲/۴	۲۵۷/۶	۳۷/۰
	۸۰	-۷/۹	۲۰۵۸	-۱۲/۶	۲۶۶/۵	۳۵/۵
	۸۰	-۱۰/۶	۲۱۲۱	-۱۰/۱	۲۷۹/۳	۳۵/۶
	۷۶	-۱۲/۸	۲۱۴۸	-۱۲/۲	۲۸۳/۷	۳۴/۹
	۷۸	-۱۳/۹	۳۲۳۹	-۹/۰	۳۳۹/۷	۳۵/۹
	۸۰	-۱۱/۲	۲۵۲۶	-۱۱/۵	۳۱۹/۲	۳۸/۲
	۷۰	-۷/۸	۲۶۴	-۶/۲	۲۲/۶	۲۶/۳
	۶۷/۵	-۸/۷	۴۳۸	-۵/۸	۳۰/۵	۲۷/۶
	۵۶	-۱۰/۲	۴۴۲	-۵/۸	۲۵/۵	۲۲/۵
	۶۴/۵	-۱۱/۷	۴۲۱	-۵/۲	۲۹/۷	۲۶/۹
	۶۲/۵	-۸/۲	۴۱۷	-۷/۲	۲۶/۱	۲۳/۹
عدم خو سرمائی	۷۲	-۵/۱	۲۰۵	-۶/۱	۱۷/۲	۲۷/۱
	۷۴	-۸/۳	۶۸۱	-۶/۰	۳۴/۷	۲۹/۱
	۵۰	-۱۰/۱	۴۶۵	-۴/۴	۲۵/۸	۲۱/۷
	۶۲/۵	-۲/۸	۴۷۴	-۶/۸	۲۴/۹	۲۳/۵
	۵۴/۳	-۵/۲	۴۶۶	-۷/۰	۲۹/۵	۲۱/۰
	۱۳/۱	-۱/۵	۷۳۱	۳/۳	۴۹/۰	۶/۱
	LSD (+/-1)					

جدول ۵: اثرات دمایی مختلف یخ زدگی و دمایی مختلط یخ زدگی × خوسرمائی بر درصد بقاء، وزن خشک، سطح برگ و عدد کلروفیل متارقام مختلف کلزا سه هفته پس از اعمال تیمار یخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

تیمار	درصد بقاء	وزن خشک (میلی گرم)	سطح برگ در گیاه (سانتی‌متر مربع)	عدد کلروفیل متر
دماهی یخ زدگی				
۴۰/۹۳	۹۹	۱۵۸۶	۱۴۵/۹	۱۴۵/۹
۴۰/۳۸	۹۸/۷	۱۵۸۲	۱۴۸/۵	۱۴۸/۵
۳۸/۸۱	۹۴/۱	۱۳۸۶	۱۳۶/۴	۱۳۶/۴
۳۰/۵۲	۶۳/۲	۹۹۰	۱۱۶/۲	۱۱۶/۲
.
۳۰/۴	۶/۵۵	۳۶۵	۲۴/۵۲	۲۴/۵۲
خوسرمائی × دما				
۴۵/۴	۱۰۰	۲۴۰۱	۲۴۳/۱	۲۴۳/۱
۴۳/۷	-۴	۲۳۲۹	۲۴۷/۵	۲۴۷/۵
۴۳/۵	-۸	۲۳۰۳	۲۴۳/۹	۲۴۳/۹
۴۳/۸	-۱۲	۹۵	۱۸۸۴	۲۲۵/۹
.	-۱۶	.	.	.
۳۶/۵	۹۸	۸۴۳	۸۴۸	۸۴۸
۳۷/۱	-۴	۷۶۳	۴۹/۵	۴۹/۵
۳۴/۲	-۸	۸۸	۴۲۴	۲۸/۹
۱۷/۲	-۱۲	۳۱/۵	۹۶	۶/۴
.	-۱۶	.	.	.
۴/۲	۹/۳	۵۱۶	۴۳/۷	۴۳/۷
LSD (۰/۰۵)				
LSD (۰/۰۱)				

درصد کمتر از تیمار عدم یخ زدگی بود در حالیکه در تیمار خوسرمائی تنها دمای ۱۶- درجه سانتیگراد سبب کاهش معنی دار وزن خشک گیاه شد و در بین سایر دمایی یخ زدگی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول ۵). هنگبی و همکاران (۱۶) در بررسی تحمل به یخ زدگی چندین رقم یونجه و شبدیر یکسانه مشاهده نمودند که با کاهش دما از ۱-۱۳- درجه سانتیگراد (با فواصل ۳ درجه) ماده خشک گیاه کاهش معنی داری نشان داد، بطوریکه در گیاهانی که خوسرمائی نداشتند، در تیمار دمای ۷- درجه سانتیگراد وزن خشک به صفر رسید درحالیکه این وضعیت در گیاهان خوگرفته به سرما در دمای ۱۰- درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. آنها در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند، گیاهانی که LT₅₀ پائین تری داشتند، از تولید ماده خشک بیشتری نیز پس از رشد مجدد برخوردار بودند. از نظر دمای کاهنده ۵۰ درصد وزن خشک گیاه (RDMT₅₀) در بین دو تیمار خوسرمائی و عدم خوسرمائی

خوسرمائی و رقم (جدول ۴) نشان داد که اعمال تیمار خوسرمائی تأثیر معنی داری بر وزن خشک ارقام زرفام، لیکورد و الیت نداشت، درحالی که باعث افزایش چشمگیر صفت مذکور در سایر رسمهای مورد مطالعه گردید. به طوریکه اعمال این تیمار میانگین وزن خشک را در ارقام سیمبل و ابینت حدود ۱۰ و ۷ برابر افزایش داد، در حالیکه میزان این افزایش در رقم الیت تنها ۷۰ درصد بود. تیمار دمایی نیز به نحو معنی داری میانگین وزن خشک گیاه را تحت تأثیر قرار داد (p<0.01). بیشترین وزن خشک گیاه در دمایی صفر و -۴- درجه سانتیگراد بدست آمد و اختلاف معنی داری از این نظر با دمای -۸- درجه سانتیگراد مشاهده نشد (جدول ۵). در حالی که وزن خشک گیاه در تیمار دمایی -۱۲- درجه سانتیگراد ۳۷/۵ درصد نسبت به تیمار عدم یخ زدگی کاهش یافت و در دمای -۱۶- درجه سانتیگراد به صفر رسید. در تیمار عدم خوسرمائی وزن خشک گیاه در دمای -۸- و -۱۲- درجه سانتیگراد به ترتیب ۴۸/۵ و ۸۸/۶

سانتی گراد حاصل شد. در آزمایش ایشان تیمار دمایی ۴- درجه از نظر سطح برگ اختلاف معنی داری با شاهد نداشت. داده های حاصل از اثر متقابل خو سرمائی و دما نشان داد که در دماهای ۰، ۴-۸ و ۱۲- درجه سانتی گراد سطح برگ گیاه در شرایط خو سرمائی به ترتیب ۰/۹، ۵/۰، ۲/۹ و ۸/۴ برابر نسبت به شرایط عدم خو سرمائی افزایش یافت و لذا تأثیر تیمار خو سرمائی در دو دمای ۸- و ۱۲- درجه سانتی گراد بیش از دماهای ۰ و ۴- بوده است (جدول ۵). بررسی تأثیر دماهای یخ زدگی بر سطح برگ ارقام مورد بررسی نشان داد که در گیاهان زنده بیشترین سطح برگ در ارقام اکاپی، سیمبل، کالورت، اپرا، ابنت و آلیس و در دمای صفر درجه بدست آمد و کمترین آن در دمای ۱۲- درجه سانتی گراد در رده های زرفام، لیکورد، الیت و SLMO46 حاصل شد (جدول ۶).

میانگین عدد کلروفیل متر ارقام کلزا در تیمارهای مختلف در جدول ۳ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود بین ارقام مختلف از نظر میزان کلروفیل برگ اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما تأثیر تیمار خو سرمائی بر این صفت معنی دار بود، به نحوی که اعمال خو سرمائی سبب شد عدد کلروفیل متر ۴۱/۲ درصد بیشتر از تیمار عدم خو سرمائی باشد. تغییرات عدد کلروفیل متر در ارقام مختلف کلزا در تیمار خو سرمائی نیز به این ترتیب بود که با اعمال این تیمار عدد کلروفیل متر در کلیه ارقام مورد بررسی افزایش یافت. با وجود این بیشترین میزان افزایش عدد کلروفیل متر در رقم آلیس (۸۲ درصد) و کمترین آن در رقم لیکورد (۱۷ درصد) مشاهده شد (جدول ۶). موحدی و همکاران (۱۳۸۳) با اشاره به وجود رابطه مثبت قوی بین میزان نیتروژن، کلروفیل و عدد SPAD ، افزایش عدد کلروفیل متر را نشان از افزایش میزان کلروفیل در واحد سطح برگ می دانند.

نتایج آزمایش حاکی از آن است که از نظر عدد کلروفیل متر اختلاف معنی داری بین دماهای مختلف یخ زدگی وجود دارد ($p < 0/01$). بیشترین عدد کلروفیل متر در دمای صفر درجه سانتی گراد (عدم یخ زدگی) و کمترین آن در بین گیاهان زنده در دمای ۱۲- درجه سانتی گراد بدست آمد، به نحوی که با کاهش دما از صفر به ۱۲- سانتی گراد عدد کلروفیل متر ۲۵/۴ درصد نسبت به تیمار

تفاوت معنی داری وجود داشت (جدول ۲)، به نحوی که خو سرمائی سبب بهبود حدود ۵ درجه سانتی گراد در میانگین این صفت گردید (جدول ۳). به نظر می رسد با قرار گرفتن گیاهان در شرایط خو سرمائی، از طریق تغییر در متابولیسم و فعالیتهای سلولی، تحمل گیاه به تنش یخ زدگی بهبود یافته و همین امر منجر به رشد مجدد بهتر گیاهان پس از تنش یخ زدگی شده است. بین رکمهای مورد بررسی اختلاف معنی داری از لحاظ سطح برگ در پایان دوره رشد مجدد (۳) هفته پس از اعمال تیمار یخ زدگی وجود داشت (جدول ۱)، به نحوی که رکمهای ابنت و آلیس از بالاترین سطح برگ برخوردار بودند (به ترتیب ۱۸۲ و ۱۷۴ سانتی متر مربع) در حالی که کمترین سطح برگ در ارقام زرفام و لیکورد (حدود ۳۵ سانتی متر مربع) مشاهده شد (جدول ۳). همچنین خو سرمائی اثر منفی تنش سرما را بر سطح برگ گیاه در سه هفته پس از یخ زدگی کاهش داد، بطوريکه در شرایط خو سرمائی میانگین سطح برگ حدود ۳/۵ برابر بیشتر از شرایط عدم خو سرمائی بود (جدول ۳). بررسی سطح برگ در ارقام مختلف کلزا در دو شرایط خو سرمائی و عدم خو سرمائی نیز نشان داد که تیمار خو سرمائی، افزایش قابل توجه و معنی داری را در سطح برگ ارقام اکاپی، سیمبل، کالورت، اپرا، ابنت و آلیس ایجاد کرد بطوريکه میانگین سطح برگ ارقام مذکور در شرایط خو سرمائی در شرایط خو سرمائی حداقل بیش از ۸ برابر آن نسبت به شرایط عدم خو سرمائی افزایش یافت، در صورتیکه این روند در خصوص ارقامی نظیر زرفام، لیکورد، الیت و SLMO46 کمتر از دو برابر بود (جدول ۴).

تأثیر دماهای مختلف یخ زدگی نیز بر سطح برگ ارقام مورد بررسی معنی دار بود ($p < 0/01$) . کاهش دما به کمتر از ۸- درجه سانتی گراد سبب کاهش معنی دار سطح برگ گیاه نسبت به تیمار عدم یخ زدگی شد، ضمن اینکه تیمار دمایی ۸- درجه سانتی گراد از نظر سطح برگ اختلاف معنی داری با شاهد نداشت و کمترین سطح برگ در تیمار دمایی ۱۲- درجه سانتی گراد حاصل شد (جدول ۵). عزیزی و همکاران (۴) اظهار داشتند که روند تغییرات سطح برگ ارقام مختلف گندم با کاهش دما از صفر به ۲۰- درجه سانتی گراد به صورت کاهشی بود و بیشترین سطح برگ در تیمار شاهد (عدم یخ زدگی) و کمترین آن در تیمار دمایی ۲۰- درجه

ادامه جدول ۶: میانگین صفات درصد بقاء، وزن خشک، سطح برگ و عدد کلروفیل متر در ارقام مختلف کلزا در دماهای مختلف يخ زدگی سه هفته پس از اعمال تیمار يخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

رقم	دما	درصد بقاء	وزن خشک (میلی گرم)	سطح برگ (سانتیمتر مربع)	عدد کلروفیل متر
کالورت	-۴	۱۰۰/۰	۲۱۹۱/۰	۲۲۸/۷	۴/۲
	-۸	۱۰۰/۰	۲۰۰۴/۰	۲۰۷/۲	۳۹/۲
	-۱۲	۹۵/۰	۱۹۱۵/۰	۲۰۷/۹	۴۳/۷
	-۱۶	۹۰/۰	۱۸۹۵/۰	۱۴۱/۵	۳۸/۲
	-۱۶	۹۰/۰	۱۸۱۱/۰	۲۱۲/۳	۳۹/۱
	-۴	۱۰۰/۰	۱۷۱۶/۰	۲۱۷/۱	۴۲/۳
اپرا	-۸	۷۵/۰	۱۶۱۱/۰	۱۴۹/۳	۳۹/۱
	-۱۲	۴۰/۰	۱۳۹۴/۰	۱۹۴/۳	۲۱/۰
	-۱۶	۴۰/۰	۱۳۹۴/۰	۲۳۰/۹	۴۲/۵
	-۴	۱۰۰/۰	۱۲۴۸/۰	۲۵۹/۰	۳۹/۴
	-۸	۹۱/۵	۲۱۶۵/۰	۲۱۲/۶	۳۶/۳
	-۱۲	۶۰/۰	۱۸۱۱/۰	۲۰۹/۲	۳۰/۰
ابنیت	-۱۶	۹۰/۰	۱۸۱۱/۰	۲۰۹/۲	۳۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۲۲۶۹/۰	۲۶۱/۳	۳۹/۲
	-۸	۹۵/۷	۲۰۸۳/۰	۲۲۳/۹	۴۰/۶
	-۱۲	۹۰/۰	۱۶۸۳/۰	۱۸۶/۸	۴۲/۰
	-۱۶	۵۰/۰	۱۴۴۴/۰	۲۰۰/۱	۲۶/۱
	-۱۶	۵۰/۰	۱۱۵/۶	۷۷/۵	۹/۶
LSD (۰/۰/۵)					

دادند.

عزیزی و همکاران (۴) در آزمایش خود بر روی ۱۴ رقم گندم به این نتیجه رسیدند که عدد کلروفیل متر، وزن خشک، سطح برگ و ارتفاع بوته همبستگی بالائی با LT₅₀ داشتند. در آزمایش ایشان رابطه RDMT₅₀ نیز با صفات مذکور منفی و معنی دار بود. مودهن و همکاران (۱۹) گزارش کردند که پایداری کلروفیل شاخصی از مقاومت گیاه به تنشهای محیطی است. پایداری کلروفیل تحت شرایط تنشن موجب تداوم فتوسنتز و متعاقباً تولید ماده خشک در گیاه می شود.

نتیجه گیری

در این آزمایش بین ارقام کلزا از نظر درصد بقاء سه هفته پس از اعمال تیمار يخ زدگی تفاوت معنی داری مشاهده شد. ارقام کالورت، سیمبل و زرفام با داشتن بیش از ۷۴ درصد بقاء بیشترین و رقم اپرا با ۶۳ درصد بقاء کمترین درصد خشک، LT₅₀ و سطح برگ سه هفته پس از بازیافت با

جدول ۶: میانگین صفات درصد بقاء، وزن خشک، سطح برگ و عدد کلروفیل متر در ارقام مختلف کلزا در دماهای مختلف يخ زدگی سه هفته پس از اعمال تیمار يخ زدگی و رشد مجدد در شرایط گلخانه

رقم	دما	درصد بقاء	وزن خشک (میلی گرم)	سطح برگ (سانتیمتر مربع)	عدد کلروفیل متر
زرفام	-۴	۱۰۰/۰	۷۰۴/۸	۴۹/۵	۴۲/۹
	-۸	۱۰۰/۰	۵۶۸/۳	۴۸/۴	۴۲/۳
	-۱۲	۱۰۰/۰	۵۵۶/۷	۴۸/۲	۴۱/۱
	-۱۶	۷۵/۰	۲۴۵/۸	۲۶/۱	۳۰/۱
	-۱۶	۷۵/۰	۲۴۹/۰	۳۰/۶	۳۶/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۶۹۱/۰	۵۲/۵	۳۹/۰
لیکورد	-۸	۹۵/۰	۱۱۱۶/۰	۴۷/۵	۳۹/۰
	-۱۲	۹۳/۷	۱۱۶۸/۰	۴۲/۰	۳۵/۹
	-۱۶	۷۵/۰	۷۵/۰	۳۰/۶	۳۶/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۹۵/۰	۵۶/۹	۴۲/۳
	-۸	۹۵/۰	۹۱۹/۰	۴۶/۵	۳۷/۵
	-۱۲	۵۰/۰	۳۵۵/۰	۲۸/۲	۲۱/۹
الیت	-۱۶	۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۱۰۲۹/۰	۵۶/۹	۴۲/۳
	-۸	۹۵/۰	۹۱۹/۰	۴۶/۵	۳۷/۵
	-۱۲	۵۰/۰	۵۰/۰	۵۲/۳	۳۶/۵
	-۱۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵۵/۲	۴۰/۰
SLMO46	-۸	۹۵/۰	۹۸۴/۰	۵۲/۳	۳۶/۵
	-۱۲	۵۰/۰	۳۵۵/۰	۲۸/۲	۲۱/۹
	-۱۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵۳/۶	۴۱/۸
	-۸	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۵۰/۳	۳۷/۰
	-۱۲	۱۰۰/۰	۶۲/۲	۲۰/۹	۳۴/۳
اکاپی	-۱۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۱۶۹۵/۰	۱۹۴/۹	۳۹/۵
	-۸	۹۵/۸	۱۱۲۸/۰	۱۶۶/۷	۳۸/۴
	-۱۲	۵۲/۰	۱۴۸۴/۰	۱۴۳/۳	۳۰/۲
	-۱۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	-۴	۱۰۰/۰	۱۳۲۸/۰	۱۸۶/۱	۱۴/۹
سیمبل	-۸	۱۰۰/۰	۱۶۶۵/۰	۱۸۹/۶	۳۸/۹
	-۱۲	۱۰۰/۰	۱۳۶۵/۰	۱۶۶/۲	۳۸/۱
	-۱۶	۸۰/۰	۱۲۹۹/۰	۱۶۷/۸	۳۷/۸
	-۴	۱۰۰/۰	۱۱۵/۶	۷۷/۵	۹/۶
	-۸	۱۰۰/۰	۲۰/۷۲	LSD (۰/۰/۵)	LSD (۰/۰/۵)

شاهد(عدم يخ زدگی) کاهش یافت (جدول ۵). داده‌های حاصل از اثر متقابل خوسرمایی و دما نشان داد که خوسرمایی اثرات سوء تنشن يخ زدگی را بر میزان کلروفیل برگ کاهش داد، بطوريکه در دمای ۱۲- درجه سانتي گراد خوسرمایي سبب بهبود میانگین صفت مذکور به میزان ۲/۵ برابر آن نسبت به تیمار عدم خوسرمایی شد (جدول ۵). در تیمار دمایي صفر درجه سانتيگراد رقم اکاپی از بالاترین عدد کلروفیل متر برخوردار بود (جدول ۶) و در بین گیاهان زنده در دمای ۱۲- درجه سانتيگراد ارقام الیت و اپرا بدون تفاوت معنی دار کمترین میانگین این صفت را به خود اختصاص

یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. اغلب صفات مورد بررسی از تیمار دمائی ۸- درجه سانتی گراد به پائین کاهش معنی داری نسبت به شاهد (تیمار عدم یخزدگی) نشان دادند. ضمن اینکه خوسرمائی سبب بهبود تحمل به تنفس یخزدگی و تخفیف اثرات این تنفس بر گیاهان شد. در حد بقاء، LT_{50} وزن خشک گیاه، RD_{50} ، سطح برگ و عدد کلروفیل متر ارقام مورد مطالعه پس از خوسرمائی بهبود قابل توجهی را نسبت به تیمار عدم خوسرمائی نشان دادند. لذا به نظر مشخص نمود.

منابع

- ۱- امیر قاسمی، ت. ۱۳۸۱. سرمآزادگی گیاهان (یخبندان، صدمات و پیشگیری). نشر آیندگان.
- ۲- شریعتی، ش. و پ. قاضی زاده. ۱۳۷۹. کلزا. اداره کل آمار و اطلاعات در امر کشاورزی.
- ۳- عزیزی، ه. ۱۳۸۴. ارزیابی تحمل به سرما در گندم تحت شرایط مزرعه و کنترل شده. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۴- عزیزی، ه.، ا. نظامی، م. نصیری محلاتی و ح. ر. خزاعی. ۱۳۸۶. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، (۶) ۱۰۹-۱۱۹.
- ۵- کافی، م.، ب. کامکار و ع. مهدوی دامغانی. ۱۳۸۲. واکنش‌های گیاهان زراعی به محیط رشد. (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۶- میرزایی اصل، ا.، ب. بیزدی صمدی، ع. زالی، وی. صادقیان مطهر. ۱۳۸۱. بررسی مقاومت گندم به سرما با روش‌های آزمایشگاهی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، (۶) ۱۷۷-۱۸۶.
- ۷- میر محمدی میدی، ع. م. ۱۳۷۹. جنبه‌های فیزیولوژیکی و بهبود ای تنش‌های سرما و یخ زدگی گیاهان زراعی. انتشارات گلبن اصفهان.
- ۸- موحدی دهنوي ، م. ، ع. م. مدرس ثانوي ، ع. سروش زاده و م. جلالی . ۱۳۸۳. تغییرات میزان پرولین، قندهای محلول کل ، کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پائیزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگر. مجله بیابان، (۹) ۹۳-۱۰۷.
- ۹- نظامی، ا.، ع. باقری، ح. رحیمیان، م. کافی و م. نصیری محلاتی. ۱۳۸۵. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شده. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، (۱۰) ۴: ۲۵۷-۲۷۱.
- 10-Auld, D. L., R. L. Ditterline, G. A. Murray and J. B. Swensen. 1983. Screening peas for winter hardiness under field and laboratory condition. Crop Sci. 23: 85-88.
- 11-Bridger, G.M., D.E., Falk, B.D. McKersie and D.L. Smith. 1996. Crown freezing tolerance and field winter survival of winter cereals in eastern Canada. Crop Science. 36:150-157.
- 12-Dionne, J., Y. Castonguay, P. Nadeau and Y. Desjardins. 2001. Freezing tolerance and carbohydrate changes during cold acclimation of green-type annual bluegrass (*Poa annua* L.) ecotypes. Crop Science. 41:443-451.
- 13-Fowler, D. B. and R. J. Carles. 1979. Growth, development, and cold tolerance of fall-acclimated cereals grains. Crop Sci. 19: 915-922.
- 14-Fowler, D. B., L. V. Gusta and N. J. Tyler. 1991. Selection for winter hardiness in wheat. III. Screening methods. Crop Sci. 21: 896-901.
- 15-Griffitt, M., M. Antikainen, W.C. Hon, K. Pihakaski Maunsbach, X.M. Yu, J.U. Chun, and D.S.C. Yang. 1997. Antifreeze proteins in winter rye. Plant Physiology. 100: 327-332.
- 16-Heknaby, M., M.C. Antolin and M. Sanchez-Diaz. 2006. Frost resistance and biochemical changes during cold acclimation in different annual legumes. Environmental Experimental Botany. 55: 305-314.
- 17-Houde, M., J. Danyluk, J.F. Laliberte, E. Passart, R.S. Dhundsa, and F. Sarhan. 1992. Cloning, characterization and expression of cDNA encoding a 50 KD protein specifically induced by cold acclimation in wheat. Plant Physiology. 99: 1381- 1387.
- 18-Kozlowski, T. T. and S. G. Pallardy. 2002. Acclimation and adaptive responses of woody plants to environmental stresses. The Botanical Review 68: 270.334.

- 19-Modhan, M. M., S.L. Narayanan and S.M. Ibrahim. 2000. Chlorophyll stability indexes (CSI): its impacts on salt tolerance in rice. International Rice Research, Notes: 25:38-40.
- 20-Murry, G.A., D. Eser, L.V. Gusta and G. Eteve. 1988. Winter hardiness in pea, lentil, faba bean and chickpea. P. 831-843. In R.J. Summerfield (ed.) *World Crops: Cool Season Food Legumes*. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands.
- 21-Rife, C. L. and H. Zeinali. 2003. Cold tolerance in oilseed rape over varying acclimation durations. *Crop Science*. 43:96–100.
- 22-Teutonica, R.A., J.P. Palta and T.C. Osborn. 1993. In vitro freezing tolerance in relation to winter survival of rapeseed cultivars. *Crop Science*. 33: 103-107.
- 23-Wanner, L. A. and O. Junnila. 1999. Cold-induced freezing tolerance in *Arabidopsis*. *Plant Physiology*, 120: 391–399.

Evaluation of freezing tolerance in rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars acclimated under controlled conditions

A.Nezami¹, A. Borzooei¹, M. Jahani¹, M. Azizi², M.J. Mosavi¹

Abstract

In order to determine freezing tolerance of 10 rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars including Zarfam, Licord, Elit, SLMO46, Okapi, Symbol, Calvert, Opera, Ebonit and Alis, a green house experiment was carried out at the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. In a two-replicate RCBD split factorial experiment two levels of acclimation (acclimated vs no acclimated) served as mainplots and a combination of five cold levels (0, -4, -8, -12 and -16 °C) and the 10 genotypes served as subplots. Plants were kept until 3-5 leaf stage in greenhouse condition with 23/16±2°C (day/night) and natural photoperiod. Then, the plants of non-acclimation treatment were frozen immediately and for acclimation treatment after three weeks that put them under acclimation freezing were done. Survival percentage, leaf area, SPAD reading, dry weight, (LT₅₀)¹ and (RDMT₅₀)¹ were determined after 3 weeks. Survival percentage after freezing was different in cultivars ($P<0.01$). Calvert, Symbol and Zarfam cultivars had the highest (77, 76 & 75) and Opera cultivar showed the lowest (63) survival percentage, respectively. Cultivars were different in leaf area, dry weight and LT₅₀. The most freezing damage on the plant was absorbed at the lower than -4°C temperatures. Although acclimation decreased the freezing effects on the most characteristics. In according to the good correlation between LT₅₀, SPAD reading, and LT₅₀ with survival percentage, it seems that for evaluation of freezing tolerance in rapeseed using, the LT₅₀ and SPAD reading may be useful.

Keywords: Acclimation, LT₅₀, RDMT₅₀, survival

1 and 2- Contribution from College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad and Research Center of Agriculture and Natural Resources of Mashhad, respectively.