

اثر دونوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل چعفری *Tagetes patula*

^۱ سام یاکدل (۱)، علی تهرانی فر (۲)، حسین نعمتی (۳)

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲-دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ۳-استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اثر دونوع خاکپوش چوب و کمپوست زیاله شهری بر دما و رطوبت خاک، رشد علف هرز و رشد گل جعفری واریته در آگان بی (*Tagetes patula* cv duragon Bee) به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار نکرار بررسی شد. در این آزمایش تیمارها شامل شاهد (بدون خاکپوش) و دو نوع خاکپوش چوب و کمپوست زیاله شهری هر کدام در سه ضخامت ۴، ۶، ۱۲ سانتیمتری بودند. در طول دوره آزمایش (۸ فروردین تا ۲۹ شهریور سال ۱۳۸۷) دما ی خاک، رطوبت خاک، رشد علف هرز، وزن تر و خشک گیاه، ارتفاع بوته، طول ریشه و وزن ریشه در پایان فصل رشد اندازه گیری شد. دمای خاک با افزایش ضخامت خاکپوش کاهش می یافتد و دمای خاکپوش کمپوست زیاله شهری در مقایسه با چوب چوب در ضخامت های مشابه بالاتر بود که به دلیل رنگ تیره کمپوست می باشد. رطوبت خاک با افزایش ضخامت مالج افزایش می یافتد. در رشد علف هرز ضخامت ۸ سانتیمتر در هر دو نوع خاکپوش بیشترین مقدار را نشان داد. وزن تر و خشک و ارتفاع گیاه در چوب چوب با ضخامت ۶ سانتیمتری مقادیر بیشتر را به خود اختصاص داد. طول ریشه و وزن ریشه هم چوب چوب با ضخامت ۱۲ سانتیمتری بیشترین مقدار را نشان می داد. در مجموع افزایش ضخامت لایه خاکپوش باعث بهبود رشد گیاه می شود و چوب چوب با ضخامت ۶ و ۱۲ سانتیمتری در مجموع نتایج بهتری را نشان داد.

مقدمة

شرمان و همکاران (۱۹۷۹) در آزمایشهای در نیزاسکالاتابت کردند که خرد های خشک شده چمن به اندازه یونجه خشک در تعديل دمای خاک حفظ رطوبت خاک و املاح رشد گیاهان موثرند (۲). مواد گیاهی کمبوست شده از جمله مواردی است که می تواند به عنوان یک مالج آلی در فضای سبز کاربرد داشته باشد. مالج تراشه چوب ، سنگهای خردشده با رنگهای متفاوت که روی پلاستیک سیاه قرار گرفته اند و نیز شن در سطح فضای سبز در زیر استفاده از کمبوست با کیفیت مناسب می تواند سبب افزایش کیفیت در مرحله استقرار و مدیریت گیاه در فضای سبز شهری شود و مخصوصا هزینه های مدیریتی گیاه را کاهش دهد (۳) استفاده از مالج سبب بهبود وضعیت رطوبتی، دمای خاک و منجر به افزایش رشد ریشه و جذب مواد غذایی گندم و ذرت می شود (۴) دوستالک و همکارانش اثر مالج دهنی کامل با کاه، مالج دهنی روی ردیف ها با پوست تازه درختان و چمنکاری کامل در زیر نهال های تعداد از گونه های درختی و در ختیجه ای را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که در نهال هایی که از کاه به عنوان مالج به طور کامل استفاده شده بود سرعت رشد چند برابر بیشتر از سایر تیمار ها بود (۵) یکی از راهکار هایی که در مناطق خشک و نیمه خشک ، تلفات آب باران را به حداقل می رساند مالج دهنی خاک سطحی است . آغازس و همکارانش استفاده از خاکپوش را روش موثری برای جلدگیری از تشکیل سله در سطح خاک و هدر روی آب است، آنها کمبوست ضایعات جامد شهربی (CMSW) را به عنوان خاکپوش برای حداقل رساندن میزان از دست روتوبت بدون صدمه به محیط زیست

پیشنهاد کردند(۶) کاترین گرین لی و همکارانش گزارش کردند استفاده از مالج چپس چوب باعث کاهش رویش علف هرز و

ردیف	منبع تغییرات	آزادی	دماج خاک MS	روطوت خاک MS	علف هرز MS	وزن تر MS	وزن خشک MS	ارتفاع MS	طول ریشه MS	وزن ریشه MS
۱	بلوک	۳	۳۸.۳**	۱۳۸.۱**	۱۱۸۷۹۹.۸**	۷۴۹.۹ns	۶۸.۴ns	ns***	8.895*	0.184 ns
۲	مالج(A)	۲	۸.۴**	۱۳۳.۳**	۱۸۴۰۸۳.۹**	۴۰۱۷۴.۳**	۴۵۲۳.۵**	.۱***۳۹۷	54.997**	20.521**
۳	خدمات(B)	۲	۳.۶**	۱۴.۰**	۵۴۶۳۶.۷**	۸۰۲.۸ ns	۵۴.۱ ns	ns	34.034**	0.886ns

تعديل دمای خاک شد اما در میزان اکسیژن خاک تاثیری نداشت (۷) مالج پاشی با کمپوست منافع زیادی در باغها دارد مثل کاهش رشد علف هرز، حفظ رطوبت و حاصلخیزی خاک کاهش استرس آبی گیاهان و کاهش آبیاری می شود از استرس خشکی، گرما، سرمومیت مواد معدنی، سرماوندمک می کاهد (۸).

مواد و روش ها

جهت تعیین اثر مالج های مختلف بر روی صفات رویشی گل جعفری آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در موسسه تولیدات گیاهی سازمان پارک ها و فضای سبز شهر مشهد انجام شد. خاک محل اجرای طرح دارای بافت لوئی شنی با PH برابر ۷.۳ بود. تیمار ها عبارت بودند از شاهد (بدون مالج)، چپس چوب و کمپوست هر کدام در سه خامات ۱۰، ۱۲ و ۱۴ سانتیمتر. چپس چوب مورد استفاده از کارگاه تولید چپس چوب شهرداری مشهد که درختان خشک شده فضای سبز را به چپس چوب تبدیل می کند و کمپوست از کارخانه کمپوست زباله شهری شهرداری مشهد تهیه شده بود.

نشاء های گل جعفری در هفته آخر فروردین ۸۷ به محل طرح منتقل شدند آبیاری به صورت هفتۀ ای دوبار انجام می شد. و چین علف هرز یکبار در طول فصل رشد و به فاصله یکماه از یکدیگر انجام شد و علف های هرز جمع آوری شده توزین شد. درجه حرارت خاک در عمق ۵ سانتیمتری خاک و هفته ای یکبار اندازه گیری می شد. رطوبت خاک به روش اندازه گیری وزنی و هفته ای یکبار انجام گردید. صفات رشدی شامل وزن تر و خشک، ارتفاع بوته از سطح خاک، طول و وزن ریشه در پایان فصل رشد اندازه گیری شد.

نتایج و بحث

جدول آنالیز واریانس دمای خاک در عمق ۵ سانتیمتری، رطوبت خاک در عمق ۱۰ سانتیمتری، رشد علف هرز، وزن تر، خشک، ارتفاع بوته، طول ریشه و وزن ریشه گل های جعفری

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱.۸۸۷**	9.566*	89.367 **	1961.۸ *	19346.۷**	29503.115*	3.5 ns	1.0**	۱	۱	۱
.۰۲	2.570	30.289	309.6	2914.3	13245.8	1.2	.۰۰۸	۲۱	خطا آزمایش	۰

میانگین مربعات MS = تفاوت معنی داری در بین تیمارهای مختلف دیده نمی شود
**= تیمارهای مختلف در سطح ۰/۰۱ دارای اختلاف هستند

دادهای اختلاف هستند * = تیمارهای مختلف در سطح ۰/۰۵ دارای اختلاف هستند

جدول مقایسه میانگین دمای خاک در عمق ۵ سانتیمتری، رطوبت خاک در عمق ۱۰ سانتیمتری، رشد علف هرز، وزن تر، خشک، ارتفاع بوته، طول ریشه و وزن ریشه گل های جعفری

در هرستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند دارای تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۰/۰۵ از نظر آماری (آزمون چند دامنه دانکن) نیستند.

۱- دمای خاک:

بررسی دمای خاک در عمق ۵ سانتیمتری خاک نشان داد که سطوح مختلف مالج، ضخامت و اثر متقابل این دو شاخص در سطح احتمال ۰/۰۱ تفاوت معنی داری هستند همچنین کمپوست با ضخامت ۱۲ سانتیمتری بیشترین دمara نشان داد دارای اختلاف معنی داری با شاهد در سطح ۰/۰۱ با شاهدو کمپوست با ضخامت ۱۳ سانتیمتر پرورد و کمترین مقدار چیزی چوب با ضخامت ۱۲ سانتیمتر

ردیف	نیمار	دهمای خاک سانتیگراد	درصد رطوبت وزنی خاک	علف هرز گرم	وزن گرم	وزن خشک گرم	ارتفاع سانتیمتر	طول رشه سانتیمتر	وزن رشه گرم
۱	چوب با ضخامت ۱۳ سانتیمتر	۲۳.۲۴	C	۷۲۳.۸	B	۴۴.۶۰	CD	۵۸.۳۳	DE
۲	چوب با ضخامت ۱۲ سانتیمتر	۲۲.۸۵	C	۷۸۵.۹	A	۲۶۹.۶	A	۷۲.۴۰	BC
۳	چوب با ضخامت ۱۲ سانتیمتر	۲۱.۹۰	D	۷۰۷.۲	C	۲۴۹.۳	A	۶۷.۸۲	AB
۴	کمپوست با ضخامت ۱۳ سانتیمتر	۲۵.۰۱	A	۹۲۶.۲	AB	۲۵۷.۸	A	۶۵.۸۸	ABC
۵	کمپوست با ضخامت ۱۲ سانتیمتر	۲۴.۱۱	B	۱۰۷۲.	A	۱۵۵.۱	B	۶۲.۹۲	BCD
۶	کمپوست با ضخامت ۱۲ سانتیمتر	۲۳.۰۵	C	۷۴۵.۴	B	۱۲۶.۸	B	۶۲.۴۲	BCD
۷	شاهد (بدون مالج)	۲۴.۱۷	B	۶۷۵.۲	C	۱۰۴.۸	B	۳۳.۳۸	D
								۱۰.۳۹	E

بود به نظر می رسد رنگ تیره کمپوست در ضخامت کم باعث افزایش دمای خاک نسبت به شاهد شده امادر مابقی تیمارها با افزایش ضخامت دمای خاک کمتر می شود.

۲- میزان رطوبت خاک (درصد رطوبت وزنی خاک):

بررسی درصد رطوبت وزنی خاک نشان داد که در عامل مالج و ضخامت از نظر آماری در سطح ۰/۰۱ اختلاف معنی داری وجود دارد اما در اثر متقابل این دو عامل اختلاف معنی داری دیده نمی شود. افزایش ضخامت لایه مالج باعث افزایش رطوبت خاک می شود اما اختلاف معنی داری میان چیزی و کمپوست دیده نمی شود به نظر می رسد که با اینکه درجه حرارت کمپوست در ضخامت مشابه بالاتر است اما به دلیل اینکه ذرات کمپوست ریزتر است خلل و فرج کمتری دارد و جبران دمای بالاتر را کرده و تبخیر و تعرق آن در ضخامت برابر مشابه چیزی چوب است.

۳- رویش علف هرز:

بررسی میزان رویش علف هرز نشان داد که در عامل مالج و ضخامت از نظر آماری در سطح ۰/۰۱ اختلاف معنی داری وجود دارد اما در اثر متقابل این دو عامل اختلاف معنی داری دیده نمی شود. در مورد علف هرز به نظر می رسد با حفظ رطوبت خاک

توسط لایه مالج در ضخامت کم به رویش علف هرزکمک می کند در ضخامت ۸ سانتیمتر هردو نوع مالج ما بیشترین رشد علف هرز را در هردو نوع مالج نسبت به شاهد داری اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰ بودند که مالج کمپوست با ضخامت ۸ سانتیمتری بیشترین مقدار رشد علف هرز را نشان می دهد که احتمالاً با مواد غذایی موجود در کمپوست رابطه دارد و دلیل اینکه لایه مالج با ضخامت ۴ سانتیمتر کمتر از لایه ۸ سانتیمتر رویش علف هرز را نشان می دهد دمای بالای خاک در آنها و رطوبت کمتر آنها باشد در مورد شاهد هم به دلیل رطوبت کمتر لایه سطحی امکان رویش برای علف های هرز کمتر می شود

صفات رویشی:

در مورد وزن تر و خشک تایج کاملاً مشابه است یعنی در عامل مالج و ضخامت از نظر آماری در سطح ۰/۰ اختلاف معنی داری وجود دارد اما در اثر مقابل این دو عامل اختلاف معنی داری دیده نمی شود. در مالج چیپس چوب با افزایش ضخامت لایه مالج وزن تر و خشک اضافه می شود که می توان دلیل آن را به تغییر شرایط خاک مثل رطوبت و درجه حرارت نسبت داد اما دلیل اینکه با افزایش ضخامت مالج کمپوست از ۴ به ۸ سانتیمتر ۱۲ وزن تر، وزن خشک و ارتفاع بوته از سطح خاک کم می شود احتمالاً تأثیر مواد موجود در کمپوست می باشد و بحث بر سر اینکه چه موادی سبب کاهش رشد می شود نیاز به تحقیقات بیشتری دارد دارد. در شاخص طول ریشه در سطح دو عامل مالج و ضخامت از نظر آماری در سطح ۰/۰ دارای اختلاف معنی داری بودند اما اثر مقابل این دو عامل در سطح ۰/۰ اختلاف معنی دار بر انشان داد طول ریشه با افزایش ضخامت لایه مالجی در هر دو نوع مالج افزوده می شود که می تواند به دلیل شرایط بهتر محیط باشد اما در مقایسه بین چیپس چوب و کمپوست به نظر می رسد بغير از ضخامت ۱۲ سانتیمتری در هر دو نوع مالج در دو ضخامت ۴ و ۸ سانتیمتری طول ریشه در چیپس چوب رشد بیشتری را نشان داد که احتمالاً اثرات متقابل دما و رطوبت خاک را با اثر احتمالی مواد شیمیایی شسته شده از لایه مالجی باشد که نسبت این مواد در کمپوست بسیار بالاتر است در شاخص وزن ریشه عامل مالج و اثر مقابل مالج و ضخامت در سطح ۰/۰ اختلاف معنی داری را نشان می داد اما در عامل ضخامت اختلاف معنی داری دیده نمی شد در مورد مالج چیپس چوب بهراحتی در مورد این شاخص قضاوت کرد که با افزایش ضخامت مالج طول ریشه مالج چیپس چوب باشد مطالعت بیشتری صورت پکرید چون گلهای قصلی مثل گل جعفری داری ریشه سطوح هستند ممکن است کاملاً تهت تأثیر هاد شسته شده از لایه مالج کمپوست قرار بگیرند. در مجموع بهترین نتایج در این تحقیق مربوط به مالج چیپس چوب با ضخامت های ۸ و ۱۲ سانتیمتر بود نکته قابل توجه این است که استفاده از لایه مالج کمپوست به تنها به دلیل بالا بودن EC و مواد غذایی و شیمیایی موجود در آن ممکن است نتایج متفاوتی را داشته باشد و با توجه به بالا بودن EC خاک در منطقه نیمه خشکی مثل مشهد توصیه می شود در صورت استفاده از کمپوست زیاله شهری بعنوان مالج محلولی از چیپس چوب و کمپوست استفاده شود

منابع:

- راد، م: ۱۳۷۶. بررسی اثرات مواد پوشاننده بر کاهش میزان آب مورد استفاده در استقرار گیاه تاغ در بیابان های رسی. پژوهشناسانگی. سال ۱۰، شماره ۳۷.
- رحیمی میدانی، ا. ۱۳۷۴. اثر خاکپوش های مختلف و تناوبهای آبیاری روی رشد و عملکرد کلم-گل. رقم ۱-PSB، نهال و بذر. سال ۱۱، شماره ۳.
- کرکان، م. فولادی تالاری، خ و نارونی، ن. ۱۳۷۲. باگبانی و تزئینی. انتشارات سازمان و پارکها و فضای سبز، جلد ۳-۲۹-۷۶

Debashis Chakraborty, Shantha Nagarajan, Agricultural Water Management ,volume95,issue12,Deceambert2008,Pages1323,1334-

5-Dostalekj., Weber, M ., Matula , S. Frantik , T ., Forest stand resoration in the agricultural landscape : The effect of different methods of planting establishment . Ecological Engineering

7-Agassi, M.levy , G.J.Hadas , Benyamini , Y. Zhevelev, H . Fizik, E.Gotessman, M . and Sasoon , N . 2004 . Mulching with composted municipal solid wastes in central Negev . Israel : I.effets on minimizing rainwater losses and on hazards to the environment Soil and tillage Research . Vol : 78.103.-113

7-Greenly .K.M, Rakow.D.A, 1995, The effect of wood mulch type and depth on weed and tree growth and certain soil parameters Journal of Arboriculture vol :21(5)

8-Application Guidelines for Compost Mulches for Orchard Production in NSW
Second Edition,2007, Pages 5-12-94

Abstract:

The effects of two mulching materialswood and compost(CMSW)) on soil temperature and moisture,weed growth and growth of *Tagetes patula* cv duragon Bee were studid. The experimental design was **factorial** on randomized complete block, with a factorial arrangement of treatments replicated four times . Treatments included no mulching and wood chips mulch and compost mulch each in three thickness 4, 8 and 12 cm . During the study period from 1April to 20 September 2008, soil temperature and moisture, weed growth factors include fresh and dry weight, hight of plant, length and weight of root head were measured. soil temperature decrease with increasing of mulch thickness but compost mulch in same thickness have more higher temperature than wood chips mulch because of darkness of compost. soil moisture increase with increasing of mulch thickness. In another caseweed growth, mulch with 8cm thickness in two kindtype, have more growth of weeds . the most fresh and dry weight and hight of plant was in wood chips mulch with 8cm thickness. like this, The most length and weight of root was in wood chips mulch with 12cm thickness. altogether increase of mulch thickness help to beter growth of plants and wood chips mulch with 12cm thickness have the best results.

Key world: mulch,wood chips mulch , compost mulch , *Tagetes patula*