



۲۰

دانشکده فنی اصفهان

مجله علوم و فنون

کلستانه متابع طبیعت

تعیین قنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود

ایران با استفاده از مارگرهای [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.]

مولکولی RAPD

فرهاد شکوهی فر، عبدالرضا باقری و ماهر خفاجتی رستگار

تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود [*Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD

فرهاد شکوهی فر^۱، عبدالرضا باقری^۲ و ماهرخ فلاحتی رستگار^۳

چکیده

اطلاعات اندک موجود در مورد تنوع قارچ *Ascochyta rabiei* یکی از مهمترین عوامل محدود کننده برنامه های اصلاحی برای مقابله نسبت به بیماری برق زدگی نخود است. در این پژوهش تنوع ژنتیکی جمعیت این قارچ در ایران بررسی شده است. بدین منظور، ۲۶ جدایه از ۱۶ استان کشور انتخاب و تنوع ژنومی آنها با استفاده از روش RAPD ارزیابی شد. با به کارگیری ۱۲ آغازگر تصادفی، الگوی باندی DNA جدایه ها تهیه شد. و بر این اساس تنوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی بین جدایه ها محاسبه و روابط خوب شاوندی آنها با استفاده از نجزیه خوشه ای تعیین گردید.

تابع نشان داد که روش RAPD ابزاری قوی برای تعیین ژنومی جمعیت *A. rabiei* است. در میان آغازگر های به کار برده شده ۱۰ آغازگر پلی مورفیسم نشان دادند. بر اساس داده های به دست آمده، شاخص تنوع ژنتیکی جدایه ها ۹۸ درصد برآورد شد. که نشان دهنده تنوع ژنتیکی زیاد این بیمارگر در ایران است. فاصله ژنتیکی بین جفت جدایه ها از ۰/۱۶ تا ۰/۶۱، متغیر بود. بیشترین فاصله ژنتیکی بین جدایه های ۲۰ و ۲۲ (از استان های فارس و گلستان). و کمترین فاصله بین جدایه های ۱۲ و ۲۱ (از استان های مرکزی و مازندران) دیده شد. در سطح ثابت ۹۰ درصد، کل جدایه ها در ۲۲ گروه ژنتیکی جداسازی و از حرف A تا V نام گذاری شدند. و نیز الگوی پراکنش آنها در ایران مشخص شد.

واژه های کلیدی: *Ascochyta rabiei*، تنوع ژنتیکی، فاصله ژنتیکی، RAPD

^۱ مریم بیونکبرلورزی کشاورزی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

^۲ استاد اصلاح بنایات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

^۳ استاد بیماری های گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه

(Random amplified polymorphism) RAPDs میکروساتلاتیت‌ها (Microsatellites) اشاره کرد (۸، ۱۷، ۱۸ و ۱۹)، ولی تنها شمار کمی از آنها برای بررسی جمعیت A. rabiei مفید بوده‌اند (۲۰). در این میان، بوزاند و همکاران (۸) با به کارگیری آیروزایم‌ها، تنوع موجود در الگوهای آیروزایمی جدایه‌های حمچ آوری شده از الجزایر، تونس و سوریه را مقایسه کردند، ولی تنها میان گونه‌های مختلف جنس Ascochyta تفاوت‌های جزئی یافتند.

بر خلاف آیروزایم‌ها، مارکرهای مولکولی DNA در بررسی جمعیت این قارچ قابلیت بیشتری نشان دادند، به طوری که ویسینگ و همکاران (۱۹) با به کارگیری توالی‌های تکراری مینی‌ساتلاتیت‌ها به عنوان کاوشگر (Probe) در روش RFLP، توانستند شش نژاد موجود در سوریه (۱۶) را با دقت زیادی از یکدیگر جدا کنند. کارایی مارکرهای DNA در شناسایی تنوع آیروزایم A. rabiei در پژوهش‌های دیگری نیز تأیید شده است. جمعیت A. rabiei در این روش میان ۱۷ گروه ژنتیکی تقسیم‌بندی کردند. آدوپا و همکاران (۱۸) افزون بر به کارگیری مینی‌ساتلاتیت‌ها، از روش RAPD نیز برای بررسی جمعیت این بیمارگر در سوریه استفاده کردند و توانستند شش نژاد تعیین شده به وسیله ردی و کبابه (۱۶) و نیز سه گروه پاتوتیپی را که توسط خود آنها تعیین شده بود، از یکدیگر جدا کنند. هرچند در این پژوهش روش RAPD در تشخیص تنوع موجود در جمعیت A. rabiei قابلیت زیادی نشان داد، ولی از به کارگیری توان این روش با روش مینی‌ساتلاتیت نتایج بهتری به دست آمد (۱۸).

با این حال، روش RAPD به دلیل مزایایی چون استفاده نکردن از مواد رادیواکتیو، نیاز به DNA ژنومی اندک و هزینه کم، برای بررسی جمعیت موجودات زنده کاربرد بیشتری دارد، چون معمولاً در این بررسی‌ها شمار زیادی نمونه ارزیابی شده و روش‌های دیگر، علاوه بر صرف وقت زیاد، به اطلاعات اولیه‌ای از ژنوم موجودات نیاز دارند که در مجموع مقرر نب

برق‌زدگی یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های نخود (Cicer arietinum L.) در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه است (۱۱ و ۱۵). این بیماری به وسیله قارچ [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] ایجاد می‌شود، و در شرایط رطوبت و دمای مناسب خسارت زیادی به مزارع نخود وارد می‌سازد (۱).

هرچند از آغاز دهه ۶۰ میلادی برای مقابله با این بیماری از ارقام مقاوم استفاده شده است، ولی نبود اطلاعات کامل از تبع قارچ، همواره برنامه‌های اصلاحی را با مشکل مواجه کرده است، به گونه‌ای که مقاومت ارقام اصلاح شده پس از مدتی شکسته شده، و از سوی دیگر به دلیل تفاوت تنوع این بیمارگر در مناطق مختلف، واکنش ارقام در تمام مناطق یکسان نبوده است (۱۵). بنابراین، پیش از اجرای برنامه‌های اصلاحی، برای دست‌یابی به ارقام مقاوم، باید با استفاده از روش‌های مطمئن و دقیق، جمعیت این بیمارگر را بررسی کرده، تنوع موجود در هر منطقه را شناسایی، و کل گروه‌های تعیین شده را در برنامه‌های گزینش ارقام به کار گرفت، تا منابع مقاوم مناسب برای هر منطقه شناخته شوند.

تا کنون گزارش‌های فراوانی از گروه‌بندی جدایه‌های این قارچ بر اساس صفات ظاهری (۶، ۵ و ۹) یا قدرت بیماری‌زایی (۱۰، ۱۱ و ۱۶) ارائه شده است. ولی به طور کلی، این روش‌ها افزون بر صرف وقت و زحمت زیاد، از تکرارپذیری کمی برخوردار بوده و نتایج به دست آمده قابل اطمینان نیست. از این رو، پژوهندگان همواره به دنبال روش‌های جای‌گزین مطمئن‌تری برای شناسایی تنوع در جمعیت این بیمارگر بوده‌اند. پژوهش‌ها نشان داده است، هنگام کار با صفات کمی، یا صفاتی مانند بروز و شدت بیماری، که به دلیل حساسیت به شرایط محیطی تغییرپذیری زیادی نشان می‌دهند، بهتر است از مارکرهای بیوشیمیایی و مولکولی برای شناسایی و جداسازی تنوع استفاده شود (۲، ۴ و ۲۰). از جمله مارکرهایی که تا کنون به کار گرفته شده است می‌توان به آیروزایم‌ها (Isozymes)، (Restriction fragment length polymorphism) RFLPs

۱۰۰ میکرولیتر از محلول ۲۵ درصد SDS به آن اضافه، و به آهستگی در دمای اتاق به مدت یک ساعت به هم زده شد. پس از آن ۳۰۰ میکرولیتر محلول کلرور سدیم ۵ مولار به آن افزوده و به آهستگی به هم زده شد. سپس ۲۶۰ میکرولیتر محلول CTAB/NaCl (کلرور سدیم ۰/۷ مولار و CTAB ۰/۶ درصد) به آن اضافه، و پس از به هم زدن به مدت ۱۵ دقیقه در ۶۵ درجه سانتی گراد تیمار شد. حدوداً چهار میلی لیتر محلول کلروفرم ایزوآمیل الكل (به نسبت ۲۴ به ۱) به آن افزوده، پس از چند بار به هم زدن به مدت ۱۲ دقیقه با سرعت ۹۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.

پس از اتمام سانتریفیوژ، فاز بالایی به لوله جدید منتقل و ۰/۶ حجم حاصل ایزوپروپانول سرد به آن اضافه گردید. لوله آزمایش به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری، و سپس ۱۵ دقیقه با سرعت ۳۱۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از حذف محلول بالایی، رسوب DNA با الكل سرد ۷/۷٪ شستشو و در دمای اتاق نگهداری شد تا خشک شود. با افزودن ۳۰۰ میکرولیتر بافر TE (۱۰ میلی مولار Tris-HCl با pH=۸، یک میلی مولار EDTA با pH=۸) رسوب DNA حل شده، به آن ۳۰۰ میکرولیتر استات سدیم سه مولار و ۶۶۰ میکرولیتر اتانول خالص سرد اضافه شد. نمونه برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری، و سپس به منظور رسوب دادن DNA، ۱۵ دقیقه با سرعت ۳۱۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شده، رسوب DNA پس از تخلیه محلول فوقانی با الكل سرد ۷/۷٪ شستشو، و اجازه داده شد در دمای اتاق خشک شود. با توجه به مقدار DNA رسوب کرده، نمونه حاصل در ۱۰۰ تا ۳۰۰ میکرولیتر بافر TE حل شد. در مرحله پایانی به منظور رسوب ناحالصی ها و حذف DNA حل نشده، نمونه به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۵۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ، و بافر حاوی DNA به لوله جدید منتقل شد، و تا هنگام تعییس کمیت و کیفیت در دمای چهار درجه سانتی گراد نگهداری گردید.

برای تعیین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده، ۰/۰ میکرولیتر از هر نمونه ۲۵۰ برابر با بافر TE رفیق شد. پس از

صرفه نمی باشد. اگرچه استفاده از روش RAPD با مشکلاتی چون تکرار پذیری کم برخی از باندها، حساسیت شدید به شرایط واکنش، و بهینه سازی (Optimization) طولانی همراه بوده است، ولی در حال حاضر به طور گسترده ای در آزمایش های جمعیت و تعیین تنویر به کار گرفته می شود (۱۸، ۲۰ و ۲۱).

این پژوهش با هدف بررسی تنویر ژنتیکی جمعیت قارچ A. rabiei و تعیین روابط خویشاوندی جدایه های جمع آوری شده از ایران انجام شد. همچنین، تلاش شد تا گذشته از شناسایی و نام گذاری گروه های ژنتیکی این بیمارگر، الگوی پراکنش آنها نیز در کشور مشخص گردد

مواد و روش ها

به منظور تعیین تنویر ژنتیکی جمعیت A. rabiei ۲۶ جدایه به عنوان نماینده جمعیت این بیمارگر در ایران بر اساس نتایج پژوهش های گذشته (۲) انتخاب (جدول ۱)، و با استفاده از آغازگر تصادفی (Random primer) (۱۰ نوکلوتیدی) در روش مولکولی RAPD مقایسه شدند.

DNA تهیه بافت میسلیوم و استخراج

بیست و شش جدایه انتخاب شده در ویال های حاوی محیط کشت Potato Dextrose Broth (PDB) کشت، و در شرایط دمایی ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتی گراد، روی همزن با سرعت ۱۲۰ دور در دقیقه به مدت چهارده روز نگهداری شد.

جدایه ها بر اساس روش Cetyl Trimethyl CTAB (Ammonium Bromide) اصلاح شده استخراج شد (۱۸). در این روش حدود ۲-۱ گرم بافت میسلیوم قارچ همراه با ازت مایع، با استفاده از هاون به خوبی پودر شد. حدود یک گرم پودر حاصل را به لوله آزمایش ۲۵۰ میلی لیتری منتقل کرده، دو میلی لیتر بافر استخراج (۵۰ میلی مولار Tris-HCl با pH=۸، ۱۰۰ میلی مولار EDTA و ۱۵۰ میلی مولار NaCl) به آن افزوده و به خوبی به هم زده شد تا به صورت سوسپانسیون درآید. سپس

جدول ۱. شماره و مثاً ۲۶ جدایه از جمعیت قارچ *A. rabiei* در ایران

شماره جدایه	محل جمع‌آوری	شماره جدایه	محل جمع‌آوری
۱	کرمانشاه	۱۴	همدان
۲	کرمانشاه	۱۵	همدان
۳	لرستان	۱۶	تهران
۴	لرستان	۱۷	خراسان
۵	فارس	۱۸	کردستان
۶	فارس	۱۹	زنجان
۷	ایلام	۲۰	قزوین
۸	ایلام	۲۱	گلستان
۹	ایلام	۲۲	گلستان
۱۰	تریز	۲۳	اردبیل
۱۱	مرکزی	۲۴	ارومیه
۱۲	مرکزی	۲۵	ارومیه
۱۳	همدان	۲۶	مازندران

تعیین میزان جذب هر یک از نمونه‌ها در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر، خلوص DNA به درجه سانتی‌گراد و ۴۰ چرخه با یک دقیقه در ۹۲ درجه سانتی‌گراد، ۳۰ ثانیه در ۳۶ درجه سانتی‌گراد، یک دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد، و مرحله تکثیر سهابی با یکنچه دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد بهینه‌سازی و انعام گردید. در یک واکنش به جای DNA ژنومی آب مقطر استریل اضافه گردید. و بدین وسیله امکان وجود آلدگنی در واکنش‌های انجام شده کنترل شد. محصول واکنش در زل آگاروز ۱٪ تزریق و در مافر TAE شد. محفوظات واکنش در ۴°C نگهداری شدند.

ثبت داده‌ها
شکل‌های به دست آمده با استفاده از سرم افزار LabWorksTM ۷.۳ تحریه و تحلیل شده. تنها سایده‌های قوی انتخاب و به

تعیین میزان میزان جذب هر یک از نمونه‌ها در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر، خلوص DNA به دست آمده با محاسبه نسبت حدب در طول موج ۲۶۰ به ۲۸۰ نانومتر محاسبه، و غلظت هر نمونه با در نظر گرفتن غلظت ۵۰ میکروگرم در میلی‌لیتر به ارای هر واحد OD (Optical density) در طول موج ۲۶۰ نانومتر تعیین شد.

تجزیه RAPD

دوازده آغازگر (جدول ۲)، که در آزمایش آدوپا و همکاران (۱۸) نوع حوسی بین جدایه‌های *A. rabiei* نشان داده بودند، از شرکت اوپسرن (Operon Technologies, Alameda, California) تهیه شد. تکثیر DNA در حجم ۲۵ میکرولیتر حاوی ۰/۵ میکرولیتر بافر 10X PCR (Tris-HCl ۱۰ میلی‌مolar با pH=۸، زلاتین ۰/۰۰۱ درصد، KCl ۵۰ میلی‌مolar، ۲۰۰ میکرومول مخلوط dNTPs (سینا زن)، ۱۵ پیکومول آغازگر، ۱۵ نانوگرم DNA ژنومی، یک واحد آنزیم تک پلیمرار (Taq polymerize) (سینا زن) و یک قطره روغن معده‌ی (سیگما) برای جلوگیری از تبخیر در دستگاه ترموسایکلر (Maxi-Gen[®]) برای جلوگیری از تبخیر در دستگاه ترموسایکلر (Maxi-Gen[®])

جدول ۲. نام و توالی ۱۲ آغازگر^۱ تصادفی (۱۰ نوکلوتیدی) به کار برده شده در تجزیه RAPD

ردیف	نام آغازگر	توالی آغازگر
۱	OPI-01	5-ACCTGGACAC
۲	OPI-16	5-TCTCCGCCCT
۳	OPJ-01	5-CCCGGCAAA
۴	OPJ-10	5-AAGCCCGAGG
۵	OPJ-15	5-TGTAGCAGGG
۶	OPJ-18	5-TGGTCGCAGA
۷	OPK-09	5-CCCTACCGAC
۸	OPK-12	5-TGGCCCTCAC
۹	OPK-15	5-CTCCGCCAAA
۱۰	OPL-05	5-ACGCAGGCAC
۱۱	OPL-16	5-AGGTTGCAGG
۱۲	OPM-02	5-ACAACGCCCTC

Operon Technologies (Alameda, California)

و نمودار روابط حویشاوندی در این فاصله گروهبندی شد
 $\bar{X} = \bar{S} \cdot t_{\alpha=10\%}$ = فاصله معادل ۱۰ درصد نداشتن تشابه
 \bar{X} میانگین ماتریس فاصله‌های ژنتیکی، S واریانس ماتریس
 فاصله‌های ژنتیکی و n عدد استاندارد معادل حدود احتمال α
 است. شاخص تنوع ژنتیکی جدایه‌ها نیز با استفاده از فرمول زیر
 محاسبه شد.
 (۱۴)

$$H = \left[\frac{n}{(n-1)} \right] \left[1 - \sum X_i^2 \right]$$

که در آن H شاخص تنوع ژنتیکی، n شمار افراد مورد بررسی و
 X_i فراوانی نسبی هر ژنوتیپ است.

کدهای صفر و بک تبدیل، و پس از انتقال داده‌ها به برنامه Excel 97، تنها مکان‌هایی که پلی‌مورفیسم نشان داده بودند برای انجام محاسبات بعدی انتخاب شدند.

فاصله ژنتیکی (Genetic distance) و تنوع ژنتیکی (diversity)

بر اساس فرمول اصلاح شده نتی (۱۳) فاصله ژنتیکی میان تمام چفت جدایه‌ها محاسبه و ماتریس فاصله تشکیل شد.
 $d_{ij} = -\ln(n/N)$
 راه فاصله ژنتیکی میان دو فرد ۱ و ۲ و n شمار لوکوس‌های مشابه میان دو فرد، و N شمار کل لوکوس‌های مورد بررسی در همیعت است. ماتریس حاصل با روش UPGMA (میانگین حسابی غیر رزنی) در برنامه آماری Statistica 5.5 تجزیه خوشه‌ای شد، و نمودار روابط حویشاوندی جدایه‌ها تهیه گردید. برای تعیین سطح تشابه ۹۰ درصد و حدسازی گروه‌های ژنوتیپی، عدد معادل ۱۰ درصد از جدول اعداد استاندارد ۱ به دست آمد، و با استفاده از فرمول زیر، فاصله مورد نظر تعیین

نتایج و بحث

تنهای ۱۰ آغازگر در مکان‌های تکثیر شده پلی‌مورفیسم نشان دادند (جدول ۳) دو آغازگر OPJ-10 و OPJ-16 با این که در مجموع بیش از ۱۵ منطقه از ژنوم جدایه‌ها را تکثیر کردند، ولی نتوانستند پلی‌مورفیسمی را شناسایی کنند. در واکنش‌های انحام شده، بسته به نوع آغازگر، بین ۴ تا ۱۳ منطقه از DNA تکثیر

جدول ۳. نتایج تجزیه ژنوم ۲۶ جدایه *A. rabiei* با استفاده از ۱۰ آغازگر تصادفی در روش RAPD

ردیف	نام آغازگر	شمار لوکوس تکثیر شده	شمار باند پلی مورف	شمار ژنتوتیپ جدا شده	شاخص نوع ژنتیکی
۱	OPI-01	۱۳	۶	۱	۰/۹۰
۲	OPJ-01	۱۲	۲	۴	۰/۰۰
۳	OPJ-15	۹	۲	۳	۰/۷۰
۴	OPJ-18	۱۲	۲	۳	۰/۶۳
۵	OPK-09	۵	۱	۲	۰/۸۷
۶	OPK-12	۱۲	۳	۵	۰/۸۰
۷	OPK-15	۶	۴	۱۰	۰/۸۸
۸	OPL-05	۴	۲	۴	۰/۷۱
۹	OPL-16	۱۱	۴	۷	۰/۸۳
۱۰	OPM-02	۹	۴	۷	۰/۸۲

ولی تنها شش منطقه از ژنوم جدایه‌های سوریه را تکثیر و فقط دو ژنتوتیپ در میان آنها شناسایی کرده بود. این اختلافات در نتایج به دست آمده از آغازگرهای دیگر نیز از جمله OPJ-01، OPM-01 و OPK-12 مشهود است.


در مجموع، مقایسه نتایج نشان می‌دهد که جمعیت این بیمارگر در مناطق مختلف با یکدیگر بسیار متفاوت است، و این مسئله می‌تواند یکی از دلایل واکنش متفاوت ارقام مقاوم در مناطق مختلف به حساب آید.

نوع ژنتیکی و فاصله ژنتیکی

شاخص نوع محاسبه شده بر اساس داده‌های به دست آمده از هر آغازگر بین ۰/۹۰ تا ۰/۸۷ متغیر بود (جدول ۳). کمترین شاخص به آغازگر OPK-09 مربوط بود (شکل ۲)، در حالی که بر اساس آغازگرهای OPI-01 و OPK-15 بیشترین ضریب تنوع ژنتیکی محاسبه شد. شاخص تنوع بر اساس داده‌های به دست آمده از کل آغازگرها حدود ۰/۹۸ براورد شد، که در مقایسه با گزارش آدوپا و همکاران (۱۸) سیار زیاد و دلیل دیگری بر تنوع بسیار این بیمارگر در کشور است در کشورهایی مانند سوریه از ارقام مقاوم به طور گسترده

شده بود، و در مجموع ۳۰ منطقه پلی مورفیک در سطح ژنوم جدایه‌های مورد بررسی شناسایی شد، که بیشترین پلی مورفیسم شناسایی شده به آغازگر OPI-01 مربوط بود. بر پایه شمار باند پلی مورف تولید شده به وسیله هر آغازگر، بین ۲ تا ۶۴ ژنتوتیپ قابل جداسازی بود، که در این میان آغازگر OPI-01 با تشخیص ۱۱ ژنتوتیپ تنوع بیشتری را شناسایی کرد. هرچند این آغازگر نسبت به دیگر آغازگرها باند پلی مورف بیشتری را تکثیر کرد، ولی آغازگر OPK-15 در تشخیص ژنتوتیپ بازده بیشتری از خود نشان داد (شکل ۱)، زیرا با تولید چهار باند پلی مورف از شش باند تکثیر شده، ۱۰ ژنتوتیپ را در سطح جدایه‌های مورد بررسی شناسایی نمود.

مقایسه نتایج به دست آمده با گزارش‌های ارائه شده از سوریه گویای وجود اختلاف زیادی بین نمونه‌های مورد بررسی است. با این که آغازگر OPJ-15 با تکثیر ۱۲ منطقه ژنومی، ۱۳ ژنتوتیپ بین جدایه‌های سوریه شناسایی کرده بود، ولی در پژوهش حاضر با تکثیر ۹ منطقه از جدایه‌های ایران تنها OPI-01 توانست سه ژنتوتیپ را شناسایی کند. در مقابل، آغازگر OPI-01 با وجود این که با تولید ۱۳ باند و تشخیص ۱۱ ژنتوتیپ بیشترین قدرت تشخیص نوع را در جدایه‌های ایران نشان داد،




شکل ۱. الگوی پاندی تکثیر شده از DNA جدایه های *A. rabiei* با استفاده از آغازگر OPK-15. شماره هر چاهک نشان دهنده شماره جدایه و حرف M معرف مارکر وزنی (فاز لامدا برش خورده با EcoRI و HindIII) است.



شکل ۲. الگوی پاندی تکثیر شده از DNA جدایه های *A. rabiei* با استفاده از آغازگر OPK-09. شماره هر چاهک نشان دهنده شماره جدایه و حرف M معرف مارکر وزنی (فاز لامدا برش خورده با EcoRI و HindIII) است.

جمعیت بیمارگر را کاهش داد و با کشت مقابله ای ارقام مقاوم مختلف در یک منطقه تنوع آن را کنترل نمود. فاصله زنگی چهت جدایه های بین ۰/۱۶ تا ۰/۶۱ متغیر بود، و نشان داد که علاوه بر این که هیچ کدام از جدایه های از یک کلی نبوده اند، جدایه هایی با فاصله کمتر از ۰/۱۶ نیز در بین تموههای مورد بررسی وجود نداشته است. به نظر می رسد به دلیل اندک بودن شمار جدایه های درصدی از تنوع در نظر گرفته نشده، ولی مشاهده جدایه هایی با فاصله زنگی ۰/۶۱، شایان توجه است، زیرا حداقل فاصله گزارش شده در مناطق دیگر در حدود ۰/۳۹ بوده است (۱۸). وجود این فاصله زنگی بسیار در

استفاده می شود، و بدین وسیله تنوع جمعیت بیمارگر تا حد زیادی کنترل می گردد. زیرا با کشت ارقام مقاوم در یک منطقه تنها ژنوتیپ های محدودی از بیمارگر قادر به ایجاد بیماری بوده و در تشکیل جمعیت بیمارگر در سال های بعد مؤثر خواهد بود، و بدین صورت تنوع موجود در جمعیت بیمارگر کاهش می یابد. ولی در ایران، معمولاً خرد پدر نخود مرسوم نیست، و کشاورزان بیشتر بذور خود را از محصول سال گذشته انتخاب می کنند. بنابراین، به دلیل اثر متقابل میزبان و بیمارگر، تنوع زیاد میزبان منجر به تنوع زیاد بیمارگر در منطقه می شود. به نظر می رسد با اعمال فشار گریزشی میزبان بتوان تنوع موجود در

شکل ۳. روابط خویشاوندی جدایه‌های فارج *A. rabiei* در ایران بر اساس فاصله ژنتیکی به دست آمده از تجزیه RAPD

*: شماره جدایه‌ها

**: گروه‌های ژنتیکی

***: محل جمع آوری جدایه‌ها

****: فاصله متعادل سطح ثابت ۹۰ درصد و مبنای گروه‌بندی و جداسازی ژنتیک‌ها

حالی که گروه‌های دیگر دارای جدایه‌هایی با مشاهیر یکسان بودند. در میان نمونه‌های مورد بررسی دو جدایه ۲۰ و ۲۲ شاهد بیشتری به هم داشتند. پس از آنها جفت جدایه‌های ۱ و ۲ (از کرمانشاه)، ۴ و ۱۷ (از خراسان و لرستان) و ۲۱ و ۲۳ (از گلستان و اردبیل) نسبت به دیگر نمونه‌ها در فاصله کمتری از یکدیگر قرار داشته و در فاصله ۰/۲۰ دو میان سطح گروه‌بندی را تشکیل دادند. همان گونه که در شکل ۴ دیده می‌شود بین مشاهیر

جدایه‌های مورد بررسی دلیل دیگری بر تنوع زیاد این بیمارگر در ایران است.

روابط خویشاوندی جدایه‌ها در شکل ۳ نشان داده شده است. در فاصله ژنتیکی برابر سطح ثابت ۹۰ درصد، ۲۲ گروه ژنتیکی جدا و از حرف A تا V نام‌گذاری شد. در این میان چهار گروه A, E, N و O دارای دو عضو و بقیه تک عضوی بودند. در گروه A تنها جدایه‌های کرمانشاه قرار گرفتند، در



شکل ۴. الگوی پراکنش ۲۲ گروه ژنوتیپی قارچ *A. rabiei* در ایران بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه RAPD. حروف، معرف گروه ژنوتیپی موجود در هر منطقه است.

تولید مثل جنسی را از عمدۀ ترین عوامل تأثیرگذار در ایجاد تنوع دانسته‌اند (۱۲ و ۱۶)، ولی به نظر می‌رسد افزون بر موارد فوق، بود فشارهای میریان مقاوم از جمله عوامل مهمی باشد که در عدم کنترل تنوع در جمعیت بیمارگر نقش دارد. این مسئله در کشورهایی مانند ایران، که از ارقام مقاوم به طور گسترده استقلال نشده مشهود است، در حالی که در کشورهای دیگر (۱۰ و ۱۸) به دلیل اصلاح، معرفی و کشت ارقام مقاوم به طور مستمر، نوع این بیمارگر تا حد زیادی کنترل شده است.

و گروه ژنوتیپی جدایه‌ها ارتباط محسوسی وجود ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد اگر نخست مناطق مختلف بر اساس شرایط اقلیمی، نوع ارقام زیر کشت و تاریخ کاشت گروه‌بندی شود، ارتباط بهتری بین منشأ و گروه ژنوتیپی جدایه‌ها مشاهده می‌گردد.

به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که تنوع قارچ *A. rabiei* در ایران بسیار زیاد است و باید عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش آن بررسی شود. هرچند پژوهندگان موتاسیون و

سپاسگزاری

امکانات اجرایی این پژوهش را فراهم کرده‌اند. صمیمانه سنگر و

قدرتمندی می‌شود.

بدین وسیله از معاویت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، که

منابع مورد استفاده

۱. ساقری، ع.. ا. بطاطی و م. سلطانی ۱۳۷۹ اصلاح جبویات سرما درست برای تحمل سرما نشسته‌ها. استشارات سارمان تحقیقات.
۲. شکوهی‌فر، ف. ع. باقری، م. رستگار و س. ملکرادره ۱۳۸۰ تعیین توزع بیماری رایی در قارچ عامل بیماری بر قردنگی بخود [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] با استفاده از ارقام افتراقی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیونکتوژنی حمئوری اسلامی ایران. مؤسسه تحقیقات بیونکتوژنی کشاورزی. کرج
۳. فولاد، م. و راجونر ۱۳۷۱. استفاده از مارکرهای مولکولی در اصلاح بیانات جکیده معالات کلیدی اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح بیانات ایران، دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. کرج
۴. قره‌یاضی، ب. ۱۳۷۵. کاربرد شانگرهای دی ان آ در اصلاح بیانات. مقالات کلیدی چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح بیانات ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۵. بورالهی، ح.. م. فلاحتی رستگار و ب. حعمرپور ۱۳۷۹ تشخیص نژادهای فیزیولوژیک *Ascochyta rabiei* عامل بیماری بر قردنگی بخود. در چند منطقه از کشور. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴(۱): ۱۲۶-۱۲۷.
6. Ahmad, G. D., A. Hafiz and M. Ashraf 1952. Association of morphological characters with blight resistance. Proceedings of The Fourth Pakistan Science Conference, Peshawar, Pakistan.
7. Botstein, D., R. L. White, M. Skolnick and R. W. Davis. 1980. Construction of genetic linkage mapping man using restriction fragment length polymorphism. Am J. Human Genet. 32: 314-331.
8. Bouznad, Z., R. Corbiri and D. Spire 1997. Protein and isozyme analysis of *Ascochyta* species of food legumes using the isoelectric focusing method PP 49-66. In: S. M. Udupa and F. Wigand (Eds.), DNA Markers and Breeding for Resistance to Ascochyta Blight in Chickpea. ICARDA, Aleppo, Syria.
9. Grewal, J. S. 1984. Evidence of physiological races in *Ascochyta rabiei* of chickpea. PP 55-65. In: M. C. Savena, and K. B. Singh (Eds.), Ascochyta Blight and Winter Sowing of Chickpea. Martinus Nijhoff, The Netherlands.
10. Hamza, S., S. Samir, A. Rebai, R. Salah and H. Moncef. 2000. Pathotype variation of representative genotypes of *Ascochyta rabiei* in the Beja region. J. Plant Pathol. 82: 23-28
11. Mmbaga, M. T. 1997. Pathogenic variability of *Ascochyta rabiei* and ascochyta blight resistance in chickpea. PP. 23-37 In: S. M. Udupa and F. Wigand (Eds.), DNA Markers and Breeding for Resistance to Ascochyta Blight in Chickpea. ICARDA, Aleppo, Syria.
12. Morjane H., J. Geistlinger, M. Harrabi, K. Weising and G. Kahl. 1994. Oligonucleotide fingerprinting detects genetic diversity among *Ascochyta rabiei* isolates from a single field in Tunisia. Current Genet. 26: 191-197.
13. Nei, M. 1972. Genetic distance between populations. Am. Naturalist 106: 283-292.
14. Nei, M. 1987. Molecular Evolutionary Genetics. Columbia University Press, New York.
15. Porta-Poglia, A., A. Inantino, P. Crino, R. Angelini and G. Venora. 1997. Ascochyta blight of chickpea: present status and prospects. Pakistan J. Phytopathol. 9: 9-15.
16. Reddy, M. V. and S. Kabbabeh. 1985. Pathogenic variability in *Ascochyta rabiei*. PP. 135-143 In: K. B. Singh and M. C. Saxena (Eds.), Disease Resistance Breeding in Chickpea. ICARDA, Aleppo, Syria.

- 17 Thomas, M. R. and N. S. Scott. 1994. Sequence-tagged site markers for microsatellites, a simplified technique for rapidly obtaining flanking sequences. *Plant Mol. Biol. Reporter* 12: 58-64.
18. Udupa, S. M., F. Wigand, M. C. Saxena and G. Kahl. 1998. Genotyping with RAPD and microsatellite markers resolves pathotype diversity in the ascochyta blight pathogen of chickpea. *Theor. Appl. Genet.* 97: 299-307.
19. Weising, K., D. Kaemmer, J. T. Epplen, F. Wigand, M. C. Saxena and G. Kahl. 1991. DNA fingerprinting of *Ascochyta rabiei* with synthetic oligonucleotides. *Current Genet.* 19: 483-489.
20. Weising, K., H. Nybom, K. Wolff and W. Meyer. 1995. *DNA Fingerprinting in Plants and Fungi*. CRC Press, USA.
21. Williams, S. G. K., A. R. Kubicek, K. J. Livak, J. A. Rafalski and S. V. Tingey. 1990. DNA polymorphism amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. *Nucleic Acids Res.* 18: 6531-6535.

Identification of Genetic Diversity in the *Ascochyta* Blight Pathogen of Chickpea [*Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab.] Using RAPD Markers

F. Shokohifar¹, A. Bagheri² and M. Falahati Rastegar³

Abstract

The poor information available on variation of *Ascochyta* blight fungus is the most important factor limiting chickpea breeding programs for resistance to blight disease. In this study, efforts were made to detect genetic variation of the pathogen in Iran. The RAPD marker was employed to evaluate 26 isolates collected from 16 provinces. Twelve random primers were used to analyze genomic DNA of the isolates.

Only ten primers showed polymorphism among isolates. Primer OPK-01 defined the highest number of polymorphism and primer OPK-09 confirmed relatively low degree of polymorphism. On the basis of this molecular marker, the estimated genetic diversity index was 98% and the pair-wise genetic distance of the isolates varied from 0.16 to 0.61. The least genetic distance belonged to isolates 20 and 22 from Qazvin and Golestan while the highest distance belonged to isolates 26 and 12 from Mazandaran and Markazi. The phylogenetic tree was constructed by cluster analysis and all the isolates grouped to 22 genetic clusters at the 90% similarity level. The genetic groups were named from A to V and their distribution in Iran was determined. The results revealed that genetic variation among Iranian population of the pathogen is very high, and further that RAPD is a vigorous tool for genomic analysis of *Ascochyta rabiei*.

Keywords: *Ascochyta* blight, Genetic diversity, Genetic distance, RAPD.

-
1. Researcher, Research Center for Plant Sci., Ferdowsi Univ., Mashhad, Iran.
 2. Prof. of Plant Breed., College of Agric., Ferdowsi Univ., Mashhad, Iran.
 3. Prof. of Plant Pathol., College of Agric., Ferdowsi Univ., Mashhad, Iran.