

بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (*Silybum marianum*)

رسمی یزدانی بیوکی^۱ - حمیدرضا خزاعی^۲ - پرویز رضوانی مقدم^{۳*} - علیرضا آستارایی^۴

تاریخ دریافت: ۸۷/۲/۲

تاریخ پذیرش: ۸۷/۹/۱۳

چکیده

ماریتیغال (*Silybum marianum*) از جمله گیاهان دارویی با خواص درمانی فراوان می‌باشد. در این راستا به منظور بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶-۸۷ در مزرعه تحقیقاتی داشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون استفاده از کود)، مخلوط کود NPK به ترتیب به میزان ۵۰، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، کود گاوی و گوسفندهایی به ترتیب به میزان ۳۰ و ۱۵ تن در هکتار بودند. در این تحقیق صفاتی از جمله تعداد شاخه‌های فرعی در بوته، ارتفاع بوته، قطر گل آذین، تعداد دانه در هر کاپیتوول، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت دانه، درصد روغن، درصد سیلیمارین (ماده موثره)، درصد سیلیبین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که مصرف انواع مختلف کودهای دامی و شیمیایی در خاک، بر اجزای عملکرد این گیاه بی تأثیر بود ولی بر درصد روغن، سیلیمارین و سیلیبین بذر تأثیر معنی داری داشت. تیمار کود گاوی نسبت به سایر تیمارها از بیشترین میزان روغن (۲۱ درصد) و سیلیبین (۷/۲۱) درصد برحوردار بود. بین تیمارهای شاهد و کود شیمیایی از لحاظ درصد روغن و درصد سیلیمارین هیچگونه اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین دو تیمار کود شیمیایی و کود گوسفندهایی به ترتیب کمترین درصد سیلیبین (۴/۱۶) و درصد سیلیمارین (۱/۳) را نسبت به سایر تیمارها داشتند. از این اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی مثبت بین ارتفاع بوته با عملکرد دانه (۰/۰۴=۱) و پس از آن با قطر گل آذین (۰/۶=۰) وجود داشت، که نشانگر اهمیت این صفات در تعیین عملکرد نهایی است، اما بین عملکرد دانه با سایر اجزای عملکرد همبستگی وجود نداشت.

واژه‌های کلیدی: خصوصیات کمی و کیفی، کودهای دامی، گیاه دارویی، ماریتیغال

مقدمه

گلهای ماریتیغال استخراج و شناسایی کردند. سیلیمارین ترکیبی از فلاونوئیدها است که از عصاره متابولی میوه‌های خشک شده (دانه) ماریتیغال (به میزان ۴ تا ۶ درصد) استخراج می‌شود (۲۳، ۳۰، ۳۳ و ۳۹). سیلیبین که به نام سیلی بینین نیز شناخته شده است، ترکیب اصلی (۵۰-۷۰ درصد) سیلیمارین از نظر کمی و خاصیت دارویی است و بیشتر خواص بیولوژیکی سیلیمارین به حضور این ترکیب وابسته است (۲۳، ۲۷، ۳۵ و ۴۰). میوه این گیاه علاوه بر ترکیبات فلاونوئیدی، حاوی ماده تلخی است که منشاء آن ترکیبات رزینی و ترکیبات روغنی می‌باشد. مقدار روغن در میوه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. مهمترین اجزای آن عبارتند از اسید لینولئیک (۵۰ تا ۶۰ درصد) اسید اوئیک (۲۰ تا ۳۵ درصد) که مصرف خوارکی دارند و لذا از فرآورده‌های جانبی کارخانه‌های داروسرایی می‌باشند (۱).

در آزمایشی که توسط بارانیک و همکاران (۱۶) برای تعیین میزان

گیاهان دارویی مخازن غنی از مواد موثره اساسی بسیاری از داروها می‌باشند. گیاه دارویی ماریتیغال *Silybum marianum* به لحاظ داشتن مواد موثره فراوان در درمان اختلالات کبدی، صفراوی و بسیاری از بیماریهای دیگر و همچنین سازگاری نسبتاً خوب این گیاه دارویی با شرایط آب و هوایی ایران قابل توجه می‌باشد (۴). ماده موثره بذر این گیاه دارویی که به نام سیلیمارین معروف است کبد را در برابر انواع مسمومیت‌ها از جمله قارچ آمانیت، استامینوفن و الكل محافظت می‌نماید (۸). احمد و همکاران (۱۵) هفت نوع فلاونوئید از

۱، ۲، ۳ و ۴ - به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد آگروکالوژی، دانشیار، استاد و دانشیار داشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
* - نویسنده مسئول: (Email:rezvani@ferdowsi.um.ac.ir)

را تحت تأثیر قرار داد.

اهداف این آزمایش شامل بررسی و ارزیابی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر میزان مواد موثره و اجزای عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال و انتخاب روش‌های مدبیریتی مناسب، برای تولید پایدار (عارضی از کودهای شیمیایی) ماریتیغال بود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۶-۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، واقع در ۱۰ کیلومتری شرق مشهد با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۶ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۳۶ دقیقه شرقی و ارتفاع ۹۸۵ متری از سطح دریا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۴ تیمار به انعام رسید. تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از: تیمار شاهد (بدون استفاده از کود)، کود شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب به میزان ۵۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار^(۴)، کود گاوی کاملاً پوسیده به میزان ۳۰ تن در هکتار و کود گوسفندي کاملاً پوسیده به میزان ۱۵ تن در هکتار. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زمین مورد آزمایش، خصوصیات شیمیایی کود گاوی و کود گوسفندي در جدول ۱ و ۲ نشان داده شده است.

بذور در عمق ۳ سانتی متر به روش جوی و پسته در ۶ ردیف با فاصله ۳۰ سانتی متر بر روی ردیف و ۵۰ سانتی‌متر بین ردیف در داخل هر واحد آزمایش (با طول ۴ و عرض ۳ متر) در ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۶ در قطعه زمینی که سال گذشته در آیش بود، کشت گردید. عملیات داشت مطابق عرف منطقه انجام شد، آبیاری هر ۱۰ روز یکبار به روش نشتی انجام گردید. وحین علف‌های هرز که غالباً پیچک، اوپارسلام و سوروف بودند در ۳ نوبت با دست انجام شد. بذور که بصورت پر کشت شده بود در مرحله ۲ تا ۴ برگی گیاهچه، در تاریخ ۶ اریبهشت ۱۳۸۷ تنک شدند.

در هر واحد آزمایش ۵ بوته بطور تصادفی انتخاب و صفاتی از جمله تعداد شاخه‌های فرعی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد گل آذین در هر بوته، قطر گل آذین، تعداد دانه در هر کاپیتوں و وزن هزاردانه تعیین شد. همچنین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت (نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک) در هر کرت پس از حذف دو ردیف کناری و نیم متر از ابتدا و انتهای کرت در سطحی معادل ۶ متر مربع تعیین شد. از بذور تولید شده جهت اندازه گیری درصد روغن، درصد سیلیمارین (ماده موثره)، درصد سیلیبین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین استفاده گردید. درصد روغن دانه ماریتیغال با استفاده از دستگاه انومات سوکسله تعیین شد. همچنین درصد سیلیبین و سیلیمارین با استفاده از روش‌های استخراج، خالص سازی و تهییه نمونه UV (اسپکتروفتومتری) از ۱۰۰ گرم دانه ماریتیغال آسیاب شده برآورد شد (۹ و ۱۲).

روغن دانه چندین نوع گونه گیاهی صورت پذیرفت میزان روغن دانه ماریتیغال ۲۵ تا ۳۵ درصد تعیین گردید.

مواد موثره اگرچه اساساً با هدایت فرآیندهای ژنتیکی ساخته می‌شوند ولی ساخت آنها بطور بارزی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد، بطوری که عوامل محیطی سبب تغییرات در رشد گیاهان دارویی، همچنین در مقدار و کیفیت مواد موثره آنها می‌گردد^(۳).

کاربرد روز افزون کودهای شیمیایی باعث بروز خسارت جرمان ناپذیر زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی شده است. این معایب کودهای شیمیایی و هزینه‌ی بالای تولید آنها باعث توجه به استفاده از کودهای آلی و دامی گردیده است. بدون تردید کاربرد کودهای آلی و دامی، علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نیز مضر ثمر است (۲). در سیستم‌های تولید کم نهاده، حداقل انرژی و مواد شیمیایی استفاده می‌شود، به طوری که این سیستم‌ها با قوانین پایداری و سلامتی اکو‌سیستم‌ها مطابقت دارند^(۳۸).

گرامی و سپاهی^(۱۱) بیان کردند که استفاده از انواع کودهای دامی به طور مؤثری به اصلاح اراضی کشاورزی کمک می‌کند. اقبال و پاپور^(۱۸) گزارش کردند که کاربرد کود دامی، میزان فسفر در خاک مزرعه را افزایش داد. از سوی دیگر، گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مواد آلی و ترکیبات حاصل از تجزیه آنها موجب کاهش ثبیت فسفر خاک در مقایسه با فسفات معدنی می‌گردد^(۲۶ و ۲۲).

ابدالی مشهدی و همکاران^(۱) با انجام آزمایشی در خوزستان، مشاهده کردند که ارتفاع ماریتیغال بدون استفاده از کود شیمیایی، بطور متوسط به حدود ۲۵۰ سانتی‌متر رسید. ریو-سلسیتینو و همکاران^(۳۷) بیان کردند که عناصر سنگینی مثل روی و سرب که باعث آلوگی خاک می‌شوند، توسط ماریتیغال جذب شده و در ساقه‌های آن ذخیره می‌شود. نوبخت^(۳) (ضمن بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ماریتیغال، بیان کرد که با افزایش مقدار کود نیتروژن، مقدار سیلیمارین دانه اندکی کاهش یافت. قلی بیگیان و همکاران^(۱۰) گزارش کردند که کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن، بر ضریب استهلاک و کارایی مصرف نور ماریتیغال تأثیر معنی داری نداشت.

شریفی عاشورآبادی و همکاران^(۷) با بررسی تأثیر انواع سیستم‌های تغذیه بر کیفیت گیاه دارویی رازیانه (*Foeniculum vulgare*) بیان کردند که بیشترین کارایی نیتروژن در تیمار مخلوط ۲۵ تن کود دامی همراه با کود مخلوط NPK به مقدار ۶۰ و ۴۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد، این در حالی است که در روش تغذیه شیمیایی، با افزایش مصرف کودهای شیمیایی، کارایی نیتروژن کاهش یافت. عبدالصبور و ابوسعود^(۱۴) بیان کردند که کاربرد کودهای آلی، مقدار نیتروژن، رشد رویشی، عملکرد بذر و تجمع ماده خشک در گیاه کنجد

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

بافت خاک	نیتروژن معدنی (mg kg ⁻¹)	فسفر (mg kg ⁻¹)	پتاسیم (mg kg ⁻¹)	pH	ماده آلی (%)	EC (ds m ⁻¹)
سیلتی-لومی	۱۵/۴	۱۳/۷	۱۱۹	۷/۴۷	۰/۸۳	۱/۲

جدول ۲- خصوصیات شیمیایی کود گاوی و گوسفندی مورد استفاده در آزمایش

نیتروژن	کل	کود گاوی	کود گوسفندی
درصد			
۰/۴۲	۸۱۲	۳۶۴۲	۸/۵
۰/۵۷	۷۴۲	۴۱۴۰	۷/۴۵

بيان کرد که کاربرد کود دامی، بر وزن هزار دانه تأثیری نداشت. میبورگ و هنینگ (۲۹) با بررسی اثر کودهای شیمیایی بر روی کلزا و جو بیان کردند که وزن هزار دانه در کنترل خصوصیات ژنتیکی بوده و کمتر تحت تأثیر کود قرار گرفت. بلیسبرو و ایونس (۱۷) اطهار داشتند که کود نیتروژن تأثیری بر وزن دانه در کلزا نداشت. هارپر (۱۹) اعلام نمود که وزن هزار دانه کمتر تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قرار می گیرد.

عملکرد

نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن بود که از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (جدول ۳). مقایسه میانگین ها نشان داد که گیاهان تحت تیمارهای کود گوسفندی و کود گاوی به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند (جدول ۵).

تبریزی (۵) بیان کرد که افزایش سطح کود دامی در افزایش عملکرد دانه اسفرزه، نقشی نداشت و او علت این موضوع را کمبود نیتروژن موجود در کود دامی و عدم آزادسازی آن در یک فصل زراعی ذکر کرد. انتودیا و تومار (۲۱) و لوپزبیلیدو و همکاران (۲۸) به ترتیب بی اثر بودن کودهای فسفره و نیتروژنه بر عملکرد دانه گیاه اسفرزه را گزارش کردند.

نتایج نشان داد که از نظر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت، بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت (جدول ۳). مقایسه میانگین ها نشان داد که گیاهان تحت تیمار شاهد با ۶۰۴۰ کیلوگرم در هکتار، بیشترین و گیاهان تحت تیمار کود گاوی با ۴۰۵۴ کیلوگرم در هکتار، کمترین عملکرد بیولوژیک را داشتند (جدول ۵).

تجزیه و تحلیل آماری داده ها شامل تجزیه واریانس و ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های مورد بررسی با استفاده از نرم فزار SAS انجام گردید. کلیه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند.

نتایج و بحث

اجزای عملکرد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که گیاهان تحت تیمارهای مختلف از لحاظ تعداد شاخه های فرعی در بوته اختلاف معنی داری با هم نداشتند (جدوال ۳ و ۴). تیمارهای مختلف در این تحقیق تأثیر معنی داری در ارتفاع بوته مارتبegal نداشتند (جدوال ۳ و ۴). تبریزی (۵) ضمن بررسی اثر کود دامی بر گیاه دارویی اسفرزه بیان کرد که سطوح مختلف کود دامی تأثیری بر ارتفاع این گیاه نداشت.

تعداد گل آذین در گیاهان تحت تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت (جدول ۴). تبریزی (۵) گزارش کرد که سطوح مختلف کود دامی بر تعداد سنبله در هر بوته در گیاه دارویی اسفرزه و پسیلوم تأثیر معنی داری نداشت.

باتوجه به جداول ۳ و ۴ تیمارهای مختلف تأثیر معنی داری بر قطر گل آذین و تعداد دانه در هر کاپیتوول نداشتند. سینگ و فارادو (۳۶) گزارش کردند که از بین اجزای عملکرد در کلزا، تعداد دانه در غلاف، تحت کنترل خصوصیات ژنتیکی بوده و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی و زراعی قرار می گیرد. تبریزی (۵) نیز بیان کرد که اثر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد دانه در سنبله گیاه دارویی اسفرزه معنی دار نبود.

وزن هزار دانه نیز مانند سایر اجزای عملکرد ذکر شده در بالا تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قرار نگرفت (جدوال ۳ و ۴). تبریزی (۵) ضمن بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی روی اسفرزه،

جدول ۴ - مقایسه میانگین اجزای عملکرد در گیاه ماریتیغال

نام	وزن هزارانه (گرم)	کاپیتوں	تعداد داروه در هر کاپیتو	قطر کل آذین (سانتیمتر)	تعداد گل آذین در هر بوتہ	ارتفاع بوتہ (سانتیمتر)	تعداد شاخه های فرعی در هر بوتہ	تیمار
کود گاوی	۱۱۰/۹ ^a	۲۰/۳ ^a	۱۱۰/۹ ^a	۲۱/۳ ^a	۷/۰ ^b	۵۸/۱۰ ^a	۵/۷ ^a	کود گاوی
کود گوسفندی	۱۰۰/۵ ^a	۲۰/۴ ^a	۱۰۰/۵ ^a	۲۱/۴ ^a	۷/۰ ^{ab}	۷۰/۰ ^a	۷/۰ ^a	کود گوسفندی
کود شیپیانی	۱۰۰/۴ ^a	۲۰/۴ ^a	۱۰۰/۴ ^a	۲۱/۴ ^a	۷/۰ ^{ab}	۷۳/۱ ^a	۷/۵ ^a	کود شیپیانی
شاهد	۸۸/۲ ^a	۲۰/۱ ^a	۸۸/۲ ^a	۲۱/۲ ^a	۷/۰ ^a	۸۳/۰ ^a	۷/۳ ^a	شاهد

حروف مختلف در هشتاد و نه تن شناس دهنده وجود اختلاف آماری در سطح ۵٪ بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن است.

جدول ٣- تحزيمه واريانسي (بياناتيدين معنفات) صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه های پریتوال

SN، *، ** به ترتیب غیرمعنی دار، معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪

درصد روغن

هیچگونه اختلافی با یکدیگر نداشتند (جدول ۵). بر این اساس و با توجه به اثرات منفی کودهای شیمیایی، توصیه می‌شود که کودهای آلی مانند کودهای گاوی جایگزین انواع شیمیایی آن گردد. کمترین میزان درصد سیلیمارین از تیمار کود گوسفنده بودست آمد. در یکی از مطالعاتی که در سال ۱۳۷۴ در دانشگاه اصفهان انجام شد عدم تأثیر کود نیتروژن بر میزان سیلیمارین گیاه ماریتیغال تأیید گردید (۱۲).

درصد سیلیبین

بین تیمارهای مختلف از نظر تأثیر بر درصد سیلیبین اختلاف معنی دار وجود داشت. نتایج اثر تیمارهای کودی بر روی درصد سیلیبین نشان داد که همانند درصد روغن، گیاهان تحت تیمار کود گاوی بیشترین درصد سیلیبین (۲۱/۷) را داشتند و بین گیاهان تحت تیمارهای کود شیمیایی و شاهد از نظر این صفت اختلافی وجود نداشت. علاوه بر این، کمترین درصد سیلیبین متعلق به گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی بود (۱۶/۴).

ایمید بیگی و نوبخت (۳۲) با بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی مواد موثره ماریتیغال نشان دادند که کود نیتروژن باعث کاهش درصد سیلیمارین و سیلیبین شد، به طوری که تیمار شاهد (عدم استفاده از کود نیتروژن) بیشترین مواد موثره را داشت. اولم و همکاران (۳۱) ضمن بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر مواد موثره ماریتیغال، بیان کردند که سطوح مختلف کود نیتروژن تأثیری بر سیلیبین بذور نداشت.

گیاهان تحت تیمارهای مختلف کودی از لحاظ درصد روغن با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند، بطوری که گیاهان تحت تیمار کود گاوی بالاترین درصد روغن را در میان تیمارها دارا بود (۲۱ درصد) و بعد از آن گیاهان تحت تیمار کود گوسفنده قرار داشتند (جدول ۵). حسن‌زاده قورت تپه (۶) اظهار داشت که کود گاوی موجب افزایش نفوذپذیری خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، افزایش فعالیت میکروبی و مواد غذایی خاک و در نهایت منجر به افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه می‌شود. احتمالاً دلیل بالا بودن درصد روغن در گیاهان تحت تیمار کود گاوی به فراهمی بیشتر عناصر غذایی موجود در این تیمار در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه مربوط شود.

نکته جالب توجه آن است که اختلاف معنی داری بین گیاهان تحت تیمار شاهد با گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی از لحاظ درصد روغن دیده نشد. کروگمند و همکاران (۲۴) و هولمز و آینسلی (۲۰) گزارش کردند که در شلغم روغنی با افزایش مصرف کود نیتروژن، عملکرد و سنتز پروتئین افزایش یافت و در نتیجه از میزان مواد لازم برای تبدیل به روغن کاسته شد.

درصد سیلیمارین

نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف از لحاظ درصد سیلیمارین در سطح احتمال ۹۵ درصد، با یکدیگر اختلاف آماری نداشتند. گیاهان تحت تیمارهای کود گاوی، شیمیایی و شاهد از نظر درصد سیلیمارین

جدول ۵- مقایسه میانگین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن، درصد سیلیمارین (ماده موثره)، درصد سیلیبین (موجود در سیلیمارین)، عملکرد روغن، عملکرد سیلیمارین و شاخص برداشت (بر حسب دانه) در گیاه ماریتیغال

شاخص برداشت (بر حسب دانه) (درصد)	عملکرد سیلیمارین (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	درصد سیلیبین (موجود در سیلیمارین) (کیلوگرم در هکتار)	درصد سیلیمارین (ماده موثره)	درصد درصد سیلیمارین (ماده موثره)	عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار)	عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)
۱۸/۲ ^a	۲۴/۶ ^a	۱۵۰/۶ ^a	۲۱/۷ ^a	۳/۴ ^a	۲۱/۰ ^a	۴۰۵ ^a	۷۱۶/۵ ^a
۱۸/۶ ^a	۳۲/۵ ^a	۲۰۵/۳ ^a	۱۹/۰ ^b	۳/۱ ^b	۱۹/۷ ^b	۵۴۹۳ ^a	۱۰۲۸/۷ ^a
۱۷/۵ ^a	۳۱/۲ ^a	۱۵۵/۷ ^a	۱۶/۴ ^c	۳/۶ ^a	۱۸/۱ ^c	۵۵۱۰ ^a	۸۶۰/۴ ^a
۱۷/۳ ^a	۳۵/۴ ^a	۱۸۳/۲ ^a	۱۸/۱ ^{bc}	۳/۴ ^a	۱۷/۸ ^c	۶۰۴۰ ^a	۱۰۲۳/۱ ^a

حروف مختلف در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف آماری در سطح احتمال ۵٪ است.

گیاهان به شرایط محیطی پاسخ می‌دهند و متابولیت‌های ثانویه دارای نقش‌های کلیدی در برهم کنش بین گیاه و محیط

وزن هزار دانه همبستگی معنی داری وجود نداشت. با توجه به جدول ۶ مشاهده می شود که با افزایش ارتفاع بوته، تعداد گل آذین در هر بوته افزایش یافت و درصد روغن که همبستگی منفی با تعداد گل آذین دارد کاهش یافت، ولی با توجه به همبستگی مشبت و بالاتر ارتفاع بوته با عملکرد روغن، کاهش درصد روغن جبران شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با افزایش ارتفاع بوته در این گیاه می توان به عملکرد دانه، عملکرد روغن و نیز عملکرد سیلیمارین بیشتری دست یافت هرچند که نقش قطر گل آذین نیز در عملکرد دانه، روغن و سیلیمارین قابل چشم پوشی نیست. همچنین تعداد گل آذین با تعداد شاخه های فرعی در هر بوته همبستگی مشبت داشت ($P=0.73**$). برخی محققان نیز به نتایج مشابهی دست یافتند بطوری که اشید و همکاران (۲۴) بیان کردند که تعداد گل آذین در هر بوته، ارتباط مشبت معنی داری با تعداد شاخه ها در هر بوته دارد، در حالی که عملکرد دانه های تولید شده رابطه مشبت معنی دار با طول ساقه و قطر گل آذین و مقدار سیلیمارین دارد. بین بعضی از صفات کیفی مانند درصد روغن با درصد سیلیسین، و عملکرد سیلیمارین با قطر گل آذین و ارتفاع بوته همبستگی مشبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بین درصد سیلیسین با تعداد گل آذین در هر بوته، همبستگی منفی ($P=0.58**$) ولی با درصد روغن همبستگی مشبت وجود داشت ($P=0.82**$).

هستند. مطابق نتایج بسیاری از محققان، فلاونوئیدها نیز از جمله متabolیت های ثانویه ای هستند که مسیر بیوسنتزی آنها تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می گیرد و در مراحل نموی و شرایط محیطی دارای نوسان است (۲۵ و ۳۵).

بر اساس برخی گزارش های موجود (۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۵) و نتایج این تحقیق، کیفیت تولید در تیمارهای کودهای آلی و دامی وضعیت مطلوبتری را نسبت به تیمارهای کودهای شیمیایی داشت. علاوه بر این استفاده از کودهای شیمیایی باعث کاهش مواد موثره در مارپیچال شد. بنابراین ممکن است که استفاده از کودهای آلی و دامی راهی مناسب در جهت تولید و عرضه فرآورده های دارویی سالم و عاری از مواد شیمیایی باشد.

نتایج ضرایب همبستگی

محاسبه ضرایب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی متعلق به عملکرد دانه با عملکرد سیلیمارین ($P=0.98**$) بود (جدول ۶). همچنین از بین صفات کمی مورد مطالعه ارتفاع بوته ($P=0.86**$) و پس از آن قطر گل آذین ($P=0.6**$) بیشترین همبستگی مشبت با عملکرد دانه، را داشتند، که نشانگر اهمیت این صفات در تعیین عملکرد نهایی است. اما بین عملکرد دانه با تعداد گل آذین، تعداد شاخه های فرعی در هر بوته، تعداد دانه در هر کاپیتوول و

جدول - ۶ - مقادیر خرابی همیستگی اجزای عملکرد و عملکرد در گیاه مارپیچغال

قدردانی

فردوسی و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تأمین شده است، که بدینوسیله تشکر و قدردانی می شود.

هزینه اجرای این تحقیق توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

منابع

- ۱- ابدالی مشهدی، ع.، و.ق. فتحی. ۱۳۸۱. بررسی اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و میزان روغن دانه گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط آب و هوایی اهواز. مجله پژوهش و سازندگی. ۵۴: ۲۸-۳۳.
 - ۲- آستانایی، ع.، و.ع. کوچکی. ۱۳۷۵. کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 - ۳- امید بیگی، ر. ۱۳۷۴. رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات فکر روز، تهران.
 - ۴- امید بیگی، ر. ۱۳۸۴. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدم رضوی.
 - ۵- تبریزی، ل. ۱۳۸۳. اثر تنفس رطوبت و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفزه. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 - ۶- حسن زاده قورت په، ع. ۱۳۸۲. تأثیر مصرف کود گاوی بر غلظت و جذب روى و آهن دانه آفتانگردن. خلاصه مقالات سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج، اسفندماه. ص. ۱۹۱.
 - ۷- شریفی عاشورآبادی، ا.، ا. متین، و.ب. عباس زاده. ۱۳۸۲. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. ۱۹(۳): ۳۲۹-۳۱۳.
 - ۸- فلاح حسینی، ح.، ا. همتی مقدم، و.م. علویان. ۱۳۸۳. مروری بر گیاه دارویی خار مریم. فصلنامه گیاهان دارویی. ۱۱: ۲۴-۱۴.
 - ۹- قاسمی دهکردی، ن.، و.ا. طالب. ۱۳۸۰. استخراج، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در گیاهان دارویی شاخص. چاپ اول. نشر چوگان. تهران.
 - ۱۰- قلی بیگیان، م.، و.م. حاج سید هادی. ۱۳۸۶. بررسی تأثیر سطوح مختلف تراکم و کود ازته بر ضربی استهلاک و کارایی مصرف کود در گیاه دارویی ماریتیغال. سومین همایش گیاهان دارویی. تهران، دانشگاه شاهد. آبان ماه. ص. ۵۱.
 - ۱۱- گرامی، ب.، و.ع. سپاهی. ۱۳۵۹. اولویت تحقیقات کشاورزی در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری. نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
 - ۱۲- نادری، م.، ن. اولیا زاده. ا. جمشیدی، ح. احمدی آشتیانی، م. جعفرزاده، م. طاهری بروجردی، ک. افاز، و.م. ملکوتیان. ۱۳۸۵. یک کلید برای هزار قفل، مروری جامع بر داروی گیاهی سیلیمارین و معرفی گیاه خارمریم. چاپ اول. نشر نوآور. تهران.
 - ۱۳- نوبخت، ا. ۱۳۷۵. بررسی اثر کود نیتروژن بر باروری (رشد و نمو، عملکرد بذر و کیفیت مواد موثره) گیاه دارویی ماریتیغال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
- 14- Abdel-Sabour, M. F., and M. A. Abo-Seoud. 1996. Effects of organic waste compost addition on sesame growth, yield and chemical composition. Agriculture, Ecosystems and Environment. 6: 157-164.
- 15- Ahmed, A. A., T. J. Mabry, and S. A. Matlin. 1989. Flavonoids of the flowers of *Silybum marianum*. Phytochemistry. 28: 1751-1753.
- 16- Baranyk, P., V. Zeleny, H. Zukalova, and P. Horejs. 1995. Oil content of some species of alternative oil plants. Rostlinna-Vyroba (UZPI)- Czech Republic. 41: 433-438.
- 17- Bilsbroow, P. E., and F. G. Evans. 1993. The influence of spring nitrogen on yield, yield component and glucosinolate content of autumn sown oil seed rape. Agriculture Science. 120: 219-224.
- 18- Eghball, B., and J. F. Power. 1999. Phosphorus and nitrogen-based manure and compost application: Corn production and soil phosphorus. Soil Science Society American Journal. 63: 895-901.
- 19- Harper, J. L. 1961. Approaches to the study of plant competition. Mechanisms in Biological Competition. F. L. Milthorpe. Cambridge, Symposium No. 15, Society for Experimental Biology, Cambridge University. pp. 1-39.
- 20- Holmes, M. R. J., and A. M. Ainsley. 1979. Nitrogen top-dressing requirements of winter oilseed rape. Journal of Science of Food and Agriculture. 30: 119-128.
- 21- Intodia, S. K., and O. P. Tomar. 1998. Response of psyllium (*Plantago ovata*) genotypes to nitrogen and phosphorus on heavy soil. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Science. 20: 1042-1044.
- 22- Iyamuremye, F., R. P. Dick, and J. Baham. 1996. Organic amendments and phosphorus dynamics: I. phosphorus chemistry and sorption. Soil Science. 161: 426-435.

- 23- Kren, V., J. Ulrichova, P. Kosina, D. Stevenson, P. Sedmera, V. Prikrylova, P. Halada, and V. Simanek. 2000. Chemoenzymatic preparation of silybin – glucoronides and their biological evaluation. Drug Metabolism and Disposition. 28: 1513-1517.
- 24- Krogman, K., and E. H. Hobbs. 1975. Yield and morphological response of rapeseed to irrigation and fertilizer treatments. Plant Science. 55: 903-909.
- 25- Kutchan, T. M. 2001. Ecological arsenal and developmental dispatcher: The paradigm of secondary metabolism. Plant Physiology. 125: 58-60.
- 26- Kwabiah, A. B., N. C. Stoskopf, C. A. Palm, R. P. Voroney, M. R. Rao, and E. Gacheru. 2003. Phosphorus availability and maize response to organic and inorganic fertilizer inputs in a short term study in western Kenya. Agriculture, Ecosystems and Environment. 95: 49-59.
- 27- Li, W., K. Koike, Y. Asada, T. Yoshikawa, and T. Nikaido. 2005. Rosmarinic acid production by *Coleus forskohlii* hairy root cultures. Plant Cell, Tissue and Organ Cultur. 80: 151-155.
- 28- Lopez-Bellido, L., M. Fuentes, J. E. Castillo, and F. J. Lopez-Garrido. 1998. Effects of tillage, crop rotation and nitrogen fertilization on wheat-grain quality grown under rainfed Mediterranean conditions. Field Crops Research. 57: 265-276.
- 29- Myborg, M., and A. M. Henning. 1969. Experimental with different placement of fertilizer for Barley and Rapeseed. Soil Science. 49: 79-88.
- 30- Narayana, K. R., R. Sripal, M. R. Chaluvadi, and D. R. Krishan. 2001. Bioflavonoids classification, pharmacological, biochemical effects and therapeutic potential. Indian Journal of Pharmacology. 33: 2-6.
- 31- Omer, E. A., A. M. Refaat, S. S. Ahmed, A. Kamel, and F. M. Hammouda. 1993. Effect of spacing and fertilization on the yield and active constituents of milk thistle, *Silybum marianum*. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 1: 17-23.
- 32- Omidbaigi, R., and A. Nobakht. 2001. Nitrogen fertilizer affecting growth, seed yield and active substances of milk thistle (*Silybum marianum*). Pakistan Journal of Biological Sciences. 4(11): 1345-1349.
- 33- Samuelsson, G. 1999. Drugs of natural origin. 4th revised edition. Swedish Pharmaceutical press, Stockholm, Sweden. pp. 226-233.
- 34- Schmid, J., P. W. Doerner, S. D. Clouse, R. A. Dixon, and C. J. Lamb. 1990. Development and environmental regulation of a chalcone synthase promoter in transgenic tobacco. The Plant Cell. 2: 619-631.
- 35- Schnfeld, J. V., B. Weisbrod, and M. K. Muller. 1997. Silibinin a plant extract with antioxidant and membrane stabilizing properties protects exocrine pancreas from cyclosporine toxicity. Cellular and Molecular Life Sciences. 53: 917-920.
- 36- Singh B., and A. S. Faroda. 1994. Physiological parameters of *Barassica* species as affected by irrigation and nitrogen management on aridisols. Indian Journal of Agricultural Science. 39: 426-443.
- 37- Rio-Celestino, M. D., R. Font, R. Moreno-Rojas, and A.D. Haro-Bailon. 2006. Uptake of lead and zinc by wild plants growing on contaminated soils. Industrial Crops and Products. 24: 230-237.
- 38- Sharma, A. K. 2002. A Handbook of Organic Farming. Agrobiosis. India.
- 39- Stoyanov, D., B. Daamyanov, G. Mechenov, and I. Ivanov. 1994. Possibilities for using the oil of *Silybum marianum* gearth as fuel for diesel engins. Selskostopanska Tekhnika (Bulgaria). Agricultural Engineering. 31: 13-17.
- 40- Venkataraman, R. 2000. Milke thistle, an herbal supplement, decreases the activity of CYP3A4 and uridine diphosphoglucuronosyl transferase in human hepatocyte cultures. Drug Metabolism and Dispositions. 28: 1270-1273.