



مركز مباحث و تحقيقات سلامت و امنيت ملي زنجان

خلاصه مقالات

همایش سراسری بررسی

خودکشی

و رفتارهای مرتبط

۱۰ الی ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۰

زنجان، مرکز همایش های بین المللی روزبه



انجمن روانشناسان ایران
انجمن روانشناسان زنجان



انجمن روانشناسان ایران



انجمن روانشناسان ایران



انجمن روانشناسان ایران




انجمن روانشناسان ایران



انجمن روانشناسان ایران



انجمن روانشناسان ایران



فهرست خلاصه مقالات ارائه شده بصورت سخنرانی

1	علل جسمی خودکشی دکتر علیرضا آقاجانلو	01
2	ارتباط نیمرخ‌های شخصیتی و اقدام به خودکشی به روش مسمومیت دارویی در بیماران بستری شده؛ یک مطالعه مورد- شاهدی ۱- دکتر شاهرخ امیری، ۲- دکتر علیرضا شفیعی کندجانی، ۳- دکتر آزاده احمدی، ۴- محمود فروشی	02
4	رابطه بین ترس از بدریختی بدن و انگاره‌پردازی خودکشی در بین زنان و مردان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های پوست، مو و وزن شهر تهران سمیه انتظاری، سیدمحمدرضا علوی‌زاده	03
6	تاثیر درمان‌های شناختی- رفتاری بر ناامیدی و افسردگی (گرایش به خودکشی) زنان فاطمه بهزادفر، نرگس عرب خزائلی، فاطمه ایزدی	04
8	مدیریت رفتار خودکشی دکتر نصرت الله پورافکاری	05
10	بررسی مقایسه‌ای تاثیر مداخله وجودی- ماتریکس و ماتریکس بر افکار خودکشی، نگرش به زندگی و تحریف‌های شناختی در بیماران مبتلا به سوء مصرف آمفتامین هادی ترکمن	06
11	خودکشی در نوجوانان دکتر میترا حکیم شوشتری	07
12	سیستم ثبت کشوری رفتارهای خودکشی در ایران: موانع و چالش‌ها ۱- دکتر احمد حاجبی، ۲- دکتر مسعود احمدزاد اصل، ۳- دکتر مونا ارشادی، ۴- دکتر رئوفه قیومی، ۵- شهناز باشتی، ۶- دکتر علی نیک فرجام	08
14	گرایش به خودکشی و عوامل موثر بر آن در افراد وابسته به مواد شبه افیونی تحت پوشش متادون درمانی ۱- حبیب اله حسینی، ۲- دکتر محمدرضا اسکندری، ۳- صغری کریمی، ۴- دکتر علیرضا آقاجانلو، ۵- عباس قاسمی	09
16	رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/افزون‌کنشی (ADHD) ۱- محمد حمزه لو، ۲- علی مشهدی، ۳- جواد صالحی فدردی	010
18	تهیه‌ی پروتکل گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و بررسی کارایی آن روی بیماران افسرده‌ی اساسی با افکار خودکشی ۱- دکتر مریم حناساب زاده، ۲- دکتر علی اصغر نژاد، ۳- دکتر رخساره یزدان دوست، ۴- دکتر بنفشه غرایی	011
20	بررسی خودکشی و اختلالات روانی در زنان مصرف کننده مواد مخدر ۱- دکتر ناهید خادمی، ۲- سرهنگ علی لقایی، ۳- سروان محمد رضا آمویی، ۴- زهرا لقایی	012
21	مشکلات متدولوژیک و تاثیرات آن‌ها در مطالعات مربوط به خودکشی دکتر محسن رضائیان	013
22	خودکشی در زنان ۱- دکتر فاطمه رنجبر، ۲- امینه عزیززاده، ۳- محمدمامین رضازاده، ۴- حمیده اکبرزاده	014



رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD)

۱- محمد حمزه لو، ۲- علی مشهدی، ۳- جواد صالحی فدردی

۱۳۹۲- دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، با اختلال‌های روان پزشکی زیادی همچون اختلال‌های خلقی، سوء مصرف مواد، اضطرابی، اختلال‌های شخصیت ضداجتماعی و مرزی همبودی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این اختلال در جمعیت زندانیان رایج است، و به نظر می‌رسد که یکی از مفاهیم زیربنایی مرتبط با بروز رفتارهای خود جرحی و خودکشی در زندانیان باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان شیوع رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد مبتلا به ADHD زندان گرگان بود.

روش پژوهش: تعداد ۳۰ نفر از زندانیان مرد زندان گرگان که بر اساس پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) و مصاحبه بالینی و روان پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتلا به ADHD تشخیص داده شده بودند، و ۳۰ نفر از بین زندانیان بدون ADHD که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، مقایسه شدند.

یافته‌ها: میزان شیوع اقدام به خودزنی و رفتارهای خود جرحی بر اساس مصاحبه بالینی ارزیابی شد و داده‌های حاصله با آزمون آماری خی دو (χ^2) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میزان شیوع اقدام به خودکشی در زندانیان مبتلا به ADHD و بدون ADHD به ترتیب ۵۰٪ و ۳۰٪ و میزان رفتارهای خود جرحی در زندانیان مبتلا به ADHD و بدون ADHD نیز به ترتیب ۴۰٪ و ۳۰٪ بود. تفاوت بین دو گروه معنادار بوده و نشان می‌دهد که زندانیان مبتلا به ADHD ۲/۵ برابر بیشتر از زندانیان بدون ADHD در معرض خطر اقدام به خودکشی هستند.

نتیجه‌گیری: این نتایج بر ضرورت برنامه تشخیصی، درمانی یا مراقبتی برای زندانیان مبتلا به ADHD به عنوان یک راهبرد پیش گیری از خودکشی و خود جرحی در زندان‌ها تاکید می‌کند.

واژه های کلیدی: اختلال فزون کنشی در نارسایی توجه (ADHD)، خودکشی، رفتارهای خودزنی، زندان



Self-Injury Behaviors and Suicide Attempts among Male Prison Inmates with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

1- Mohammad Hamzeloo, 2- Ali Mashhadi, 3- Javad Salehi Fadardi

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that often persist into adulthood. ADHD is associated with a high percentage of comorbid psychiatric disorders. Studies suggest that ADHD is common among prison populations. It has been suggested that ADHD may be one of underlying concepts of suicide and self-injury behaviors in prison inmates. The aim of the present study was to explore the prevalence of self-injury behaviors and suicide attempts among male prison inmates with and without ADHD.

Method: Through stratified sampling method, 60 adult male prison inmates in Gorgan prison (30 participants with ADHD and 30 participants without ADHD) were recruited on a voluntary basis. Diagnostic assessments were based on the Adult ADHD Self-Report Scale Screener and a clinical interview based on DSM-IV criteria and a psychiatric interview. We measured rates of suicide attempt and self-injury behaviors via clinical interview. Next, self-injury behaviors and suicide attempts were compared across the ADHD and non-ADHD groups.

Results: Chi-square outcomes showed that the prevalence of suicide attempts in ADHD and non-ADHD groups were 50% to 20% respectively, and the prevalence of self-injury behaviors in ADHD and non-ADHD groups were 40% to 30% respectively. The differences between groups were significant ($p=0.05$). Therefore, the prevalence of suicide attempt was 2.5 times higher for prison inmates with ADHD.

Conclusions: The results emphasize the necessity of diagnostic, preventive, and therapeutic programs for offenders with ADHD to reduce their risk of self-harm behaviors in the prisons.

Key words: attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD), suicide, self-injury, prison

