

## تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب باختر بیجار، کردستان



احمد دادستان، کارشناس ارشد هیدرولوژی و تکتونیک، گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات  
معدنی کشور، Email: kdadsetan@gmail.com  
حلیل مهرزاد، فوق تخصص اینتوپیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپردازی، دانشگاه فردوسی مشهد، mehrzad@um.ac.ir



### چکیده:

منطقه جنوب باختر بیجار در استان کردستان، قسمتی از راستای شمال‌باختری-جنوب‌خاوری کمریند آتشفشن‌های کواترنری در بخش شمالی پهنه‌ماگمایی-دگرگونی سنندج-سیرجان، متنطبق با محور قروه-بیجار-تکاب، یک ایالت متالوژی است که دو چرخه آتشفشن‌های میوسن بالایی و پائیستوسن را ثبت کرده است. وجود همزمان ماقمای‌های اسیدی و بازی در فاز آخر، دو منشأ متفاوت و مستقل ماقما را نشان می‌دهد. این منطقه از نظر تکتونیکی، به‌دلیل کشش ناحیه‌ای دارای شکستگی‌هایی با راستای NW، NE و N است، که مجازی اصلی خروج ترکیبات آرسنیک‌دار و دیگر عناصر جزئی با منشأ ژئوژنیک است که در تراوونت‌ها، بازالت‌های روزنگی‌دار و هارن‌های پلیوسن تجمع یافته‌اند. شاخص آلودگی (CIP) خاک‌های سطحی منطقه به سه دسته بدون آلودگی، آلودگی ضعیف و آلودگی متوسط تا خیلی شدید توسط عناصر سمعی قابل تقسیم است. این آلودگی‌های با منشاء ژئوژنیک می‌توانند خطرات فراوانی برای سلامتی انسان و حیوانات داشته باشند. در مطالعه حاضر نمونه‌های آب و خاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت. شاخص فلزی (MI) در منابع آب جنوب‌باختر بیجار نشان مخصوصاً آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. در دسته غیر قابل شرب طبقه‌بندی می‌دهد که همه نمونه‌های آب دارای فلزات سنگین هستند و در دسته غیر قابل شرب WHO و EPA می‌شوند. شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) بر مبنای استانداردهای آب شرب WHO و WHO به ترتیب در ۵۰ و ۶۱ درصد منابع آب منطقه بر سلامت انسان‌ها اثرات مخرب دارد، در حالی‌که با استاندارد آب شرب ایران تنها ۲۱ درصد از سلامتی انسان‌ها به خطر می‌افتد. با توجه به اینکه تمرکز اولیه مطالعه روی آرسنیک بوده، اندازه گیری‌های بیولوژیک از انسان و گوسفندان منطقه نشان می‌دهد که غلظت این عنصر سمعی در بدن این موجودات بسیار بالا است. بر اساس نتایج اولیه آنالیزها، تأثیر آرسنیک به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قسمت‌های سیستم ایمنی ذاتی گوسفند، نشان داد که آرسنیک قادر می‌کرود کشی لکوستیت‌های خون را کاهش می‌دهد. برای شناسایی و تفکیک پهنه‌های نایپوسته و پراکندگی زمین‌های با آلودگی‌های ژئوژنیک در راستای محور قروه-بیجار-تکاب، بررسی‌هایی بازگ مغایس برای تهیه نفشه‌های کاربردی پهنه‌های آلوه و برای تعیین جایگاه و ارائه مدل تکتونیکی با بررسی‌های زمین‌شناسی ساختمانی پیشنهاد می‌شود. همچنین بررسی‌های سلولی-مولکولی بیشتری بر روی اثرات آرسنیک در سیستم ایمنی حیوانات و انسان‌های منطقه در آزمایشگاه‌ها توصیه می‌شود.

**کلید واژه‌ها:** بیجار، آتشفشن کواترنری، آرسنیک ژئوژنیک، شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، سیستم ایمنی

### Determination of source and indices of metal pollution in water and soil and their effects on animal and human immune system, SW Bijar, Kurdistan

#### Abstract:

The SW Bijar area in Kurdistan province is part of NE-SE trend of quaternary volcanoes belt at the northern Sanandaj- Sirjan magmatic-metamorphic zone, horizontally positioned on Ghorveh- Bijar- Takab, is the metallogenic province, at which two cycles of volcanic activities in the upper Miocene and Pleistocene have been recorded. Contemporary existence of basic and acidic magmas at the last phase shows two independently different sources. Due to regional tensional tectonics, this area contains network of fractures towards NW, NE and N trends that forms a way and channels for arsenic and other geogenic toxic chemical compounds to appear in water resources and soil; this kind of geogenic source normally accumulates in travertines, porous basaltic rocks and Pliocene marls. Based on the toxic elements, coefficient of industrial pollution (CIP) of topsoils in the area is divided into three groups: non-contamination, weak contamination and medium to very strong contamination.