

**دومین کنگره ایساوسی دانشجویی دامپزشکی ایران**

سیمه تعالی

**هل پیشوور الغایر یعلوون و الغایر یعلوون**

جناب آقای  
معلم کارکنانه

محمد مهدی قهرمانی سبو

با کمال تشکر از تشریف فرمائی شما در دومین کنگره ایساوسی دانشجویی دامپزشکی ایران که در تاریخ ۲۵-۲۶ آردیبهشت ۱۳۹۰ بیانی از مردم پذیرفته شده است،  
جنابعالی تحت عنوان سلطان پیغمبر حرام های اهله  
در این کنگره بس از تأیید هفت علمی به صورت سخنرانی از الله مریده است.

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دکتر سید محمد مهدی کیانی

رئیس کنگره

دکتر علی پورضا خسروی

سرطان بیضه در دامهای اهلی  
محمد مهدی قهرمانی سنو - انترن دا مپزشکی شیراز  
زیر نظر دکتر محمد رحیم احمدی نیا - استادیار بخش ما مای

از دیدگاه بافت شناسی سمعنکرا ملی بیضه سلولهای زایا، سلولهای سرتولی و سلولهای بینی می باشد. شایع ترین سرطانها نیز از اینها متولد می گیرند.

سرطان بیضه غالب در حیوانات مسن دیده می شود و پس از پوست بیشترین موارد ابتلا به سرطان رادرسگ نرنسان می دهد. سن متوسط تشخیص سرطان سرمهور اولیه بیضه درسگ ۱۰-۱۱ سالگی می باشد و اکثر سگها مبتلا به آن پنج سال سن دارند.

سرطان بیضه در گربه بسیار نادر می باشد. در این گونه مواردی از تومور سلولهای سرتولی و تومور سلولهای بینی گزارش شده است.

تومورهای اولیه بیضه در حیوانات بزرگ Large Animals ام درگا و های مسن نسبت به نریان و قوچ شایع ترند. بین نهان خانگی Cryptorchidism و سرطان بیضه رابط معناداری وجود دارد.

تومور سلولهای بینی شایع ترین تومور بیضه درسگ و گاوی می باشد و غالب تومورهای خوش خیمی است. درگا و این تومورها کیفیت منی را تحت تاثیر قرار می دهند. در بعضی موارد سلولهای تومور ترکیبات استروژنی یا آندروژنی تولید می کنند. اندازه معمول توموریک میلی متر تا دوسانتی متريا بیشتر می باشد. در مقطع توده تومور کروی با رنگ متما بیل به زردیسا خرمایی و شبیه جسم زرد می باشد.

از نظر شیوع دومین تومور بیضه درسگ و شایع ترین تومور بیضه در اسب می باشد. در قوچ، گوزن و گا و نیز گزارش شده است. این تومورها زلولهای سری اسپرم ساز و به احتمال زیاد از اسپرم توانی های یا یه منشاء می گیرد. اغلب قبل از برداشت تاشن سانتی مترمی دارد.

رسدآرام دارد اما هر رمان می یواندیده سرعت توسعه باید. بزرگ شدن شاگهای بیضه و درد حاصل از خونریزی و نکروز علائم شایع هستند که مبتلا به خاطر آنها مراجعت می کند. در مقطع تومور لوبوله Lobulated است و رنگ سفید مایل به خاکستری و قوامی بال نسبت نرم دارد. جناحه کمی چلاند شود اما بیشتر شیری ممکن است از سطح برش خارج شود. تومور سلولهای سرتولی در حیوانات اهلی غیر از سگ نادر می باشد ولی درگا و، اسب، قوچ و گربه گزارش شده است. از نظر شیوع درسگ در رده سوم قرار دارد. رسدآرام دارد و اغلب باعث بزرگ شدن بیضه می باشد می شود. فقط ۴۰٪ در بیضه های واقع در کیسه بیضه روح می دهد. مهمترین عارضه حاصل از این تومور ستردرم Feminizing ممکن است نشان دهد استروژن از سلولهای تومور می باشد. سگهای مبتلا علائم Alopecia افزایش رنگدانهای پوست، آتروفی آلت تناسلی و کاهش میل جنسی، Myelotoxicosis و Gynaecomastia ممکن است نشان دهد متابازدر ۱۵-۲۰٪ موارد دیده می شود. تومور بمحور توده ای سفت ولوبوله Lobulated با بافتی مشبک سفید تا قهوه ای نمایان می شود. Teratomas عوامل "تومورهای خوش خیم بیضه اند. در حیوانات اهلی بجز اسب نادر است. تومور ممکن است داری مو، استخوان، چربی، غضروف، بافت عصبی و حتی دندان باشد. جراحی و برداشتن بیضه مبتلا نهارا درمان قطعی است و در مواردی که بیما رعوا رض حاصل از ترشح هورمون نظری Myelotoxicosis را شان می دهند در مانهای کمکی و نگهدارنده نظری انتقال خون و تجویز آنستی - بیوتیک و همای تینیک ها قبل و بعد از جراحی باستی انجام گیرد.