

اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۵

تعیین راهبردهای مناسب کمآبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

محمود صبوحی^{*}، دکتر غلامرضا سلطانی^{**}، دکتر منصور زیبایی^{*}

دکتر جواد ترکمانی^{**}

تاریخ دریافت: ۸۴/۸/۱۰ تاریخ پذیرش: ۸۵/۱۲/۴

چکیده

مقاله حاضر بخشی از کارتحقیقاتی تعیین راهبردهای مناسب کمآبیاری در منطقه خراسان با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی است. به این منظور مدل برنامه ریزی ریاضی در قالب برنامه ریزی خطی با محدودیت تصادفی ساخته شد و ضرایب فنی به طریقی متفاوت با تعیین ضرایب فنی متعارف در برنامه ریزی خطی مشخص گردید. این مدل در حالت با و بدون ریسک در مقدار آب در دسترس و با و بدون چگندرفتند در سه سطح کارایی ۳۵، ۴۵ و ۶۵ درصد در مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و در نظر گرفتن ۴۵ تن ش متفاوت در مراحل مختلف رشد محصولات زراعی نمونه حل شد که نتایج سطح کارایی ۴۵ درصد در این مقاله

e-mail: msabuhi39@yahoo.com

* عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

** به ترتیب: استاد، استادیار و دانشیار دانشگاه شیراز

ارائه شده است. این نتایج نشان می‌دهد که سطح کارایی در مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه برای کشاورزان نمونه بیش از ۳۵ درصد است و کاهش مصرف آب دریک فعالیت الزاماً منجر به کاهش مصرف آب در الگوی کشت نمی‌شود. همچنین تخصیص بهینه آب آبیاری در سطح مزرعه زمانی اتفاق می‌افتد که بازده نهایی آب هم در مراحل مختلف رشد گیاه و هم در مراحل مختلف رشد گیاهان کشت شده در مزرعه برابر باشد. امکان افزایش سودخالص اجتماعی نیز هنگامی وجود دارد که چون در مراحل مختلف رشد گیاه و هم در مراحل مختلف رشد گیاهان کشت شده در مزرعه برابر باشد. امکان افزایش سودخالص اجتماعی نیز هنگامی وجود دارد که چون در مراحل مختلف رشد گیاه و هم در مراحل مختلف رشد گیاهان کشت شده در مزرعه برابر باشد. امکان افزایش سودخالص اجتماعی افزایش می‌یابد. به علاوه، یافته‌ها نشان می‌دهد در تعیین قیمت آب آبیاری باید دو عامل کارایی مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و منافع خالص اجتماعی در نظر گرفته شود با این توجه که از بعد منافع اجتماعی، در افزایش قیمت آب آبیاری محدودیت وجود دارد.

کلید واژه‌ها:

برنامه‌ریزی ریاضی، محدودیت تصادفی، کم آبیاری، سود اجتماعی، کارایی مصرف آب آبیاری

مقدمه

ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و منبع اصلی تأمین آب آن بارشهای جوی است که حدود ۴۲۹ میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. از این مقدار 30.5×10^9 متر مکعب (٪ ۷۱) به سبب تبخیر و تعرق از دسترس خارج می‌گردد، 8.6×10^9 متر مکعب (٪ ۲۱) به صورت آبهای سطحی جریان پیدا می‌کند و 3.8×10^9 متر مکعب به منابع آبهای زیرزمینی نفوذ می‌کند. از 7.5×10^9 متر مکعب آب در دسترس سطحی و زیرزمینی، 7.25×10^9 متر مکعب در بخش کشاورزی، 2×10^9 متر مکعب در بخش خانوارها و 0.5×10^9 متر مکعب در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف

تعیین راهبردهای مناسب ...

آبیاری ۷/۶ میلیون هکتار زمین در سال می‌شود که آبیاری ۶ میلیون هکتار آن به طور سنتی و ۵/۰ میلیون هکتار از راه آبیاری تحت فشار انجام می‌گیرد و ۱/۱ میلیون هکتار به صورت آیش نگهداری می‌شود (Pazira & Sadeghzadeh, 1999). متوسط بارندگی سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلی متر است که ۴۰ درصد کمتر از متوسط بارندگی سالانه آسیا و تقریباً ۳۳ درصد متوسط بارندگی سالانه جهان می‌باشد. افزون بر آن، توزیع بارندگی، توزیع منابع آب (سطحی وزیرزمینی) و توزیع جمعیت با توجه به سطح کشور به شدت نابرابر می‌باشد. به طور مثال، منابع بالقوه آب تهران کمتر از ۲ درصد کل منابع آب کشور است در حالی که ۲۰ درصد جمعیت کشور را در بردارد (Vojdani, 2003).

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، بالا رفتن کیفیت سطح زندگی و رشد بخش صنعت باعث تقاضای فزاینده برای آب شده است. جهت پاسخگویی به این تقاضای رو به گسترش، سیاستهای توسعه منابع و افزایش عرضه آب از طریق ساخت سدهای مخزنی و چندمنظوره، احداث بند و کانالهای انتقال آب و سیاستهای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مورد توجه بوده است. اما، به دلایل مختلف از جمله طراحی بعضًا ناقص، نگهداری ضعیف، بهره برداری غیر اصولی و پراکندگی مراکز تصمیم گیری، کارایی طرحهای آبیاری پایین بوده به طوری که بازده آبیاری در کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد گزارش شده است (Pazira & Sadeghzadeh, 1999) برابری، تأمین امنیت غذایی، تسریع رشد اقتصادی و گسترش فناوری باعث مصرف و بهره برداری بی رویه از بعضی نهادهای تولید از جمله آب آبیاری شده، به طوری که در حال حاضر در سطح کشور بیلان آبهای زیرزمینی منفی (۹- کیلومتر مکعب در سال) است (Siadat, 2000).

چنین بهره برداری بی رویه ای در سطح استان خراسان کاملاً مشهود است. آمارهای موجود نشان می دهد که حجم بهره برداری از آبهای زیرزمینی در حال حاضر ۹/۷ میلیارد متر مکعب در سال است که ۱/۷ میلیارد متر مکعب آن بیش از ظرفیت ذخایر آبهای زیرزمینی استان می باشد. این برداشت اضافی باعث کاهش سالانه مقدار آب تعداد زیادی از دشتهای استان

گردیده، به طوری که از ۷۶ دشت استان در ۶۳ دشت بهره‌برداری‌های جدید ممنوع اعلام گردیده است (وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان، ۱۳۸۲).

نظریه اینکه عرضه آب به دلایل محدودیت بودجه‌ای، افزایش هزینه‌های تهیه عرضه آن و حرکت به سمت منابع غیرستنی، با محدودیت رویه روست. تأکیدها جهت بهره‌برداری از منابع آب به سمت مدیریت تقاضای آب در حال تغییر است. در مدیریت تقاضای آب استفاده کارا از منابع آب قابل دسترس مورد توجه است (Johansson & et al., 2002).

در خراسان، به دلیل آنکه بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف‌کننده آب (در حدود ۹۶٪) می‌باشد (وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان، ۱۳۸۲)، مدیریت تقاضای آب در سطح منطقه و مزرعه بیشتر مورد توجه است. لذا، در تحقیق حاضر مسئله بهره‌برداری بهینه و افزایش بازده آب آبیاری از منابع موجود از بعد اجتماعی بررسی شده است.

روش تحقیق

کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت و یا تخصیص نهاده‌های تولید، نظری آب، در اقتصاد کشاورزی سابقه طولانی دارد. این کاربرد روند تکاملی خود را در سطح مزرعه، منطقه و یا بخش داشته است. در طرحهای توسعه منابع آب، به دلیل اهمیت اثر مصرف آب در فعالیتهای مختلف بر مقدار درآمدهای حاصل از پرورش، تخصیص بهینه آب در سطح منطقه و یا حوضه آبریز مورد توجه بوده است. افزون بر آن، به دلیل اهمیت زمان مصرف آب در عملکرد محصول، در مدل‌سازی تخصیص بهینه آب به این مسئله به تدریج توجه شده است. برنامه‌ریزی خطی بیشترین کاربرد را در مدل‌سازی تخصیص آب داشته است. این روش را در ایران اولین بار سلطانی (۱۳۷۲) در تعیین الگوی بهینه کشت در زیرسد درودزن به کار برد. یرون و دینر (Yaron & Dinar, 1982) با تلفیق برنامه‌ریزی خطی و پویا به مسئله زمان آبیاری توجه کردند. علاوه بر برنامه‌ریزی خطی، از جمله روش‌های دیگری که در بهینه‌سازی تخصیص آب بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، برنامه‌ریزی چندمنظوره^۱ است. به طور مثال

تعیین راهبردهای مناسب ...

مینودین و همکاران (Mainuddin & et al., 1997) مسئله برنامه‌ریزی زراعی بهینه را در طرح آبیاری آبهای زیرزمینی موجود در تایلند با اهداف حداکثرسازی سودخالص و سطح زیرکشت آبی بررسی کردند.

یکی دیگر از جنبه‌هایی که در مدلسازی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده تلفیقی از آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین تلفیق جنبه‌های هیدرولوژیکی و اقتصادی آب است. برای نمونه رزگرانت و همکاران (Rosegrant & et al., 2000) در مقیاس حوضه آبریز رودخانه می‌پادرشیلی الگوی تلفیقی از اقتصادوهویدرولوژی را در بهره برداری از این رودخانه ارائه کردند.

ماهیت تصادفی مقدار آب قابل دسترس با استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت تصادفی^۱ در بیشتر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال ماجی و همکاران (Maji & et al., 1978) از این روش در تعیین الگوی بهینه کشت و مدیریت سیاست‌گذاری حوضه آبریز در هند استفاده کردند. در مدلسازی تخصیص آب در مقیاس دشت، منطقه و یا حوضه آبریز سعی شده است که رابطه آب، خاک و گیاه در حداکثرسازی عملکرد محصولات مختلف ویا درآمد مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برای مثال قهرمان و سپاسخواه (Gharaman & Sepaskhah, 2004) مسئله حداکثرسازی درآمد ناخالص از مقدار آب محدود در مقیاس منطقه‌ای را با استفاده تلفیقی از بهینه‌سازی غیرخطی والگوریتم تراز آب و خاک بررسی کردند. زیبایی (Zibae, 2002) در طراحی راهبردهای آبیاری در استان فارس تمام جنبه‌های فوق را با هدف حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری در مدل خود لحاظ کرد. تمام الگوهای فوق به این مسئله که آیا فعالیتهای در نظر گرفته شده از لحاظ اجتماعی دارای مزیت نسی تولیدند یا خیر، توجهی ندارند.

الگوی به کار رفته در مطالعه حاضر در اصل در قالب یک مسئله برنامه‌ریزی خطی و استفاده از برنامه‌ریزی محدودیت تصادفی قرار می‌گیرد. ویژگی‌ای که در این الگو رعایت شده آن است که قیمت یا ارزش اجتماعی عوامل تولید و فعالیتها منظور شده و همچنین ضرایب فنی

1.chance constrained programming

به صورتی متفاوت با مدل سطح مزرعه تعیین گردیده است. درواقع، مدل بافرض نبود هیچ‌گونه انحراف ناشی از مداخله دولت و یا نقص بازار، پی‌ریزی شده است.

نظر به اینکه یکی از نهادهای اساسی در فرایند تولید محصولات زراعی آب آبیاری است و با توجه به نبود تعادل در عرضه و تقاضای آن، مدل تنها با فرض محدودیت آب آبیاری طراحی شده است، به بیان دیگر فرض گردیده سایر عوامل به مقدار کافی وجود دارد.

در سطح حوضه آبریز، تعیین الگوی بهینه کشت از دید سیاستگذار و نه کشاورز مطرح است و لذا فرض حداکثرسازی منافع اجتماعی با توجه به محدودیتهای موجود یکی از اهدافی به شمار می‌آید که می‌توان گفت سیاستگذاریه دنبال آن است. این موضوع را با استفاده از نهاده آب می‌توان توضیح داد. در سطح مزرعه، کشاورز در استفاده از آب موجود به دلیل توسعه نیافتگی بازار آب با گزینه مصرف و یا عدم مصرف رویه روست. از طرف دیگر، امکان ذخیره آب برای کشاورز واستفاده از آن در آینده، به دلیل ویژگی دسترسی آزاد به منابع آب، وجود ندارد درنتیجه، تمایلی در وی جهت صرفه جویی در مصرف آب مشاهده نمی‌شود. در این شرایط دولتها می‌کوشند با برگزیدن سیاستهایی همچون قیمتگذاری آب، انگیزه صرفه جویی و بهره‌برداری بهینه از منابع آب را در کشاورزان ایجاد و تقویت کنند. لذا، چون مدل در شرایط عاری از نقص بازار (دسترسی آزاد) و نبود مداخله دولت (مثالاً سیاست قیمتگذاری) طراحی می‌شود، لازم است ضرایب فنی به گونه‌ای تعیین شود که تحت تأثیر حالات فوق نباشد.

ساختار مدل برنامه‌ریزی شده به صورت زیر است:

$$\begin{aligned}
 & \text{maximise} && NSB = \sum_{c=1}^n \sum_{d=1}^m [ya_{cd}(sp_c - sc_c) - w_{cd} \times pw]x_{cd} \\
 & \text{subject.to} && \sum_{c=1}^n \sum_{d=1}^m x_{cd} = \bar{x} \\
 & && \sum_{d=1}^m x_{cd} \leq \bar{x}_c \quad \forall c \\
 & && \sum_{c=1}^n \sum_{d=1}^m w_{cd} x_{cd} \leq \bar{w} - Z_\alpha \sigma_w \\
 & && x_{cd} \geq 0
 \end{aligned} \tag{1}$$

تعیین راهبردهای مناسب ...

که در آن NSB منافع خالص اجتماعی، $y a_{cd}$ عملکرد واقعی محصول C در واحد سطح در حالت کم آبیاری d ام (نحوه به دست آوردن این متغیر در ادامه توضیح داده شده است)، sp_c ارزش اجتماعی یا قیمت سایه‌ای واحد محصول C در منطقه و SC_c هزینه‌های اجتماعی تولید واحد محصول C در منطقه بدون هزینه آب است. همچنین X_{cd} سطح فعالیت C در کم آبیاری d ام، \bar{x}_c کل سطح زیرکشت، \bar{x}_c حداکثر سطح زیرکشت محصول C و w_{cd} نیاز آبی محصول C در منطقه است که مقدار آن براساس تشخیصات مختلف در مراحل رشد گیاه بالحظ کردن سه سطح کارابی در سیستم بهره‌برداری و مصرف آب در سطح مزرعه محاسبه می‌گردد (نحوه به دست آوردن این متغیر نیز در ادامه توضیح داده شده است). این محدودیت به دلیل تصادفی بودن مقدار آب آبیاری در دسترس، به صورت محدودیت احتمالی و یا تصادفی در نظر گرفته شد.

برنامه‌ریزی محدودیت تصادفی را چارنزو کوپر (Charnes & Cooper, 1959) پیشنهاد کردند. نبود حتمیت در سمت راست (منابع) مدل برنامه‌ریزی خطی با این فرض که تصمیم‌گیرنده مایل به ساختن یک وضعیت احتمالی نسبت به فراوانی مقدار منابع موجود می‌باشد، بررسی شده است. احتمال آنکه مقدار محدودیتی بزرگتر یا مساوی مقدار a_i از پیش تعیین شده باشد، به صورت زیرمی‌توان نشان داد (McCal & Spreen, 2005)

$$pr\left[\sum a_{ij}x_j \leq b_i\right] \geq \alpha \quad (2)$$

اگر مقدار متوسط سمت راست b_i از دو طرف رابطه بالا کسر و هر دو طرف بر انحراف معیار ضریب سمت راست (σ_{bi}) تقسیم شود، محدودیتهاي بالا به صورت زیر در می‌آيد

(همان منبع):

$$pr\left[\frac{\sum a_{ij}x_j - \bar{b}_i}{\sigma_{b_i}} \leq \frac{(b_i - \bar{b}_i)}{\sigma_{b_i}}\right] \geq \alpha \quad (3)$$

در رابطه بالا $\frac{b_i - \bar{b}_i}{\sigma_{b_i}}$ خطاهای استانداردی را به دست می‌دهد که b_i را از مقدار میانگین آن دور می‌سازد. این عبارت با Z نشان داده می‌شود. زمانی که از حدیک احتمال خاص (α) استفاده شود، مقدار مناسب Z_α است و درنتیجه، محدودیتها به صورت زیر در می‌آید (همان منبع):

$$pr\left[\frac{\sum a_{ij}x_j - \bar{b}_i}{\sigma_{b_i}} \leq z_\alpha\right] \geq \alpha \quad (4)$$

و برای نشان دادن ریسک درست راست، محدودیتها را به صورت زیرمی توان نوشت (همان

منبع):

$$\sum a_{ij}x_j \leq \bar{b}_i - z_\alpha \sigma_{b_i} \quad (5)$$

محدودیتهای فوق نشان می دهد که مصرف منبع ($\sum a_{ij}x_j$) باید کمتر یا مساوی مقدار متوسط منبع منهای انحراف معیار ضرب در سطح بحران ناشی از سطح احتمال باشد. لذا، در مدل ۱، \bar{W} مقدار متوسط آب در دسترس است که در مطالعه حاضر در سطح ۱ هکتار محاسبه شد. مقدار Z_t را به دو طریق می توان تعیین کرد: یکی با فرضی راجع به توزیع احتمال (مثال نرمال) و دیگری به برآورده محافظه کارانه از نابرابری کیبی شف^۱. گفتنی است در مطالعه حاضر روش اول مورد استفاده قرار گرفت.

نیازآبی محصول از روش پنمن- مونتیت^۲ محاسبه می شود. کل نیاز آبی گیاه (REQ_t) در طول ماه t با استفاده از رابطه ۶ محاسبه می شود (Evans & et al., 2003)

$$REQ_t = ET_o \times K_{ct} \quad (6)$$

که در آن ET_o مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ماه t و K_{ct} ضریب محصول متناسب با ماههای رشد محصول است. نیازآبی محصول Z_t از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$w_j = \frac{REQ_t - EP_t}{IE} \quad (7)$$

که در آن EP_t بارندگی مؤثر در ماه t و IE شاخصی از سطح کارایی سیستم توزیع آب است (Evans & et al, 2003)

به دلیل آنکه سود اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عملکرد محصول است و با توجه به اینکه عملکردهای مشاهده شده در سطح مزرعه و حوضه آبریز علاوه بر عوامل جوی، از سیاستهای حاکم بر بخش کشاورزی نیز متأثر می باشد (به طور مثال سیاستهای قیمتگذاری نهاده های اعتبارات و کود بر سطح مصرف این عوامل در مزرعه و در نتیجه،

1.Chebyshev's inequality

2. Penman-Monteith method

تعیین راهبردهای مناسب ...

بر عملکرد محصول مؤثر است). لذا، می‌توان گفت عملکرد مشاهده شده در واقع عملکردی انحرافی است و در نتیجه برای تعیین دقیق‌تر منافع اجتماعی، تعیین عملکردی لازم به نظرمی‌رسد که متأثر از این سیاستها نیست و صرفاً تابعی از رابطه آب و خاک و گیاه است.

جهت تعیین عملکرد واقعی می‌توان از رابطه زیر، که از سوی آلن و همکاران (Allen & et al., 1988) مطرح شده است، استفاده کرد.

$$\frac{y_a}{y_p} = \prod_{i=1}^n \left[1 - k y_i \left(1 - \frac{AET_i}{PET_i} \right) \right] \quad (8)$$

که در آن n کل مراحل رشد محصول، y_a و y_p به ترتیب عملکرد واقعی وبالقوه، AET و AEP به ترتیب تبخیر و تعرق واقعی و بالقوه و k فاکتور پاسخ عملکرد است. با توجه به رابطه بالا، عملکرد واقعی را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد:

$$y_a = y_p \times \prod_{i=1}^n \left[1 - k y_i \left(1 - \frac{AET_i}{PET_i} \right) \right] \quad (9)$$

داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز

در تهیه اطلاعات مورد نیاز در زمینه قیمت، هزینه و منافع اجتماعی و خصوصی نهاده‌ها و محصولات زراعی تحت بررسی از کار تحقیقاتی "تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی" سلطانی و همکاران (گزارش چاپ نشده) استفاده شده است. افزون برآن، جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از سطح مزرعه، ابتدا روستاهای منطقه مورد مطالعه، حوضه آبریز حریرود و کشف رود (دشت‌های مشهد، نریمانی، سنگ بست) با استفاده از اطلاعات GIS شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان، به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس از راه مصاحبه حضوری با کشاورزان این روستاهای، که آنها نیز به طور تصادفی انتخاب شدند، ۲۵۰ پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات تکمیلی نیاز از طریق مصاحبه و یا استفاده از کارهای تحقیقاتی بعضی از متخصصان منطقه و استادان دانشگاه فردوسی به دست آمد.

برای ساختن مدلی که کم آبیاری در آن در نظر گرفته شده باشد به اطلاعاتی درباره عملکرد بالقوه و نیاز آبی گیاه در مراحل مختلف رشد نیاز است. مقدار عملکرد بالقوه برای محصولات نمونه براساس تجربه کشاورزان در ۱۰ سال گذشته و همچنین نظر بعضی

از کارشناسان کشاورزی به دست آمد. مقادیر به دست آمده، در برنامه نوشتۀ شده به زبان GAMS/MINOS (Brooke & et al., 1988) نشان داده شده است. برای تعیین نیازآبی گیاهان از تحقیق و مطالعه وزارت کشاورزی سابق و سازمان هواشناسی کشور استفاده گردیده است. این تحقیق با روش مطرح شده در این مطالعه همسو است و پاراگراف زیر که نقل قولی است مستقیم از آن مطالعه نشانده‌شده این مسئله می‌باشد.

"در این طرح داده‌های مربوط به تاریخ کاشت و برداشت و طول دوره رشد محصولات زراعی و باغی و ضرایب گیاهی آنها براساس مطالعات صحرایی انجام شده برروی کلیه دشت‌های کشاورزی کشور (۶۲۰) می‌باشد. علاوه بر آن از نتایج پژوهش‌هایی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته نیز سود جسته شده است. اطلاعات هواشناسی مورد استفاده در یک دوره ۳۰ ساله بصورت روزانه از کلیه ایستگاه‌های سینوپتیک، اقلیم شناسی و کشاورزی کشور جمع‌آوری و پس از حک و اصلاح در محاسبات استفاده شده‌اند. برای هر کدام از دشت‌ها یک یا چند ایستگاه معرف انتخاب و محاسبات بر بنای داده‌های آن ایستگاه بوده است. انتخاب ایستگاه معرف با توجه به موقعیت دشت و ایستگاه و بازدیدهای محلی و مشاوره با متخصصین کشاورزی محل انجام شده است. برای محاسبات نیازآبی روش فائق پنمن - مانیت در دوره‌های ۱۰ روزه و ماهانه بکار گرفته شده است که در نتیجه تبخیر - تعرق، باران موثر و نیاز خالص آبیاری در هر دوره، ماه و فصل زراعی محاسبه شده است." (وزارت کشاورزی، سازمان تات، ۱۳۷۵).

اطلاعات استفاده شده از مطالعه فوق برای هر ۱۰ روز از مراحل رشد گیاهان نمونه و محاسبه آن برای هر یک از مراحل رشد آنها در برنامه نوشتۀ شده آمده است. یادآوری می‌شود که مدت زمان هر مرحله از مراحل رشد گیاهان نمونه با مشاوره با بخش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و کشاورزان نمونه تعیین گردیده است.

حداکثر سطح زیرکشت محصولات در مدل برابر با مقدار موجود آنها در نمونه در سطح ۱ هکتار در نظر گرفته شد. به دلیل محدودیت نرم افزار مورد استفاده که حداکثر ۳۰۰ فعالیت را می‌تواند در نظر بگیرد، هر فعالیت در مدل به صورت ۴۵ فعالیت یا ۴۵ تنش آبی متفاوت برای

تعیین راهبردهای مناسب ...

هر محصول (مجموعاً ۶ محصول) در نظر گرفته شد. به دلیل وجود نداشتن امکان جمع آوری اطلاعات دقیق از میزان تنشی که کشاورزان در عمل استفاده می‌کنند و مقدار آن هم برای هر کشاورز می‌تواند متفاوت باشد، با استفاده از نرم افزار اکسل، اعداد تصادفی کوچکتر از ۱ و بزرگتر از ۵/۰ برای میزان تنش گیاه در هر مرحله از مرحله پنجگانه رشد گیاهان در نظر گرفته شد (برای گیاهانی مثل چغندر قند که ریشه آنها استفاده می‌شود، تنش در مرحله گلدهی بدون معنی است). اعداد به دست آمده در برنامه نوشته شده موجود است.

مقدار ریسک در میزان آب در دسترس در سطح ۸۰، ۸۵ و ۹۰ درصد برای مقدار Z_a در نظر گرفته شد. از طرف دیگر، به دلیل اهمیت بازده آبیاری در آبیاری محصولات زراعی، سه سطح کارایی ۴۵، ۴۵ و ۳۵ درصد منظور گردید. در دیف محدودیتهای مدل، به دلیل آنکه چغندر قند در منطقه براساس کار تحقیقاتی سلطانی و همکاران، قادر مزیت نسبی است، از محدودیت چغندر قند به عنوان ردیف انتقال استفاده شد و سطح زیرکشت چغندر قند به یکی از محصولاتی که تقریباً هم زمان با آن کشت می‌شود، انتقال یافت. لذا، در جواب بهینه مقدار سطح زیرکشت چغندر صفر است.

گفتگی است که در تابع هدف مدل، هزینه اجتماعی آب آبیاری به صورت جداگانه لحاظ شده است. به دلیل عملکردهای متفاوتی که از حل مدل برای محصولات به دست می‌آید، با استفاده از یافته‌های کار تحقیقاتی سلطانی و همکاران، هزینه اجتماعی تولید ۱ کیلوگرم از محصولات مورد بررسی محاسبه و هزینه آب آبیاری از آن کم شد و به عنوان هزینه اجتماعی تولید ۱ کیلوگرم محصول بدون هزینه اجتماعی آب در مدل به کار رفت. در کار تحقیقاتی سلطانی و همکاران ۴ نرخ بهره و در نتیجه، ۴ قیمت آب به کار گرفته شد. در مدل حاضر از نرخ بهره ۶ درصد و قیمت ۲۰/۷۲ تومان برای هر مترمکعب آب استفاده گردید. افزون بر آن، در سطح کارایی مورد نظر، قیمت‌های مختلفی در نظر گرفته شد تا قیمتی که به ازای آن، منافع اجتماعی در سه سطح کارایی و در حالت نبود ریسک در مقدار آب در دسترس صفر می‌گردد، مشخص شود. این قیمت حداقل قیمتی است که برای آب آبیاری می‌توان در نظر گرفت.

نتایج و بحث

در این قسمت نتایج حاصل از حل مدل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بعضی از نتایج حل مدل در سطح کارایی ۳۵ درصد در جدول ۱ نشان داده شده است. با توجه به این جدول مشاهده می‌شود که بیشترین مقدار متوسط آب آبیاری کم آبیاری‌های در نظر گرفته شده، مربوط به چوندر با ۲۰۱۸۵ و کمترین مربوط به جو با ۶۰۴۰ مترمکعب در هکتار می‌باشد. مقایسه بین حداقل میزان آب آبیاری مورد نیاز برای محصولات نشان می‌دهد که بیشترین و کمترین آب آبیاری مورد نیاز به ترتیب مربوط به چوندر قند با ۱۷۰۱۸ و جو با ۴۷۰۸ مترمکعب در هکتار است. ملاحظه می‌شود که دامنه تغییرات بین حداقل و حداقل آب آبیاری مورد نیاز در چوندر قند نسبت به سایر محصولات نمونه کمتر و نسبت حداقل آن برابر ۱/۴۹۷ می‌باشد. این مقدار برای سیب زمینی به بیشترین مقدار خود یعنی ۱/۷۸۴ می‌رسد. مقایسه بین متوسط آب آبیاری نمونه و کم آبیاری‌های در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد که مقدار آب مصرفی در یک هکتار کشت موجود در گندم و پیاز به ترتیب ۱۰ و ۱۶ درصد بیشتر و برای جو، چوندر قند، گوجه فرنگی و سیب زمینی به ترتیب ۲/۹۵، ۲۳/۵۴، ۱۰/۸۶ و ۱۶/۷۹ درصد کمتر است. مقایسه بین میانگین متوسط کم آبیاری‌های در نظر گرفته شده و متوسط آب آبیاری در کشت موجود نشان می‌دهد که در کشت موجود در هکتار ۹ درصد آب آبیاری کمتر مصرف می‌شود. با توجه به جدول ۱ ملاحظه می‌گردد که عملکرد موجود و متوسط عملکرد واقعی به دست آمده با یکدیگر اختلاف دارند و برای گندم، چوندر، پیاز و سیب زمینی به ترتیب ۱۱/۹، ۲/۴، ۵/۴ درصد عملکرد موجود از عملکرد واقعی کمتر است. برای جو و گوجه فرنگی عملکرد موجود از عملکرد واقعی به ترتیب ۱/۲ و ۳۸/۳ درصد بیشتر است. اختلاف زیاد در گوجه فرنگی به نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بالقوه بر می‌گردد که هم حداقل و هم حداقل آن نسبت به محصولات دیگر کمتر می‌باشد و کلاً دامنه خوبی برای آن به دست نیامده است. یادآوری می‌شود که مقادیر تنش به طور تصادفی بین ۱۰/۵ در نظر گرفته شده است.

تعیین راهبردهای مناسب ...

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول ۱ می‌توان نتیجه گرفت که بازده آبیاری در سطح نمونه بین محصولات متفاوت است و کارایی مصرف آب در کل نمونه بیشتر از ۳۵ درصد می‌باشد. افرون برآن، به نظرمی‌رسد که اگر مقدار سطوح کم آبیاری در نظر گرفته شده بیشتر می‌بود نتایج احتمالاً به واقعیت‌های موجود نزدیک‌تر می‌شد. با این حال، نتایج به دست آمده در سطح کارایی ۳۵ درصد خیلی به واقعیت‌های موجود در سطح مزرعه نزدیک است. شاید بتوان گفت روش عملی تعیین بازده آب آبیاری در سطح مزرعه روش به کار گرفته شده در این مطالعه می‌باشد: یعنی الف) تعیین مقادیر آب آبیاری در سطوح مختلف کارایی با سطوح متفاوت تنش در مراحل رشد گیاه، ب) مقدار آب آبیاری مورد نیاز و عملکرد واقعی و ج) مقایسه نتایج به دست آمده با وضعیت موجود در سطح مزرعه. احتمالاً همکاری با متخصصان آب و خاک بتواند به تقویت این روش جهت تعیین حدود کارایی آب آبیاری در سطح مزرعه کمک کند. به نظرمی‌رسد اختلاف حدود ۱۲ درصدی بین مصرف متوسط آب در نمونه با متوسط به دست آمده از مدل، شاخص خوبی برای توجه به بهبود این روش جهت تعیین حدود بازده آب آبیاری در سطح مزرعه باشد و لذا ممکن است لازم باشد از بعد فنی، روابط دیگری نیز در نظر گرفته شود که نیاز به زمینه‌های تخصصی دیگر داشته باشد که از آنها غفلت شده است.

به نظرمی‌رسد تحلیل بالا اگر براساس سطح زیرکشت موجود محصولات در نمونه صورت گیرد، تصویر دقیق‌تری از کارایی آب آبیاری در کل سطح مزرعه و نه تنک تک محصولات به دست دهد. در جدول ۱، مقادیر سطح زیرکشت محصولات و یا به عبارت بهتر، الگوی کشت موجود در مقیاس ۱ هکتار نشان داده شده است. برای تعیین حدود کارایی در مصرف آب آبیاری در سطح کل مزرعه، مقدار آب مصرفی موجود در هکتار و متوسط آب آبیاری مورد نیاز در سطح کارایی ۳۵ درصد ضرب در سطح زیرکشت محصولات شد که نتایج در جدول ۱ ملاحظه می‌شود. سپس کل آب مصرفی در ۱ هکتار با توجه به الگوی کشت برای مدل و مقدار موجود، محاسبه شد که به ترتیب ۱۳۳۵۴ و ۱۱۷۹۷ متر مکعب در هکتار به دست آمد. ملاحظه می‌شود که مقدار آب مصرفی الگوی کشت موجود ۱۱ درصد از مدل کمتر

اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره ۵۶

است. با توجه به این امر می‌توان نتیجه گرفت که کارایی مصرف آب در سطح مزرعه قطعاً از ۳۵ درصد بیشتر است. بی‌گمان همین تحلیل رامی‌توان برای سایر سطوح کارایی درنظر گرفته شده در مدل انجام داد و به این ترتیب حدود کارایی مصرف آب در سطح مزرعه را به دست آورد.

جدول ۱. مقدار آب مصرفی و عملکرد در نمونه و کم آبیاری در سطح ۳۵ درصد مدل

(مترا مکعب و کیلو گرم / هکتار)

گندم	جو	چغندر قند	گوجه فرنگی	پیاز	سیب زمینی	شرح
۷۰۲۷/۶	۶۰۳۹/۸	۲۰۱۸۵/۳	۱۸۰۹۷/۴	۱۵۱۷۸/۷	۱۹۳۶۸/۰	متوسط آب آبیاری
۸۶۱۵/۳	۷۲۰۰/۷	۲۵۴۷۷/۰	۲۲۳۷۱/۹	۱۹۰۳۱/۱	۲۵۶۰۱/۴	حداکثر آب آبیاری
۵۳۱۱/۰	۴۷۰۸/۹	۱۷۰۱۸/۲	۱۳۴۹۷/۳	۱۱۶۴۷/۷	۱۴۳۵۱/۹	حداقل آب آبیاری
۱/۶۲۲	۱/۵۲۹	۱/۴۹۷	۱/۶۵۸	۱/۶۲۴	۱/۷۸۴	نسبت حداکثر به حداقل
۴۰۶۲/۹	۳۰۵۱/۷	۳۴۹۳۸/۷	۲۷۷۴۵/۹	۴۲۳۸۷/۷	۲۹۷۰۱/۷	متوسط عملکرد واقعی
۵۰۴/۸	۳۹۶۷/۷	۵۰۰۵۴/۲	۴۳۷۸۸/۳	۵۹۲۶۲/۱	۴۱۲۹۴/۸	حداکثر عملکرد واقعی
۲۹۲۳/۲	۲۲۲۵/۱	۲۵۳۴۴/۴	۱۳۰۹۲/۶	۳۱۵۲۷/۶	۲۱۲۸۸/۱۶	حداقل عملکرد واقعی
۰/۸۸۰	۰/۹۴۵	۰/۸۹۸	۰/۷۰۸	۰/۸۶۲	۰/۹۰۱	حداکثر نسبت عملکرد واقعی به بالقوه
۰/۰۱۱	۰/۰۵۰	۰/۴۵۵	۰/۲۱۲	۰/۴۵۹	۰/۴۶۴	حداقل نسبت عملکرد واقعی به بالقوه
۷۷۴۰/۴۲	۵۸۶۱/۱۱	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	مقدار آب مصرفی موجود
۱۰/۱۴	-۲/۹۶	-۲۳/۵۴	-۱۰/۸۶	۱۶/۳۹	-۱۶/۸۰	درصد تغییر نسبت به میانگین کم آثاری ها
۳۹۶۴/۵۴	۳۰۸۹/۲۹	۳۳۱۴۵/۳۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۴۲۳۷۷/۸۸	۲۶۵۳۴/۵۵	عملکرد موجود در نمونه
-۲/۵	۱/۲	-۵/۴	۳۸/۳	-۲/۴	-۱۱/۹	درصد تغییر عملکرد نسبت به میانگین کم آبیاری ها
متوسط آب آبیاری مدل والگوی کشت موجود						
۱۲	درصد تغییر میانگین آب کم آبیاری ها نسبت به میانگین آب آبیاری موجود			۱۳۳۵۴	مدل	۱۱۷۹۷ موجود
آب مصرفی با توجه به الگوی کشت مزرعه و مصرف آب آبیاری در:						
۹۹۸/۰۲	۱۷۹۴/۶۷	۲۴۳۲/۳۴	۵۸۱۵/۲۷	۴۵/۹۳	۷۱۰/۶۷	وضعیت موجود
۹۰۶/۵۶	۱۸۴۹/۲۸	۳۱۸۱/۲۰	۶۵۲۴/۱۱	۳۹/۴۶	۸۵۴/۱۳	مدل

مأخذ: یافته های تحقیق

نتایج مدل در سطح کارایی ۴۵ و ۳۵ درصد در حالت نبود ریسک و سطوح ریسک ۸۰، ۸۵، ۸۷/۵، ۹۰ و ۹۵ درصد در مقدار دستری به آب آبیاری نیز به دست آمد که به دلیل طولانی شدن مقاله فقط به ارائه نتایج سطح کارایی ۴۵ درصد بسنده می شود.

تعیین راهبردهای مناسب ...

نتایج جدول ۲ براساس حذف چندرقند (محصولی که براساس کارتحلیقاتی سلطانی و همکاران فاقد مزیت نسبی بود) و جایگزینی محصولاتی می‌باشد که تقریباً همزمان با این محصول کشت می‌شوند. لذا، سطح زیرکشت چندرقند در جواب بهینه صفر است. با این حال، مدل برای حالتی که چندرقند به عنوان یک فعالیت با سود اجتماعی منفی لحاظ شد، حل گردید که نتایج آن درادامه بررسی می‌شود.

الگوی بهینه کشت درسطح کارایی ۴۵ درصد و نبود ریسک درمدل

درجول ۲ الگوی بهینه کشت درسطح کارایی ۴۵ درصد و حالت بدون ریسک درمقدار آب آبیاری در دسترس نشان داده شده است. با توجه به این جدول ملاحظه می‌شود که در الگوی بهینه کشت گندم وارد نشده است. سطح کم آبیاری برای جو، سیب زمینی و پیاز به ترتیب شماره ۱۷، ۱۹ و ۶ است. گوجه فرنگی با دو سطح کم آبیاری شماره ۲۵ و ۲۰ در جواب بهینه آمده است. سطح زیرکشت در الگوی بهینه نسبت به الگوی کشت موجود برای جو ۶۰ درصد کاهش، برای گوجه فرنگی با شماره کم آبیاری بیست و پنج ۱/۲ درصد افزایش، برای گوجه فرنگی با شماره کم آبیاری بیست ۵/۷ درصد کاهش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۳۵۸ و ۶۰۵۳/۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به جدول ملاحظه می‌شود که بیشترین تنش برای جود مرحله ۵، گوجه فرنگی با سطح کم آبیاری ۲۵ در مرحله ۱، گوجه فرنگی با سطح کم آبیاری ۲۰ در مرحله ۱، سیب زمینی در مرحله ۲ و پیاز مرحله ۵ رشد گیاه اتفاق افتاده است. مقایسه سطح کم آبیاری گوجه فرنگی ۲۵ و ۲۰ نشان می‌دهد که مقدار تنش برای گوجه فرنگی ۲۰ در مراحل ۱، ۲ و ۵ بیشتر از گوجه فرنگی ۲۵ است. عملکرد واقعی برای جو ۳۹۶۷، گوجه فرنگی بیست و پنج ۴۳۷۵۸، گوجه فرنگی بیست ۳۹۳۴۱، سیب زمینی ۳۰۱۸۸ و پیاز ۵۹۲۶۲ کیلو گرم در هکتار است که نسبت به عملکرد موجود، برای جو ۲۸ درصد افزایش، گوجه فرنگی ۲/۷۴ و ۱۲/۵۵ درصد کاهش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۱۳ و ۴۰ درصد افزایش داشته است. جدول ۲ مقدار آب آبیاری مورد نیاز و مقدار موجود را نشان می‌دهد. با توجه به جدول ۲ ملاحظه می‌شود که درصد تغییر نسبت به آب مصرفی موجود برای جو ۴/۴۵ درصد کاهش، گوجه فرنگی ۲۵ و ۲۰ به ترتیب ۷/۸۷ درصد افزایش و

۵/۶۹ درصد کاهش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب حدود ۱۷ و ۱۹ درصد کاهش داشته است. مقایسه سودخالص اجتماعی در هکتار هر فعالیت در الگوی کشت موجود و بهینه نشان می دهد که در الگوی بهینه کشت برای جو ۴۸ درصد کاهش، گوجه فرنگی ۲۵ درصد کاهش، گوجه فرنگی ۲۰ ۱۳۴ درصد افزایش و برای سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۶۸۶ و ۱۰۷۵۸ درصد افزایش مشاهده می شود. توجیه اینکه گوجه فرنگی در دو سطح کم آبیاری در جواب بهینه در سطح کارایی ۴۵ درصد آمده است مشکل می باشد. آیا کم آبیاری تابع قانون بازده نزولی است؟ در قسمت نتیجه گیری این مبحث سعی شده است پاسخی برای این یافته که برای محصولات دیگر نیز تکرار شده، بیان شود. سودخالص اجتماعی در هکتار در سطح کارایی ۴۵ درصد نیز نسبت به سطح موجود افزایش و از مقدار ۲۵۷۲۰۰ به ۶۶۴۹۹۰ تومان در هکتار رسیده که در صد تغییر آن نسبت به سودخالص اجتماعی موجود ۱۵۸ درصد است. بازده خالص هر متر مکعب آب آبیاری نیز نسبت به وضع موجود افزایش و از ۲۱/۸ به ۴۶/۴۴ تومان در متر مکعب رسیده است. مقدار آب مورد نیاز در الگوی بهینه کشت در مقایسه با الگوی کشت موجود از مقدار ۱۱۷۹۷ به ۱۴۳۱۸ متر مکعب در هکتار رسیده که حدود ۲۱ درصد افزایش در مصرف آب آبیاری را نشان می دهد. دقت شود که برای هر فعالیت به جز گوجه فرنگی ۲۵، مقدار آب مورد نیاز کاهش یافته است. لذا، می توان گفت کاهش مصرف آب در یک فعالیت الزاماً به معنی کاهش آب در الگوی کشت نیست و اصولاً هدف از به کار گیری مدل های برنامه ریزی ریاضی کاربرد نهاده ها در بهترین وضعیت سود دهی آنهاست نه تعیین الگوی بهینه کشت با مقدار کمتر مصرف نهاده ها. گفتنی است که مقدار آب در دسترس بر اساس بازده ۳۵ درصد (و مقدار موردنیاز بر اساس ۴۵ درصد) محاسبه شده و همان طور که گفته شد از مقدار مصرف در الگوی کشت موجود بیشتر و مبین آن است که بازده آبیاری در سطح مزرعه قطعاً از ۳۵ درصد بیشتر می باشد.

با لحاظ کردن نبود حتمیت در مقدار آب آبیاری قابل دسترس، مدل به واقعیت های موجود در سطح مزرعه نزدیکتر می شود ولذا، انتظار آن است که مقدار آب آبیاری مورد نیاز هیچ الگوی بهینه کشتی بیشتر از مقدار جاری در هکتار نباشد.

تعیین راهبردهای مناسب ...

جدول ۲

الگوی بهینه کشت درسطح کارایی ۴۵ درصد و وجود ریسک درمدل

نتایج مدل سطح حوضه در بازده ۴۵ درصد آب آبیاری درسطح مزرعه و درسطح ریسک تحت بررسی در جدول ۳ نشان داده شده است. درسطح ریسک ۹۵ درصد و کارایی ۴۵ درصد، مدل قادر جواب است. درسطح ریسک ۹۰ درصد و پایین تر، مدل جواب بهینه دارد. با توجه به جدول ۳ ملاحظه می شود که درسطح ریسک ۹۰ درصد پیازبا دو سطح کم آبیاری در جواب بهینه آمده است. نسبت به الگوی کشت موجود، الگوی بهینه سطح زیر کشت گندم تغییری نداشته، جو و گوجه فرنگی به ترتیب ۰/۱ و ۴۴ درصد کاهش و سیب زمینی و پیاز ۱۱ و ۲۴ به ترتیب ۳۵۸ و ۵۸۲۳/۱ و ۱۳۰/۸ درصد افزایش یافته اند. در جواب بهینه، گندم با سطح کم آبیاری ۲۳، جو ۱۲، گوجه فرنگی ۸، سیب زمینی ۲۷ و پیاز ۱۱ و ۲۴ وارد شده اند. نسبت عملکرد واقعی به بالقوه در گندم ۰/۵۲۹۰، جو ۰/۵۵۳۰، گوجه فرنگی ۰/۵۷۶۰، سیب زمینی ۰/۴۶۴۰، پیاز ۱۱ ۰/۷۴۶۰ و پیاز ۲۴ ۰/۴۵۹۰ است. درصد تغییر نسبت به عملکرد موجود، فقط در پیاز ۱۱ افزایش ۲۱ درصدی داشته و در سایر محصولات کاهش یافته است. مقدار سودخالص اجتماعی در هکتار در الگوی بهینه کشت ۴۰۲۶۲۸ تومان است که ۱/۵۶ برابر الگوی کشت موجود است. مقدار آب آبیاری مورد نیاز در الگوی بهینه کشت ۸۷۳۷ متر مکعب در هکتار است که ۷۴ درصد مقدار الگوی کشت موجود می باشد. بازده هر متر مکعب آب آبیاری در الگوی بهینه کشت افزایش یافته به طوری که حدود ۲/۱ برابر الگوی کشت موجود است.

با توجه به جدول ۳ ملاحظه می شود که درسطح ریسک ۸۷/۵ درصد، وضعیت محصولات الگوی بهینه کشت با سطح ۹۰ درصد فرقی نکرده و پیاز فقط با یک سطح کم آبیاری در جواب بهینه ظاهر شده و مقدار سطح زیر کشت سیب زمینی کاهش و گوجه فرنگی افزایش یافته است. افزون بر آن، سطح کم آبیاری برای گندم، جو و گوجه فرنگی تغییر نکرده اما سیب زمینی از سطح کم آبیاری ۲۷ به ۲۴ و پیاز از ۱۱ و ۲۴ به ۷ تغییر کرده است. بدینهی است که این تغییرات سودخالص اجتماعی و مقدار آب مورد نیاز را

تعیین راهبردهای مناسب ...

تغییرمی دهند. در مقایسه با الگوی کشت موجود، سطح زیرکشت گندم تغییری نکرده و سطح زیر کشت محصولات جو و گوجه فرنگی به ترتیب ۰/۱ و ۶ درصد کاهش و سیب زمینی و پیازبه ترتیب ۴۷ و ۶۰/۵۳ درصد افزایش یافته است. کمترین مقدار نسبت عملکرد واقعی به بالقوه در گندم با مقدار ۰/۵۲۹۰ مشاهده می شود. سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی بهینه کشت ۴۶۴۰/۲۴ تومان است که درصد تغییر آن نسبت به الگوی کشت موجود ۸۰/۴۱ درصد افزایش نشان می دهد. مقدار آب مورد نیاز الگوی بهینه کشت ۹۲۹۱ مترمکعب در هکتار است که حدود ۷۸ درصد الگوی کشت موجود می باشد. بازده هر مترمکعب آب آبیاری در الگوی بهینه کشت ۴۹/۹۴ تومان است که درصد تغییر آن نسبت به بازده الگوی کشت موجود، مثبت و ۱۲۹ درصد می باشد. در واقع بازده هر مترمکعب آب آبیاری ۲/۲۹ برابر شده است.

در جدول ۳ نتایج در سطح ۸۵ درصد ریسک نیز مشاهده می شود. این جدول نشان می دهد که سیب زمینی از الگوی بهینه کشت حذف شده و جو با دو سطح کم آبیاری در جواب بهینه حضور یافته است. در این سطح از ریسک، گندم با سطح کم آبیاری ۲۰، جو ۲۱ و ۳۴، گوجه فرنگی ۸ و پیاز ۶ در الگوی بهینه کشت مشاهده می شوند. نسبت به الگوی کشت موجود، در الگوی بهینه کشت سطح زیر کشت گندم تغییری نکرده، جو ۲۱ به میزان ۱۷، جو ۳۴ به مقدار ۸۲/۷ و سیب زمینی ۱۰۰ درصد کاهش و گوجه فرنگی و پیاز به ترتیب ۱۲/۱ و ۶۰/۵۳ درصد افزایش داشته است. سطح زیر کشت جو در مجموع، ۰/۲۴ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین تنش در هر دو سطح کم آبیاری ۲۱ و ۳۴ جو در مرحله ۴ رشد گیا به ترتیب برابر ۰/۵۱۰۷ و ۰/۵۴۶۳ می باشد. مقدار سودخالص اجتماعی هر هکتار الگوی بهینه کشت ۵۰/۲۹۳۰ تومان است که ۱/۹۵ برابر الگوی کشت موجود می باشد. مقدار آب مورد نیاز الگوی بهینه کشت ۹۷۷۵ مترمکعب در هکتار می باشد که ۸۲ درصد مصرف آب در الگوی کشت موجود است. بازده هر مترمکعب آب آبیاری در این سطح از ریسک ۵۱/۴۵ تومان است که ۲/۳۶ برابر الگوی کشت موجود می باشد.

در جدول ۳ همچنین الگوی بهینه کشت در سطح ۸۰ درصد ریسک نشان داده شده است. در این سطح از ریسک، گندم با سطح کم آبیاری ۱۴، جو ۱۷ و ۲۰، گوجه فرنگی ۱۹ و پیاز ۶ مشاهده می شوند. مقدار سطح زیرکشت سیب زمینی در الگوی بهینه صفر است. در الگوی بهینه کشت نسبت به الگوی کشت موجود، سطح زیرکشت گندم تغییری نکرده، جو ۱۷ و ۲۰ به ترتیب ۴۷ و ۵۲ درصد کاهش و گوجه فرنگی و پیاز ۱۲/۱ و ۶۰/۵۳ درصد به ترتیب افزایش داشته‌اند. سطح زیرکشت جو در مجموع تغییری نکرده است. مقدار بیشترین تنفس در جو با تغییر مقدار ریسک تغییر کرده به طوری که در جو ۱۷ در مرحله ۵ و در جو ۲۰ در مرحله ۴ رشد گیاه اتفاق افتاده است؛ در حالی که در سطح ریسک ۸۵ درصد، بیشترین تنفس برای هردو سطح کم آبیاری در مرحله ۴ مشاهده شد. مقدار سود خالص اجتماعی هر هکتار الگوی بهینه کشت ۵۴۸۰/۹ تومان است که ۴۸ مشاهده شد. مقدار آب مورد نیاز الگوی بهینه کشت ۱۰۶۰/۳ متر مکعب در صد الگوی کشت موجود می‌باشد. مقدار آب در الگوی کشت موجود می‌باشد. بازده هر متر مکعب آب در هکتار است که ۸۹ درصد مصرف آب در الگوی کشت موجود می‌باشد. بازده هر متر مکعب آب آبیاری ۵۱/۷ تومان به دست آمد که نسبت به مقدار مشابه در الگوی کشت موجود ۲/۳۷ برابر افزایش نشان می‌دهد.

جدول ۳. الگوی بهینه کشت در سطح ۴۵ درصد کارایی مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و سطوح

مختلف ریسک								شرح
در سطح %۹۰								
محصول								
پیاز	پیاز	سیب زمینی	سیب زمینی	چغندر قند	گوجه فرنگی	جو	گندم	
۰/۰۰۶	۰/۱۵۴	۰/۲۰۲	۰/۲۰۲	.	۰/۲۰۳	۰/۳۰۶	۰/۱۲۹	سطح زیرکشت مدل (هکتار)
۰/۰۰۲۶	۰/۰۰۲۶	۰/۰۴۴۱	۰/۰۴۴۱	۰/۱۵۷۶	۰/۳۶۰۵	۰/۳۰۶۲	۰/۱۲۹۰	سطح زیرکشت موجود (هکتار)
۱۳۰/۸	۵۸۲۲۳/۱	۳۵۸/۰	۳۵۸/۰	-۱۰۰/۰	-۴۳/۷	-۰/۱	۰/۰	در صد تغییر نسبت به الگوی کشت موجود
۲۴	۱۱	۲۷	۲۷		۸	۱۲	۲۳	شماره سطح کم آبیاری
۰/۶۹۸۹	۰/۶۷۸۴	۰/۵۸۴۶	۰/۵۸۴۶		۰/۵۵۴۹	۰/۹۳۷۵	۰/۵۳۷۷	تنفس در مرحله ۱ رشد گیاه
۰/۷۲۷۶	۰/۸۷۱۱	۰/۵۲۸۱	۰/۵۲۸۱		۰/۵۶۹۴	۰/۶۴۶۴	۰/۷۴۴۱	تنفس در مرحله ۲ رشد گیاه
					۰/۷۷۵۳	۰/۶۱۹۰	۰/۵۷۵۴	تنفس در مرحله ۳ رشد گیاه
۰/۵۱۸۷	۰/۹۱۵۹	۰/۵۴۵۵	۰/۵۴۵۵		۰/۹۴۴۹	۰/۵۴۹۷	۰/۵۰۶۷	تنفس در مرحله ۴ رشد گیاه

تعیین راهبردهای مناسب ...

۰/۵۸۹	۰/۵۰۴۷	۰/۱۸۳۴۸		۰/۹۲۸۷	۰/۰۵۷۷	۰/۷۱۶۸	۵ تنش در مرحله رشد گیاه
۰/۴۵۹۰	۰/۷۴۶۰	۰/۴۶۴۰		۰/۰۵۷۶۰	۰/۰۵۰۳۰	۰/۰۵۲۹۰	نیست عملکرد واقعی به بالقوه
۳۱۰۵۷/۶	۵۱۲۵۱/۳	۲۱۲۸۸/۶		۳۵۶۳۱/۸	۲۲۲۱/۶	۳۰۲۷/۰	عملکرد واقعی (کیلو گرم هکتار)
۹۰۰۵۹/۳۴	۱۲۶۴۸/۹۱	۱۱۱۶۲/۵۹		۱۳۹۲۳/۰۵	۲۶۶۲/۴۳	۴۱۳۳/۵۱	آب مورد نیاز در سطح کم آبی و گزاری مورد نظر (ترمکعب/هکتار)
۴۲۲۷۱/۸۸	۴۲۲۷۲/۸۸	۲۶۵۳۴/۵۵	۲۳۱۴۵/۲۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۳۰۸۹/۲۹	۳۹۶۴/۵۴	عملکرد موجود (کیلو گرم هکتار)
۱۷۶۶۶/۰۰	۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۷۷۴۰/۴۳	آب مصرفی در الگوی موجود (مترباع/ هکتار)
۷۸۹۸۱۳/۲۹	۷۸۹۸۹۳/۲۹	۲۵۸۹۶۲/۹	-۵۶۰۱۷۰/۱۹	۷۷۶۷۴۷/۴۴	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۲۱۴۲۶/۹۳	سودخالص اجتماعی (تومان/هکتار)
-۲۵۰۵۹	۲۰/۹۵	-۱۹/۷۷		-۲۰/۸۰	-۲۴/۸۵	-۲۲/۶۵	درصد تغیر نسبت به عملکرد موجود
-۴۸۰۷۲	-۲۸/۴۰	-۳۰/۷۳	-۱۰۰/۰۰	-۱۳/۸۹	-۳۷/۵۱	-۴۶/۶۰	درصد تغیر نسبت به آب مصرفی موجود
۲۰/۸۲	۲۰/۸۲	۵۱/۸۳	۱۹/۳۴	۱۴/۷۳	۷۹/۰۳	۸۰/۸۶	هزینه اجتماعی تولید پیدون هزینه اجتماعی آب در ربع نهضه ۶ درصد (تومان/ کیلو گرم)
۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۳	۳۰/۷۲	قیمت اجتماعی آب در ربع نهضه ۶ درصد (تومان/ مترباع)
۵۱/۹۲	۵۱/۹۲	۷۹/۷۹	۱۴/۳۲	۴۱/۵۹	۱۸۱/۴۹	۱۶۲/۸۳	قیمت اجتماعی محصول (تومان/ کیلو گرم)
۲۰۰۵۳/۷۲	۲۰۰۵۳/۷۲	۱۱۴۲۰/۲۶	-۸۸۲۸۲/۸۲	۲۶۱۹۹۲/۴۵	۵۴۲۵۲/۸۶	۱۵۶۶۴/۰۷	سودخالص اجتماعی جاری هر فعالیت
۲۵۷۲۰/۰۵۶							سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود
۴۲۱۳/۲۳	۱۸۵۶۲۲/۵۶	۵۰۰۹۶۷/۳۳	۰/۰۰	۱۰۷۴۵۹/۰۰	۳۸۱۴۸/۷۲	۱۶۰۱۷/۴۶	سودخالص اجتماعی هر فعالیت در مدل
۴۰۰۶۴۸/۰۳۰							سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل
۱۰۵	۸۹۳۸	۳۴۶	۱۰۰	-۵۹	-۲۹	۲	درصد تغیر سودخالص اجتماعی هر فعالیت نسبت به وضع موجود
۵۶۰۵۴							درصد تغیر سودخالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود
۵۶۰۴	۱۹۴۷/۹	۲۲۵۴/۸	۰/۰	۲۸۲۶/۴	۱۱۲۰/۷	۵۳۳/۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت مدل
۴۵۰۹۳		۷۱۰/۶۷	۲۴۳۲۲/۳۴	۵۸۱۵/۲۷	۱۷۹۴/۶۷	۹۹۸/۰۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت موجود

در سطح ۰.۸۷/۵

محصول							شرح
پیاز	سیب زمینی	چند رقد	گوجه فرنگی	جو	گندم		
۰/۰۶	۰/۰۶۵	۰	۰/۳۳۹	۰/۰۳۰۶	۰/۱۲۹		سطح زیر کشت مدل (هکتار)
۰/۰۲۶	۰/۰۴۴۱	۰/۱۵۷۶	۰/۰۳۶۰۵	۰/۰۳۰۶۲	۰/۱۲۹۰		سطح زیر کشت موجود (هکتار)
۶۰۰۵۳/۸	۴۷/۴	-۱۰۰/۰	-۶/۰	-۰/۱	۰/۰		درصد تغیر نسبت به الگوی کشت موجود
۱	۲۴		۸	۱۲	۲۳		شماره سطح کم آبیاری

اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره ۵۶

نشانی در مرحله (رشد گیاه)	نشانی در مرحله ۲ رشد گیاه	نشانی در مرحله ۳ رشد گیاه	نشانی در مرحله ۴ رشد گیاه	نشانی در مرحله ۵ رشد گیاه	سبت عملکرد واقعی به بالقوه	عملکرد واقعی (کیلو گرم هکتار)	آب مورد نیاز در سطح کم آبی و کارایی موجود نظر امن معنی (هکتار)	عملکرد موجود (کیلو گرم هکتار)	آب مصرفی در الگوی وجود (مترا مکعب هکتار)	سودخالص اجتماعی (تومان هکتار)	درصد تغییر سبیت به عملکرد موجود	درصد تغییر سبیت به آب مصرفی موجود	هزینه اجتماعی تولید بدون هزینه اجتماعی آب در نرخ بهره ۶ در صد (تومان / کیلو گرم)	قیمت اجتماعی آب در نرخ بهره عرضه (تومان / مترا مکعب)	قیمت اجتماعی محصول (تومان کیلو گرم)	سودخالص اجتماعی جاری هر فعالیت	سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود	سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل	در صد تغییر سودخالص اجتماعی هر فعالیت سبت به وضع موجود	در صد تغییر سودخالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود	کل آب مصرفی در هر فعالیت مدل	کل آب مصرفی در هر فعالیت موجود	در سطح ۱۸۵	محصول	شرح
۰/۷۲۰۰	۰/۷۶۳		۰/۵۵۴۹	۰/۹۳۷۵	۰/۵۳۷۷	نشانی در مرحله (رشد گیاه)																			
۰/۹۸۶۳	۰/۵۲۶۹		۰/۵۶۹۴	۰/۶۴۶۴	۰/۷۴۴۱	نشانی در مرحله ۲ رشد گیاه																			
			۰/۷۷۵۳	۰/۶۱۹۰	۰/۵۷۵۴	نشانی در مرحله ۳ رشد گیاه																			
۰/۸۵۷۱	۰/۷۶۵۱		۰/۹۴۴۹	۰/۵۴۹۷	۰/۵۰۶۷	نشانی در مرحله ۴ رشد گیاه																			
۰/۹۷۸۰	۰/۹۵۵۱		۰/۹۲۸۷	۰/۵۷۷۷	۰/۷۱۶۸	نشانی در مرحله ۵ رشد گیاه																			
۰/۷۹۳۰	۰/۵۸۴۰		۰/۵۷۶۰	۰/۵۵۳۰	۰/۵۲۹۰	سبت عملکرد واقعی به بالقوه																			
۵۴۵۰۲۸	۲۶۷۵۸/۸		۳۵۶۳۱/۸	۲۲۲۱/۶	۳۰۲۷/۰	عملکرد واقعی (کیلو گرم هکتار)																			
۱۲۲۸۳/۱۱	۱۲۱۸۸/۵۱		۱۳۹۲۳/۰۵	۳۶۶۲/۴۳	۴۱۳۳/۵۱	آب مورد نیاز در سطح کم آبی و کارایی موجود نظر امن معنی (هکتار)																			
۴۳۳۷۲/۸۸	۲۶۵۳۴/۵۵	۳۳۱۴۵/۳۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۳۰۸۹/۲۹	۳۹۶۴/۵۴	عملکرد موجود (کیلو گرم هکتار)																			
۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۷۷۴۰/۴۳	آب مصرفی در الگوی وجود (مترا مکعب هکتار)																			
۷۸۹۸۹۳/۲۹	۲۵۸۹۶۲/۹	-۵۶۰۱۷۰/۱۹	۷۲۶۷۴۷/۴۴	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۲۱۴۲۶/۹۳	سودخالص اجتماعی (تومان هکتار)																			
۲۸/۶۳	۰/۸۴		-۲۰/۸۰	-۲۴/۸۵	-۲۳/۶۵	در صد تغییر سبیت به عملکرد موجود																			
-۲۴/۸۱	-۲۴/۲۶	-۱۰۰/۰۰	-۱۳/۶۹	-۳۷/۵۱	-۴۶/۶۰	در صد تغییر سبیت به آب مصرفی موجود																			
۲۰/۸۲	۵۱/۸۳	۱۹/۳۴	۱۴/۷۳	۷۹/۰۳	۸۰/۸۶	هزینه اجتماعی تولید بدون هزینه اجتماعی آب در نرخ بهره ۶ در صد (تومان / کیلو گرم)																			
۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۳	۳۰/۷۲	قیمت اجتماعی آب در نرخ بهره عرضه (تومان / مترا مکعب)																			
۵۱/۹۲	۷۹/۷۹	۱۴/۳۲	۴۱/۵۹	۱۸۱/۴۹	۱۶۳/۸۳	قیمت اجتماعی محصول (تومان کیلو گرم)																			
۲۰۰۵۳/۷۷	۱۱۴۲۰/۲۶	-۸۸۲۸۲/۸۲	۲۶۱۹۹۲/۴۵	۵۴۳۵۲/۸۶	۱۵۶۶۴/۰۷	سودخالص اجتماعی جاری هر فعالیت																			
۲۵۷۲۰/۰۵۶						سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود																			
۲۰۰۹۱۶/۷۷	۲۴۲۸۹/۸۴	۰/۰۰		۱۷۹۴۵۱/۲۳	۳۸۲۴۸/۷۲	سودخالص اجتماعی هر فعالیت در مدل																			
۴۶۴۰۲۴/۰۲						سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل																			
۹۹۲۷	۱۱۳	۱۰۰		-۳۲	-۲۹	۲	در صد تغییر سودخالص اجتماعی هر فعالیت سبت به وضع موجود																		
۸۰/۴۱							در صد تغییر سودخالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود																		
۲۱۲۵/۳	۷۹۲/۳	۰/۰		۴۷۱۹/۹	۱۱۲۰/۷	۵۳۳/۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت مدل																		
۴۵/۹۳	۷۱۰/۶۷	۲۴۳۲۲/۳۴		۵۸۱۵/۲۷	۱۷۹۴/۶۷	۹۹۸/۵۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت موجود																		
در سطح ۱۸۵																									
محصول										شرح															
پیاز	سبزه زمینی	چغندر قند	گوجه فرنگی	جو	جو	گندم																			
۰/۱۶	*	*	۰/۴۰۴	۰/۰۵۳	۰/۲۵۴	۰/۱۲۹	سطح زیر کشت مدل (هکتار)																		
۰/۰۰۲۶	۰/۰۴۴۱	۰/۱۵۷۶	۰/۳۶۰۵	۰/۳۰۶۲	۰/۳۰۶۲	۰/۱۲۹۰	سطح زیر کشت موجود (هکتار)																		
۶۰۵۳/۸	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	۱۲/۱	-۸۲/۷	-۱۷/۰	۰/۰	در صد تغییر سبیت به الگوی کشت موجود																		

تعیین راهبردهای مناسب ...

شماره سطح کم آبیاری	نتش در مرحله ۱ رشد گیاه	نتش در مرحله ۲ رشد گیاه	نتش در مرحله ۳ رشد گیاه	نتش در مرحله ۴ رشد گیاه	نتش در مرحله ۵ رشد گیاه	سیست عملکرد واقعی به بالقوه	عملکرد واقعی (کیلو گرم هکتار)	آب مورد نیاز در سطح کم آبی فکار یخ موردنظر (متر مکعب / هکتار)
۰/۹۱۸۳				۰/۵۵۴۹	۰/۹۹۲۳	۰/۹۰۳۳	۰/۵۵۰۱	
۰/۸۵۳۰				۰/۵۶۹۴	۰/۷۱۷۵	۰/۵۴۰۱	۰/۹۷۳۰	
				۰/۷۷۵۳	۰/۹۳۵۲	۰/۷۵۵۹	۰/۸۴۶۱	
۰/۹۸۳۳				۰/۹۴۴۹	۰/۵۴۶۳	۰/۵۱۰۷	۰/۵۲۷۱	
۰/۷۸۸۵				۰/۹۲۸۷	۰/۶۵۹۲	۰/۸۸۲۸	۰/۶۳۷	
۰/۸۴۲۰				۰/۵۷۶۰	۰/۶۹۹۰	۰/۵۸۴۰	۰/۶۸۴۰	
۵۹۲۶۲/۱			۳۵۶۲۱/۸	۲۹۳۴/۴	۲۴۵۳/۵	۳۹۱۴/۲		
۱۴۶۷۵/۶۶			۱۳۹۲۳/۰۵	۴۲۶۵/۶۶	۳۷۹۱/۷۷	۴۸۱۱/۳۷		
۴۲۲۷۲/۸۸	۲۶۵۳۴/۵۵	۳۳۱۴۵/۳۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۳۰۸۹/۲۹	۳۰۸۹/۲۹	۳۹۶۴/۵۴	عملکرد موجود (کیلو گرم هکتار)	
۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۷۷۴۰/۴۳	آب مصرفی در الگوی موجود (متر مکعب / هکتار)	
۷۸۹۸۹۳/۲۹	۲۵۸۹۶۲/۹	-۵۶۰۱۷۰/۱۹	۷۲۶۷۴۷/۴۴	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۲۱۴۲۶/۹۳	سود خالص اجتماعی (تومان / هکتار)	
۳۹۱۸۶	-۱۰۰/۰۰		-۲۰/۱۰	-۵/۰۱	-۲۰/۵۸	-۱/۱۷	در صد تغیر نسبت به عملکرد موجود	
-۱۷۷۲۱	-۱۰۰/۰۰	-۱۰۰/۰۰	-۱۳/۶۹	-۲۷/۲۲	-۳۵/۳۱	-۳۷/۸۴	در صد تغیر نسبت به آب مصرفی موجود	
۲۰۱۸۲	۵۱/۸۳	۱۹/۳۴	۱۴/۷۳	۷۹/۰۳	۷۹/۰۳	۸۰/۸۶	هزینه اجتماعی تولید بدون هزینه اجتماعی آب در نیزه بهره ۶ در صد (تومان / کیلو گرم)	
۳۰۱۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۳	۳۰/۷۳	۳۰/۷۲	قیمت اجتماعی آب در نیزه بهره ۶ در صد (تومان / متر مکعب)	
۵۱۱۹۲	۷۹/۷۹	۱۴/۳۲	۴۱/۵۹	۱۸۱/۴۹	۱۸۱/۴۹	۱۶۳/۸۳	قیمت اجتماعی محصول (تومان / کیلو گرم)	
۲۰۰۵۷/۷۲	۱۱۴۲۰/۲۶	-۸۸۲۸۲/۸۲	۲۶۱۹۹۲/۴۵	۵۴۳۵۲/۸۶	۵۴۳۵۲/۸۶	۱۵۶۶۴/۰۷	سود خالص اجتماعی جاری هر تعایل	
۲۵۷۲۰/۰۵۶							سود خالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود	
۲۲۳۰۰/۰۲۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۱۳۸۵۹/۲۹	۸۹۸۷/۳۷	۳۴۲۵۵/۷۷	۲۲۸۲۷/۶۹	سود خالص اجتماعی هر تعایل در مدل	
۵۰۰۲۹۰/۰۳۶							سود خالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل	
۱۰۷۵۸	-۱۰۰	۱۰۰	-۱۸	-۸۳	-۳۷	۴۶	در صد تغیر سود خالص اجتماعی هر تعایل نسبت به وضع موجود	
۹۵۰۵۴							در صد تغیر سود خالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود	
۳۳۴۰/۱	۰/۰	۰/۰	۵۶۲۴/۹	۲۲۶/۱	۹۶۳/۱	۶۲۰/۷	کل آب مصرفی در هر فعالیت مدل	
۴۵۰۹۳	۷۱۰/۸۷	۲۴۳۲/۳۴	۵۸۱۵/۲۷	۱۷۹۴/۶۷	۱۷۹۴/۶۷	۹۹۸/۵۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت موجود	
در سطح٪۱۰								
محصول							شرح	
پیاز	سبز زمینی	سبز زمینی	چغندر قند	گوجه فرنگی	جو	جو	گندم	
۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۴۰۴	۰/۱۴۵	۰/۱۶۲	۰/۱۲۹	سطح زیر کشت مدل (هکتار)

اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره ۵۶

مقدار	نام	توضیحات	مقدار	نام	توضیحات	مقدار	نام	توضیحات
۰/۰۰۲۶	۰/۰۴۴۱	۰/۱۵۷۶	۰/۳۶۰۵	۰/۳۰۶۲	۰/۳۰۶۲	۰/۱۲۹۰	سطح زیر کشت موجود (هکتار)	
۶۰۵۳/۸	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	۱۲/۱	-۵۲/۶	-۴۷/۱	۰/۰	دروصد تغییر نسبت به الگوی کشت موجود	
۶			۱۹	۲۰	۱۷	۱۴	شماره سطح کم آبیاری	
۰/۹۱۸۳			۰/۶۷۱۳	۰/۸۰۹۲	۰/۷۹۹۰	۰/۷۹۱۱	نشش در مرحله ۱ رشد گیاه	
۰/۸۵۳۰			۰/۶۵۶۲	۰/۷۶۷۵	۰/۸۶۷۴	۰/۹۴۶۴	نشش در مرحله ۲ رشد گیاه	
			۰/۹۱۷۱	۰/۹۹۳۲	۰/۹۸۰۹	۰/۹۸۸۹	نشش در مرحله ۳ رشد گیاه	
۰/۹۸۳۳			۰/۸۱۶۶	۰/۵۷۹۱	۰/۹۷۶۱	۰/۵۶۳۶	نشش در مرحله ۴ رشد گیاه	
۰/۷۸۸۵			۰/۸۴۵۸	۰/۷۱۰۸	۰/۵۵۵۳	۰/۷۳۶۱	نشش در مرحله ۵ رشد گیاه	
۰/۸۶۲۰			۰/۶۲۶۰	۰/۷۴۶۰	۰/۹۴۵۰	۰/۷۶۵۰	نسبت عملکرد واقعی به بالقوه	
۰/۹۲۶۲/۱			۳۸۶۸۶/۰	۳۱۳۳/۹	۳۹۶۷/۷	۴۳۷۷/۶	عملکرد واقعی (کیلو گرم/هکتار)	
۱۴۶۲۵/۶۶			۱۴۹۱۹/۵۲	۴۴۸۳/۹۵	۵۶۰۰/۰۵۵	۵۲۵۷/۵۹	آب مورد نیاز در سطح کم آبی و گزارایی مورد نظر (مترا مکعب/هکتار)	
۴۲۳۷۲/۸۸			۳۳۱۴۵/۳۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۳۰۸۹/۲۹	۳۰۸۹/۲۹	عملکرد موجود (کیلو گرم/هکتار)	
۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۷۷۴۰/۴۳	آب مصرفی در الگوی موجود (مترا مکعب/هکتار)	
۷۸۹۸۹۳/۲۹	۲۵۸۹۶۲/۹	-۵۶۰۱۷۰/۱۹	۷۲۶۷۴۷/۴۴	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۷۷۵۰/۷/۷۲	۱۲۱۴۲۶/۹۳	سودخالص اجتماعی (تومان/هکتار)	
۳۹/۸۶			-۱۴/۰۱	۱/۴۴	۲۸/۴۳	۱۰/۴۲	دروصد تغییر نسبت به عملکرد موجود	
-۱۷/۲۱	-۱۰۰/۰۰	-۱۰۰/۰۰	-۷/۵۱	-۲۳/۵۰	-۴/۴۵	-۳۲/۰۸	دروصد تغییر نسبت به آب مصرفی موجود	
۲۰/۸۲	۵۱/۸۳	۱۹/۳۴	۱۴/۷۳	۷۹/۰۳	۷۹/۰۳	۸۰/۸۶	هزینه اجتماعی تولید یدون هزینه اجتماعی آب در نرخ بهره ۶ درصد درصد (تومان/کیلو گرم)	
۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۳	۳۰/۷۳	۳۰/۷۲	قیمت اجتماعی آب در نرخ بهره ۶ درصد (تومان/مترا مکعب)	
۵۱/۹۲	۷۹/۷۹	۱۴/۳۲	۴۱/۵۹	۱۸۱/۴۹	۱۸۱/۴۹	۱۶۳/۸۳	قیمت اجتماعی محصول (تومان/کیلو گرم)	
۲۰۵۳/۷۲	۱۱۴۲۰/۲۶	-۸۸۲۸۲/۸۲	۲۶۱۹۹۲/۴۵	۵۴۳۵۲/۸۶	۵۴۳۵۲/۸۶	۱۵۶۶۴/۰۷	سودخالص اجتماعی جاری هر فعالیت	
۲۵۷۲۰/۰۵۶							سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود	
۲۲۳۰۰/۲۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲۴۶۳۴/۰۶	۲۶۵۷۹/۷۸	۳۷۹۷۷/۱۴	۲۶۰۱۸/۴۴	سودخالص اجتماعی هر فعالیت در مدل	
۵۴۸۲۰/۹۶۵							سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل	
۱۰۷۵۸	-۱۰۰	۱۰۰	-۱۰	-۵۱	-۳۰	۶۶	دروصد تغییر سودخالص اجتماعی هر فعالیت	
۱۱۳/۱۴							نسبت به وضع موجود	
							دروصد تغییر سودخالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود	
۲۳۴۰/۱	۰/۰	۰/۰	۶۰۲۷/۵	۶۵۰/۲	۹۰۷/۳	۶۷۸/۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت مدل	
۴۵/۹۳	۷۱۰/۶۷	۲۴۳۲/۳۴	۵۸۱۵/۲۷	۱۷۹۴/۶۷	۱۷۹۴/۶۷	۹۹۸/۵۲	کل آب مصرفی در هر فعالیت موجود	

مأخذ: یافته‌های تحقیق

ارزیابی الگوهای بهینه کشت درسطح حوضه

مدل سطح حوضه ۱۸ بارحل و منجر به ۱۳ جواب بهینه گردید که بعضی از آنها در اینجا مورد بررسی قرار گرفت. با نگاهی به سطوح کم آبیاری در الگوهای بهینه کشت مشاهده می شود که دامنه تغیرات این سطوح محدود است و آنها در حالت نبود ریسک و ریسک در مدل تکرار شده‌اند. در بعضی از الگوهای بهینه کشت، به جز گندم، سایر محصولات در دو سطح کم آبیاری در الگوی بهینه کشت مشاهده می شوند. برای توجیه این امر به نظر می‌رسد که توضیحی لازم است. سلطانی و همکاران (Soltani & et al., 1992) در بررسی مسائل انتقال توابع تولید به کشورهای در حال توسعه، مشکلات مبتلا به انتقال انواع توابع را بررسی کردند. در بخشی از مقاله درباره تعیین مقدار بهینه آب بحث و کلّاً از دو روش اساسی تخصیص آب در سطح مزرعه صحبت شده است: یکی تعیین مقدار بهینه فصلی آبی که می‌باشد به هر محصول اختصاص یابد و دیگری، تخصیص بهینه آب در طول فصل رشد هر محصول. در روش اول، مقدار بهینه آب آبیاری از برابری ارزش محصول نهایی با هزینه نهایی آب به دست می‌آید. به عبارت دیگر، ارزش نهایی آخرین واحد آبی که مصرف می‌شود باید برابر با هزینه تولید آن واحد آب باشد. اما چون مدتی که آب در اختیار گیاه قرار می‌گیرد در مقدار محصول تولیدی بسیار مؤثر است، باید در تخصیص آب به این مسئله توجه کرد. لذا، برای تعیین تخصیص بهینه آب، به جای یک تابع تولید، برای هر مرحله ارزش گیاه به توابع تولید مختلف نیاز است. با چنین توابع زمانداری، تخصیص بهینه مقدار محدود آب در دسترس زمانی تحقق می‌یابد که ارزش انتظاری محصول نهایی آب در تمام مراحل رشد گیاه با هم برابر شود. با توجه به الگوهای بهینه کشت در مطالعه حاضر، که در حقیقت از توابع تولید زماندار به دست آمده‌اند، به نظر می‌رسد اصل بیان شده برای تخصیص آب در سطح مزرعه کافی نباشد. بدیهی است اگریک محصول در سطح مزرعه کاشته می‌شود، اصل فوق برای تخصیص آب محدود کافی می‌بود. اما اکثر کشاورزان بیش از یک محصول در مزرعه می‌کارند و به همین دلیل تعیین الگوی بهینه کشت در اقتصاد کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع

کشاورزان محصولاتی را در مزرعه می‌کارند که مراحل رشد آنها متفاوت است و این امکان برای آنها هست که براساس باور ذهنی خود نسبت به تأثیر آبیاری در کل سوددهی مزرعه و نه یک محصول، در مراحلی از رشد محصول یا برخی از محصولات آب کمتری مصرف کنند تا آبی که از این طریق برای آنها باقی می‌ماند به محصولی دیگر در مزرعه اختصاص یابد. بدیهی است این مسئله یک تصمیم‌گیری اقتصادی است و زمانی منجر به حداکثر سود مزرعه می‌شود که کاهش درآمد ناشی از آبیاری کمتر با افزایش درآمد حاصل از به کار گیری آب در محصول دیگر، برابر شود. به عبارت دیگر بازده نهایی آب نه تنها در مراحل مختلف رشد گیاه بلکه در مراحل رشد گیاهانی که در مزرعه کاشته می‌شوند و قطعاً مراحل رشد متفاوت با یکدیگر دارند باید برابر شود. برای مثال، زمانی که گندم در مرحله آخر رشد خود قرار دارد، در منطقه چغدره‌ویا گوجه فرنگی کاشته می‌شود. لذا، بازده آب در مرحله جوانه زنی چغدره علاوه بر مراحل مختلف رشد گندم باید برابر با بازده آب در مرحله بلوغ گندم نیز شود تا حداکثر سود تحقق پیدا کند. با توجه به این امر، این امکان وجود دارد که در الگوی بهینه کشت یک محصول، چند سطح متفاوت کم آبیاری دیده شود. نکته دیگری که در همین راستا به ذهن می‌رسد این است که آیا کم آبیاری تابع قانون بازده نزولی می‌باشد؟ روشن است که در هر مرحله از رشد گیاه می‌توان انتظار بازده نزولی را داشت؛ یعنی در هر مرحله از رشد گیاه واحدهای اولیه آب آبیاری بازده بیشتری دارند تا واحدهای بعدی یا در فاصله‌ای در مرحله رشد گیاه این امر تحقق پیدا می‌کند. این گفته با توجه به اینکه در هر مرحله از رشد گیاه تابع تولیدی می‌توان داشت، به نظر صحیح می‌رسد. گفتنی است که در اصل "برابری بازده نهایی با هزینه نهایی" تلویحاً این قانون وجود دارد و می‌توان گفت به دلیل وجود چنین قانونی، برابری بازده نهایی آب در مراحل مختلف رشد یک گیاه و بین مراحل مختلف رشد گیاهان با هزینه نهایی آب معنی پیدا می‌کند.

مرواری بر الگوهای بهینه کشت در سطح حوضه نشان می‌دهد که بیشترین سود خالص اجتماعی در شرایطی به دست می‌آید که کارایی مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه بالاست

تعیین راهبردهای مناسب ...

و در دسترسی به آب آبیاری ریسکی وجود ندارد. هر چقدر کارایی کاهش و مقدار ریسک افزایش یابد، سودخالص اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در شرایطی که سطح کارایی پایین است، سودخالص اجتماعی بیشتر تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرد و اگر منطقه با خشکسالی‌های دوره‌ای مواجه باشد، پایین بودن سطح کارایی موجب تشدید پیامدهای منفی خشکسالی می‌شود. نتایج سطوح کارایی پایین تر و مقدار ریسک بیشتر به واقعیتهای موجود منطقه نزدیکتر است و لذا می‌توان پی به زمینه‌ای که لازم است در آن بیشتر سرمایه گذاری شود برد. همان طور که بیشتر گفته شد، مدل دردوحالت با و بدون چغnderقند به عنوان یک فعالیت حل شد که نتایج بالا مربوط به حالتی است که چغnderقند به دلیل داشتن سودخالص اجتماعی منفی در هکتار، از پیش به گونه‌ای در مدل برنامه‌ریزی شد که سطح زیرکشت آن به یکی از محصولات همدوره با آن انتقال یابد. در ادامه، نتایج حالت وجود چغnder به عنوان یک فعالیت در مدل، مورد بحث قرار گرفته است.

الگوهای بھینه کشت در سطح حوضه با لحاظ کردن چغnderقند

نتایج مدل سطح حوضه با در نظر گرفتن چغnderقند به عنوان یک فعالیت، در جدول ۴ برای سطوح مختلف کارایی مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و شرایط نبود ریسک در مقدار آب آبیاری در دسترس نشان داده شده است.

الگوی بھینه کشت در سطح کارایی ۴۵ درصد و نبود ریسک در مدل

جدول ۴ نتایج سطح کارایی ۴۵ در صدرانشان می‌دهد. با توجه به این جدول ملاحظه می‌شود که سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی بھینه کشت ۲۷۷۱۲ تومان است که نسبت به الگوی کشت موجود ۶ درصد افزایش یافته است. مقدار آب آبیاری مورد نیاز الگوی بھینه کشت ۱۱۸۱۳ مترمکعب می‌باشد که از مقدار مصرف موجود ۰/۱۴ درصد بیشتر است؛ در واقع در هر هکتار، مصرف آب آبیاری ۱۶ مترمکعب بیشتر است. بازده هر مترمکعب آب آبیاری در الگوی بھینه کشت ۲۳/۰۸ تومان است که حدود ۶ درصد بیشتر از مقدار مشابه در الگوی کشت موجود است.

اقتصاد کشاورزی و توسعه - شماره ۵۶

جدول ۴. الگوهای بهینه کشت در سطح کارایی ۴۵ درصد در شرایط نبود ریسک و درنظر گرفتن چند قند به عنوان یک فعالیت

محصول						شرح
پیاز	سبزی	چند قند	گوجه فرنگی	جو	گندم	
۰/۰۰۳	۰/۰۴۴	۰/۱۵۸	۰/۳۶	۰/۳۰۶	۰/۱۲۹	سطح زیرکشت مدل (هکتار)
۰/۰۰۲۶	۰/۰۴۴۱	۰/۱۵۷۶	۰/۳۶۰۵	۰/۳۰۶۲	۰/۱۲۹۰	سطح زیرکشت موجود (هکتار)
۱۵/۴	-۰/۲	۰/۳	-۰/۱	-۰/۱	۰/۰	درصد تغییر نسبت به الگوی کشت موجود
۶	۴	۲۲	۲۵	۱۷	۲۵	شماره سطح کم آبیاری
۰/۹۱۸۳	۰/۶۱۵۱	۰/۵۲۳۴	۰/۶۷۸۶	۰/۷۹۹۰	۰/۶۴۱۹	تشن در مرحله ۱ رشد گیاه
۰/۸۵۳۰	۰/۹۷۷۳	۰/۶۵۹۴	۰/۹۶۷۵	۰/۸۶۷۴	۰/۹۱۰۴	تشن در مرحله ۲ رشد گیاه
			۰/۹۷۲۱	۰/۹۸۰۹	۰/۹۲۸۸	تشن در مرحله ۳ رشد گیاه
۰/۹۸۳۳	۰/۹۶۱۳	۰/۵۸۵۱	۰/۷۱۱۸	۰/۹۷۶۱	۰/۸۸۳۴	تشن در مرحله ۴ رشد گیاه
۰/۷۸۸۵	۰/۷۱۴۶	۰/۵۶۵۳	۰/۹۱۰۶	۰/۵۵۵۳	۰/۸۱۱۶	تشن در مرحله ۵ رشد گیاه
۰/۸۶۲۰	۰/۹۰۱۰	۰/۵۰۱	۰/۷۰۸۰	۰/۹۴۵۰	۰/۸۸۰۰	نسبت عملکرد واقعی به بالقوه
۵۹۲۶۲/۱	۴۱۲۹۴/۸	۲۷۹۳۹/۳	۴۳۷۵۸/۳	۳۹۶۷/۷	۵۰۴۰/۸	عملکرد واقعی (کیلو گرم/هکتار)
۱۴۶۲۵/۶۶	۱۹۹۱۲/۲	۱۳۲۳۶/۴	۱۷۴۰۰/۴	۵۶۰۰/۵۵	۶۳۹۱/۰۸	آب مورد نیاز در سطح کم آبی و کارایی مورد نظر (متر مکعب/هکتار)
۴۲۳۷۷۲/۸۸	۲۶۵۳۴/۵۵	۳۳۱۴۵/۳۷	۴۴۹۸۹/۹۲	۳۰۸۹/۲۹	۳۹۶۴/۵۴	عملکرد موجود (کیلو گرم/هکتار)

تعیین راهبردهای مناسب ...

۱۷۶۶۶/۰۰	۱۶۱۱۴/۸۶	۱۵۴۳۳/۶۰	۱۶۱۳۱/۱۱	۵۸۶۱/۱۱	۷۷۴۰/۴۳	آب مصرفی در الگوی موجود (مترمکعب/هکتار)
۷۸۹۸۹۲/۲۹	۲۵۸۹۶۲/۹	-۵۶۰۱۷۰/۱۹	۷۲۶۷۴۷/۴۴	۱۷۷۵۰۷/۷۲	۱۲۱۴۲۶/۹۲	سودخالص اجتماعی (تومان/هکتار)
۳۹/۸۶	۵۵/۶۳	-۱۵/۷۱	-۲/۷۴	۲۸/۴۳	۲۷/۱۵	درصد تغییر نسبت به عملکرد موجود
-۱۷/۲۱	۲۳/۵۶	-۱۴/۲۴	۷/۸۷	-۴/۴۵	-۱۷/۴۳	درصد تغییر نسبت به آب مصرفی موجود
۲۰/۸۲	۵۱/۸۳	۱۹/۳۴	۱۴/۷۳	۷۹/۰۳	۸۰/۸۶	هزینه اجتماعی تولید بدون هزینه اجتماعی آب درنخ بهره ۶ درصد(تومان/کیلوگرم)
۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۲	۳۰/۷۳	۳۰/۷۲	قیمت اجتماعی آب درنخ بهره ۶ درصد (تومان/مترمکعب)
۵۱/۹۲	۷۹/۷۹	۱۴/۳۲	۴۱/۵۹	۱۸۱/۴۹	۱۶۳/۸۳	قیمت اجتماعی محصول (تومان / کیلوگرم)
۲۰۰۵۳/۷۲	۱۱۴۲۰/۲۶	-۸۸۲۸۲/۸۲	۲۶۱۹۹۲/۴۵	۵۴۳۵۲/۸۶	۱۵۶۴۰/۰۷	سودخالص اجتماعی جاری هر فعالیت
۲۵۷۷۰-۰/۵۶	سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت موجود					
۴۱۸۱/۲۵	۲۳۸۸۷/۵۸	-۸۶۴۰۶/۵۳	۲۳۰۶۹۰/۶۳	۷۱۷۳۴/۵۹	۲۸۶۲۴/۹۴	سودخالص اجتماعی هر فعالیت در مدل
۲۷۲۷۱۲/۴۷	سودخالص اجتماعی در هکتار الگوی کشت مدل					
۱۰۴	۱۰۹	-۲	-۱۲	۳۲	۸۳	درصد تغییر سودخالص اجتماعی هر فعالیت نسبت به وضع موجود
۶/۰۳	درصد تغییر سودخالص اجتماعی در هکتار نسبت به الگوی کشت موجود					
۴۳/۸۸	۸۷۶/۱۴	۲۰۹۱/۳۵	۶۲۶۴/۱۴	۱۷۱۳/۷۷	۸۲۴/۴۵	کل آب مصرفی در فعالیت مدل
۴۵/۹۳	۷۱۰/۶۷	۲۴۳۲/۳۴	۵۸۱۵/۲۷	۱۷۹۴/۶۷	۹۹۸/۵۲	کل آب مصرفی در فعالیت موجود

مأخذ: یافته‌های تحقیق

الگوی بهینه کشت در سطح کارایی ۴۵ درصد و وجود ریسک در مدل

درج دل ۵ نتایج مدل در سطح کارایی ۴۵ درصد و وجود ریسک و در نظر گرفتن چند رقند به عنوان یک فعالیت دارای سودخالص اجتماعی منفی نشان داده شده است. با توجه به این جدول مشاهده می شود در سطح کارایی ۴۵ درصد، سودخالص اجتماعی در هکتارالگوهای بهینه کشت کمتر از سودخالص اجتماعی در هکتارالگوی کشت موجود است. با این حال، در سطح کارایی ۴۵ درصد، سودخالص اجتماعی در هکتارالگوهای بهینه کشت مثبت می باشد و با کاهش مقدار ریسک، به سودخالص اجتماعی در هکتارالگوی کشت موجود نزدیک می شود به طوری که در سطح ریسک ۸۰ درصد، $\frac{۳}{۵}$ درصد کمتر از مقدارالگوی کشت موجود است.

جدول ۵. الگوهای بهینه کشت در سطح کارایی ۴۵ درصد با وجود ریسک و در نظر گرفتن

چند رقند به عنوان یک فعالیت

سطح ریسک در مقدار آب آبیاری در دسترس					محصول
%۹۵	%۹۰	%۸۷/۵	%۸۵	%۸۰	
			۰/۱۲۹	۰/۱۲۹	گندم سطح کم آبیاری ۱۴
	۰/۱۲۹	۰/۱۲۹			گندم سطح کم آبیاری ۲۳
۰/۱۲۹					گندم سطح کم آبیاری ۲۷
۰/۳۰۶	۰/۳۰۶	۰/۳۰۶			جو سطح کم آبیاری ۱۲
				۰/۳۰۶	جو سطح کم آبیاری ۱۷
			۰/۳۰۶		جو سطح کم آبیاری ۲۰
۰/۱۵۸	۰/۱۵۸	۰/۱۵۸	۰/۱۵۸	۰/۱۵۸	چند رقند سطح کم آبیاری ۲۲
۰/۳۶	۰/۱۵۸				گوجه فرنگی سطح کم آبیاری ۴
۰/۲۰۳	۰/۳۶	۰/۳۴۶			گوجه فرنگی سطح کم آبیاری ۸
		۰/۰۱۴			گوجه فرنگی سطح کم آبیاری ۱۹
			۰/۳۴۴		گوجه فرنگی سطح کم آبیاری ۲۰
			۰/۰۱۷		گوجه فرنگی سطح کم آبیاری ۲۵
		۰/۰۰۳	۰/۰۰۳		پیاز سطح کم آبیاری ۶
		۰/۰۰۳			پیاز سطح کم آبیاری ۷
۰/۰۰۳	۰/۰۰۳				پیاز سطح کم آبیاری ۲۴
			۰/۰۴۴	۰/۰۴۴	سیب زمینی سطح کم آبیاری ۱۹
			۰/۰۱۶		سیب زمینی سطح کم آبیاری ۲۴

تعیین راهبردهای مناسب ...

۰/۰۴۴	۰/۰۴۴	۰/۰۲۸			سیب زمینی سطح کم آبیاری ۲۷
-۹۳۸۷/۷۳۷	۹۳۰۲۶/۲۲۳	۱۷۵۳۰۶/۶۰۴	۲۱۰۶۷۰/۱۰۹	۲۴۸۰۶۴/۵۵۳	سودخالص اجتماعی (تومان/هکتار)
۸۰۳۸/۶۴	۸۷۳۲/۷۶	۹۲۹۹/۸۳	۹۷۷۹/۶۵	۱۰۶۰۸/۴۴	آب آبیاری مورد نیاز (مترمکعب/هکتار)
-۱۰۳/۶۵	-۶۳/۸۳	-۳۱/۸۴	-۱۸/۰۹	-۳/۵۵	درصد تغییر سودخالص اجتماعی در هکتارالگوی بهینه کشت نسبت به الگوی کشت موجود
-۳۱/۸۶	-۲۵/۹۸	-۲۱/۱۷	-۱۷/۱۰	-۱۰/۰۸	درصد تغییر آب آبیاری مورد نیاز در هکتارالگوی بهینه کشت نسبت به الگوی کشت موجود

مأخذ: یافته‌های تحقیق

ارزیابی الگوهای بهینه کشت با در نظر گرفتن چندرقند به عنوان یک فعالیت

با نگاهی به نتایج مدل در شرایطی که چندرقند به عنوان یک فعالیت در نظر گرفته شد، مشاهده می‌شود که امکان افزایش سودخالص اجتماعی در هکتار وجود دارد. این امر در شرایطی تحقق می‌یابد که چندرقند با تنفس زیاد در هر مرحله از رشد خود مواجه شود (در این شرایط عملکرد واقعی نسبت به عملکرد موجود ۱۵/۷ درصد کاهش می‌یابد) و در عین حال سطح کارایی آب آبیاری در سطح مزرعه بیشتر از ۴۵ درصد باشد و مقدار ریسک در دسترسی به مقدار آب آبیاری نیز کاهش یابد. ملاحظه می‌شود که هر چقدر مقدار ریسک در مقدار آب آبیاری افزایش یابد، سودخالص اجتماعی کاهش می‌یابد. می‌توان نتیجه گرفت که با حفظ الگوی کشت موجود و افزایش کارایی مصرف آب آبیاری و به کارگیری تنفس مناسب برای فعالیت چندرقند، که دارای سودخالص اجتماعی منفی است، امکان کاهش بخش زیانده اجتماعی الگوهای کشت موجود و در نتیجه افزایش سودخالص اجتماعی وجود دارد. باید گفت که افزایش کارایی بدون هزینه نیست ولذا خود مسئله‌ای اقتصادی است که باید هزینه و منافع آن برای بخش خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در بیشتر مطالعات افزایش کارایی با فرض هزینه صفر ارزیابی و لذا روی آن تأکید بسیار شده است.

نتیجه‌گیری

مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای تعیین راهبرد مناسب آبیاری در سطح مزرعه به گونه‌ای که منافع اجتماعی حداکثر شود، ساخته شد. مدل درسسه سطح کارایی ۳۵، ۴۵ و ۶۵ درصد در مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و نیز در حالت با و بدون ریسک در مقدار آب آبیاری و همچنین در حالت با و بدون لحاظ کردن چغندرقند (محصولی که براساس کارتحقيقاتی سلطانی و همکاران فاقد مزیت نسبی و درنتیجه دارای سودخالص اجتماعی منفی بود) حل شد. مقدار تنش در مراحل مختلف رشد گیاه با استفاده از نرم افزار اکسل، به طور تصادفی بین ۱-۰/۵ تعیین گردید. افزون برآن، هر محصول زراعی در قالب ۴۵ فعالیت جدا، که تنشهای مختلفی بر مراحل رشد آنها اعمال گردید، در نظر گرفته شد. برنامه نوشته شده علاوه بر الگوی بهینه کشت، نسبت عملکرد واقعی به پتانسیل، عملکرد واقعی، مقدار آب آبیاری در هر مرحله از رشد گیاه در سطوح بازده مختلف و کل آب آبیاری مورد نیاز را برای هر سطح کم آبیاری موردنظر به دست داد.

با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که بازده آبیاری در سطح نمونه بین محصولات متفاوت است و کارایی مصرف آب در کل نمونه بیشتر از ۳۵ درصد می‌باشد. افزون برآن، به نظر می‌رسد اگر مقدار سطوح کم آبیاری مورد نظر بیشتر می‌بود، احتمالاً نتایج به واقعیت‌های موجود نزدیکتر می‌شد. با این حال، نتایج به دست آمده در سطح کارایی ۳۵ درصد خیلی به واقعیت‌های موجود در سطح مزرعه نزدیک است. شاید یک روش عملی در تعیین بازده آب آبیاری در سطح مزرعه، روش به کار گرفته شده در همین مطالعه باشد: یعنی تعیین مقادیر آب آبیاری در سطوح مختلف کارایی با توجه به سطوح متفاوت تنش در مراحل رشد گیاه و در نتیجه، تعیین مقدار آب آبیاری مورد نیاز و عملکرد واقعی و سپس مقایسه نتایج به دست آمده با وضعیت موجود در سطح مزرعه. نتایج مدل در سطح کارایی ۴۵، ۶۵ و ۲۵ درصد در حالت نبود ریسک و سطوح ریسک ۸۰، ۸۵، ۸۷/۵ و ۹۰ و ۹۵ درصد در مقدار دسترسی به آب آبیاری نیز به دست آمد که بیان تمامی نتایج به دست آمده منجر به

تعیین راهبردهای مناسب ...

طولانی شدن مقاله می‌شود و لذا نتایج سطح کارایی ۴۵ درصد ارائه شد که نشان می‌دهد کاهش مصرف آب دریک فعالیت الزاماً به معنی کاهش آب درالگوی کشت نیست.

با توجه به الگوهای بهینه کشت، که درحقیقت از توابع تولید زماندار به دست آمده‌اند، به نظررسید که اصل بیان شده برای تخصیص آب، یا برابری بازده نهایی آب درمراحل مختلف رشد گیاه، درسطح مزرعه کافی نباید. بدیهی است که اگریک محصول درسطح مزرعه کاشته می‌شد، اصل فوق برای تخصیص آب محدود کافی می‌بود. اما اکثر کشاورزان بیش ازیک محصول درمزرعه می‌کارند؛ محصولاتی که مراحل رشد آنها متفاوت است و این امکان برای کشاورزان هست که براساس باور ذهنی خود نسبت به تأثیر آبیاری در کل سوددهی مزرعه و نه یک محصول، به مراحلی از رشد بعضی از محصول یا محصولات آب کمتری دهند تا آبی که از این طریق برای آنها باقی می‌ماند به محصولی دیگر در مزرعه اختصاص یابد. انتظار آن است که این مسئله تا جایی ادامه یابد که کاهش درآمد حاصل از آبیاری کمتر، با افزایش درآمد حاصل ازبه کارگیری آب درمحصول دیگر برابر شود؛ به عبارت دیگر بازده نهایی آب نه تنها درمراحل مختلف رشد یک گیاه بلکه درمراحل رشد گیاهان مختلفی که درمزرعه کاشته می‌شوند و قطعاً این مراحل با یکدیگر متفاوتند، باید برابر شود. نتایج همچنین نشان داد که سطوح کارایی پایین تر و مقدار ریسک بالاتر به واقعیت‌های موجود منطقه نزدیکتر است و لذا زمینه‌ای که لازم است در آن بیشتر تحقیق و سرمایه‌گذاری شود، مشخص گردید.

با نگاهی به نتایج مدل درشرایط لحاظ چغدرقند به عنوان یک فعالیت، مشخص شد که امکان افزایش سودخالص اجتماعی در هر هکتار وجود دارد. این امر درشرایطی تحقق یافت که چغدرقند با تنفس زیاد در هر مرحله از رشد خود مواجه شد (در این شرایط عملکرد واقعی نسبت به عملکرد موجود ۱۵/۷ درصد کاهش داشت). در این حالت، امکان افزایش سودخالص اجتماعی زمانی بیشتر است که سطح کارایی آب آبیاری درسطح مزرعه بیشتر از ۴۵ درصد می‌باشد و مقدار ریسک دسترسی به مقدار آب آبیاری نیز کاهش می‌یابد.

منابع

۱. سلطانی، غ. (۱۳۷۲)، تعیین آب‌ها و تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سدها: مطالعه موردی سد درودزن، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ۱۹۹۵-۲۱۱.
۲. وزارت کشاورزی، سازمان تات (۱۳۷۵)، سند ملی آب کشور، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
۳. وزارت نیرو، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان (۱۳۸۲)، آب محور توسعه خراسان، معاونت برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت، ص: ۱۴.
4. Allen, R. G.; L. S. Pereira; D. Raes and M. S. Smith (1988), Crop evapotranspiration, *Irrigation and Drainage Paper*, No. 56, FAO, Rome, PP: 300.
5. Brooke, A.; D. Kendric and A. Meeraus (1988), GAMS, A User's Guide, *The Scientific Press*. P: 273.
6. Charnes, A. and W. W. Cooper (1959), Chance constrained programming, *Manag. Sci.*, 6:73-79.
7. Evans, E. M.; D. R. Lee.; R. N. Boisvert.; B. Arec.; T. S. Steenhuis.; M. Prano and S. V. Poats (2003), Achieving efficiency and equity in irrigation management: an optimization model of the EL Angel watershed, Carchi, Ecuador, *Agric. Sys.*, 77: 1-22.
8. Gharaman, B. & A.R. Sepaskhah (2004), Linnear and non Linnear optimization models for Allocation of limited water, supply, *Irrig. Drain.*, 53:39-54
9. Johansson, R. C.; Y. Tsur.; T. L. Roe and R. Doukkali (2002), Pricing irrigation water: a review of theory and practice, *Water*

تعیین راهبردهای مناسب ...

Policy, 4:173–199.

10. Mainuddin, M.; A. D. Gupta and P. R. Onta (1997), Optimal crop planning model for an existing groundwater irrigation project in Thailand, *Agric. Water Manag.*, 33: 43-62.
11. McCarl, B. A. and T. H. Spreen (2005), Applied mathematical programming using algebraic systems, University of California, mccarl@tamu.edu.
12. Maji, C. O. and E. O. Heady (1978), Intertemporal allocation of irrigation water in the Mayurakshiproject (India): an application of chance-constrained linear programming, *Water Resour. Res.*, 14(2): 190-196.
13. Pazira, E. and K. Sadeghzadeh (1999), Sustainable soil and water use in agricultural sector of Iran, International Conference on Agricultural Engineering, Beijing, China.
14. Rosegrant, M. W.; C. Ringler.; D. C. McKinney.; X. Cai.; A. Keller and G. Donoso (2000), Integrated economic-hydrologic water modeling at the basin scale: the Maipo River Basin. EPTD Discussion, Paper NO. 36., International Food Policy Research Institute, Washington D.C. , U.S.A.
15. Siadat, H. (2000), Iranian agriculture and salinity, Soil and Water Research Institue of Iran.
16. Soltani, G. R.; S. Pandey and W. F. Musgrave (1992), Problems of transferring crop-water production knowledge to developing countries, *Water Resour. Res.*, 96-101.

17. Vojdani, F. (2003), Water management in Iran: challenges and opportunities, Tehran Province Water and Wastewater Company
E-mail: fovjdani@ hotmail.com.
18. Yaron, D. and A. Dinar (1982), Optimal allocation of farm irrigation water peak season, *Amer. J. Agric. Econ.*, 64:681-689.
19. Zibae, M. (2002), The optimization of irrigation strategies, cropping patterns and conjunctive use of groundwater and surface water under risk: a case study, Ph.D Dissertation., University of Shiraz, Shiraz, Iran.