

بررسی پیشرفت واکنش مایلارد در دو روش حرارت دهی مایکروویو و متداول در سامانه سرم آلبومین گاوی- مالتودکسترین

فرزانه نصرالله زاده^۱، مهدی وریدی^{۲*}، آرش کوچکی^۳، فرزین هادی زاده^۴

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

۲- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

۳- استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

۴- استاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۶/۲۰ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۶/۲۰)

چکیده

حرارت دهی مایکروویو به عنوان یکی از روش های رایج گرمادهی در پخت و فرآوری مواد غذایی می باشد که گفته می شود علاوه بر اثرات حرارتی، اثرات غیر حرارتی نیز بر اجزای مواد غذایی دارد. در پژوهش حاضر اثر حرارت دهی مایکروویو و مقایسه آن با حرارت دهی متداول بر پیشرفت واکنش مایلارد در سامانه سرم آلبومین گاوی - مالتودکسترین مورد مطالعه قرار گرفت. واکنش مایلارد در دمای 90°C در شرایط مرطوب و با نسبت های مختلف ۱:۱، ۱:۳ و ۱:۵ از مالتودکسترین: سرم آلبومین گاوی در زمان های ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه انجام پذیرفت. سپس به منظور بررسی پیشرفت واکنش مایلارد، درصد گلیکوزیلامبیون، شدت رنگ، تشکیل ترکیبات حد واسط و ثابت سرعت واکنش توسط آزمون های ارتقو فتالدی آلدهید، جذب در ۴۰ نانومتر، جذب در ناحیه فرابنفش و ارزیابی پارامترهای رنگی L^* ، a^* و b^* اندازه گیری گردید. آنالیز واریانس داده ها نشان داد که روش حرارت دهی مایکروویو تاثیر بیشتری در پیشرفت واکنش مایلارد داشت، به طوری که درجه گلیکوزیلامبیون و جذب در ۴۰ نانومتر اعداد بالاتری را نسبت به روش معمول حرارت دهی نشان دادند. با این وجود، تفاوت آماری معنی داری بین شاخص های رنگی L^* ، a^* و b^* در بین دو روش حرارت دهی مشاهده نگردید ($p>0.05$). همچنین نتایج مولید آن بود که مقادیر بیشتر مالتودکسترین در محیط واکنش (نسبت: ۵ در قیاس با نسبت لایه های ۱:۳ و ۱:۱ مالتودکسترین: پروتئین) اثر معنی داری در پیشرفت واکنش داشت ($p<0.05$). نتایج بدست آمده نشان داد که واکنش مایلارد تحت مایکروویو از سرعت بالاتری نسبت به روش حرارت دهی حمام آب برخوردار است.

کلید واژگان: واکنش مایلارد، حرارت دهی مایکروویو، حرارت دهی متداول، سرم آلبومین گاوی، مالتودکسترین

و توسعه استفاده از روش مایکروویو در فرآیندهای مختلف صنایع غذایی [۱۸، ۱۷] از سوی دیگر، ضرورتی را به منظور بررسی این واکنش مهم غذایی تحت مایکروویو و سپس مقایسه آن با روش معمول حرارت دهنده ایجاد می کند تا بدین وسیله اقدامات لازم جهت کنترل یا تسريع این واکنش تحت مایکروویو صورت پذیرد.

پژوهش هایی در زمینه بررسی واکنش مایلارد در دو روش حرارت دهنده معمول و مایکروویو، در سامانه های مختلف همچون کازئین - گلوکر/سیکلودکسترن در شرایط مرطوب [۱۹]، اوالبومین - گلوگر در شرایط خشک [۲۰]، گلاسین - گلوگر در شرایط مرطوب [۲۱] و ایزوله پروتئین سویا - لاکتوز / نشاسته در شرایط مرطوب [۲۲] صورت گرفته است. لازم به ذکر است که کنترل متغیرهای دما و زمان در بررسی و مقایسه واکنش مایلارد در این روش های حرارتی مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که در پژوهش های گذشته سیستم کنترلی دقیقی برای ثابت نگهداشتن متغیرهای زمان - دما در مایکروویو موجود نبوده است، در نتیجه دسترسی به نتایج قابل استناد برای مقایسه دو روش حرارت دهنده دشوار به نظر می آید [۶].

سرم آلبومین گاوی^۴، بیشترین مقدار پروتئین پلاسمای خون گاو را به خود اختصاص می دهد و یکی از محصولات جانبی بدست آمده از کشتار دام است. این پروتئین از طریق هفده پیوند دی سولفیدی درون مولکولی پایدار شده و دارای ساختمان کروی و مستحکم^۵ می باشد [۲۳]. سه ناحیه^۶ اصلی در ساختمان سرم آلبومین گاوی به گونه ای آرایش یافته اند که باعث ایجاد ساختمان انعطاف پذیر در پروتئین شده و توانایی مولکول را برای اتصال با سایر مولکول ها افزایش می دهدن [۲۴، ۲۵]. از طرفی دیگر، از این پروتئین می توان برای کاربردهای تکنولوژیکی نظری حمل ترکیبات فلاونوئیدی و دارویی نیز استفاده نمود [۲۶-۲۸]. به دلیل ویژگی های بیولوژیکی، فیزیکو شیمیایی و ساختمانی شناخته شده، در تحقیقات سرم آلبومین گاوی به طور گسترده ای در سامانه های مدل به کار گرفته می شود.

۱- مقدمه

استفاده از انرژی مایکروویو برای انجام واکنش های شیمیایی مانند مایلارد هنگامی آغاز گردید که دانشمندان متوجه تفاوت روش معمول حرارتی و مایکروویو در تسريع واکنش ها شدند [۲، ۱]. امواج مایکروویو به دسته ای از امواج الکترومغناطیسی اطلاق می شود که محدوده فرکانسی آنها در بازه 300 GHz - 300 MHz قرار دارد [۳]. تبدیل انرژی مایکروویو به گرما از طریق دو مکانیسم چرخش مولکول های دوقطبی و هدایت یونی صورت می گیرد که در اثر این چرخش گرما در سامانه مورد نظر تولید می شود. این در حالی است که حرارت دهنده به روش های معمول اصولا بر پایه پخش انرژی توسط فرآیندهای همرفت، هدایت^۷ و تابش^۸ در محیط واکنش صورت می گیرد [۴]. عقیده بر این است اثر مایکروویو بر واکنش های شیمیایی از طریق ترکیبی از دو اثر حرارتی و غیر حرارتی اعمال می شود [۵].

از مزیت های استفاده از حرارت دهنده مایکروویو در قیاس با حرارت دهنده معمول در سنتزهای شیمیایی می توان به انتخاب گری این پرتوها در برهم کنش با ترکیبات، کاهش زمان انجام واکنش، افزایش میزان تولید و خلوص محصول اشاره کرد [۶]. مایلارد، یکی از مهم ترین واکنش ها در مواد غذایی می باشد که حین فرآیند حرارتی و طی زمان نگهداری، بدون استفاده از هیچ گونه واکنشگر شیمیایی اضافی بین گروه کربونیل یک قند احیا کننده و گروه آمین آزاد یک اسید آمینه رخ می دهد [۸، ۷]. واکنش مایلارد در شرایط کنترل شده به عنوان روشی اینم برای بهبود ویژگی های آنتی اکسیدانی و حسی نظری رنگ، بو، طعم و ویژگی های عملکردی پروتئین ها معروف شده است [۱۳-۹]. با این وجود، طبق بررسی های صورت گرفته تشکیل ترکیب سمی آکریل آمید طی واکنش مایلارد در غذاهای غنی از کربوهیدرات بالا به اثبات رسیده است [۱۵، ۱۴].

به لحاظ تکنولوژیکی، کنترل کیفیت مواد غذایی به معنای کنترل تعییرات شیمیایی، فیزیکی و میکرو بیولوژیکی طی فرآیند تولید و نگهداری مواد غذایی است [۱۶]. گستردگی واکنش مایلارد در فرآیندهای پخت، حرارت دهنده و نگهداری مواد غذایی از یک سو

4. Bovine Serum Albumin (BSA)

5. Rigid

6. Domain

1. Convection

2. Conduction

3. Radiation

تیمار حرارتی مایکروویو؛ بدین منظور از دستگاه مایکروویو آزمایشگاهی میکرو سینس^۳ (مایل استون^۴، آمریکا) استفاده شد. دما و زمان واکنش در این دستگاه که مجهز به سنسور دمایی IR و فیر نوری با حساسیت بالا بود، کنترل گردید. نوسانات دمایی محلول واکنش و تغییرات فشار به ترتیب برابر $1^{\circ}\text{C} \pm 0.5$ بار گزارش شد. دمای محلول حاوی بیopolymerها، در مدت ۴ دقیقه در دستگاه مایکروویو، با توان ۸۰۰ وات، از 25°C به 90°C رسید. مدت زمان اعمال تیمار حرارتی پس از این ۴ دقیقه در نظر گرفته شد و سپس تیمار حرارتی مایکروویو با توان ۴۵۰ وات در مدت زمان ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و 120°C انجام گرفت. محلول واکنش پس از اعمال تیمار حرارتی، به سرعت در حمام آب و یخ خنک شده و برای انجام آنالیز های بعدی در دمای 4°C نگهداری گردید.

تیمار حرارتی حمام آب: برای این منظور، ظرف حاوی Boviplymerها در داخل حمام آب قرار گرفت و دمای محلول طی واکنش با دماسنج دیجیتال کالیبر شده (فرنچ کوکینگ^۵، فرانسه)، کنترل گردید. در ابتدا محلول با دمای 25°C بر روی هات پلیت^۶ قرار گرفته و طی ۴ دقیقه دمای آن به 90°C رسید. سپس ظرف واکنش به داخل حمام آب منتقل گردیده و پس از گذشت مدت زمان های ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و 120°C ، به منظور متوقف نمودن واکنش ظرف نمونه به حمام آب و یخ منتقل و به منظور انجام آزمون های بعدی، در دمای 4°C نگهداری گردید. تغییرات دمایی برای تیمار حرارتی حمام آب $1^{\circ}\text{C} \pm 0.5$ ثبت شد.

۲-۲-۲- اندازه گیری درصد گلیکوزیلاسیون

با استفاده از آزمون ارتو- فتالدی آلدهید و بر اساس روش چارچ و همکاران (۱۹۸۳)^[۲۹] و با اندکی اصلاح به روش گارسیا آمسکوتا و همکاران (۲۰۱۴)^[۳۰] صورت گرفت؛ بدین ترتیب که مقدار ۴۰ میلیگرم از ارتو- فتالدی آلدهید در ۱ میلی لیتر متانول (۹۸ درصد) حل و سپس به ترتیب ۲۵ میلی لیتر از بافر بوراکس pH ۹/۷۵ و غلاظت ۱۰۰ میلی مولار، ۲/۵ میلی لیتر محلول ۲۰ درصد وزنی / حجمی سدیم دو دسیل سولفات و ۱۰۰ میکرولیتر بتا- مرکاپتوناتول به آن افزوده و سپس محلول

مالتدکسترین^۱، پلی ساکاریدی ساخته شده از مونومرهای گلوكز با پیوندهای $\alpha(1 \rightarrow 4)$ می باشد که از هیدرولیز جزئی نشاسته بدست می آید. به دلیل خشی بودن زنجیره و همچنین قابلیت احیاکنندگی، می توان از آن به عنوان جزء پلی ساکاریدی شرکت کننده در واکنش مایلارد، استفاده کرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیشرفت واکنش مایلارد در حرارت دهی مایکروویو و سپس مقایسه آن با روش معمول حرارت دهی (حمام آب) در شرایط کاملاً برابر و کنترل شده دمایی (90°C) و زمانی (۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و 120°C)، در سامانه سرم آلبومین گاوی - مالتودکسترین می باشد.

۲- مواد و روش ها

۱-۱- مواد

سرم آلبومین گاوی، مالتودکسترین با دکستروز اکی والان ۱۹/۵ ۱۶/۵ و ارتفانالدی آلدهید^۲ از شرکت سیگما (آمریکا) خریداری گردید. دیگر مواد مورد استفاده در این پژوهش از کیفیت آزمایشگاهی بروخوردار بودند.

۲-۲- روش ها

۱-۲-۱- تهیه کمپلکس های کووالانسی سرم آلبومین گاوی - مالتودکسترین

سرم آلبومین گاوی و مالتودکسترین مورد استفاده در این پژوهش به طور جداگانه در بافر فسفات سدیم (pH ۷/۵ و غلاظت ۵۰ میلی مولار) برای رسیدن به غلاظت نهایی ۲ درصد و با نسبت های ۱:۱ و ۱:۵ وزنی - وزنی مالتودکسترین: سرم آلبومین گاوی تهیه و روی همزن مغناطیسی به مدت ۴۵ دقیقه حل شد. سپس محلول های سرم آلبومین گاوی و مالتودکسترین که به طور جداگانه به مدت ۱۸ ساعت در دمای 4°C جذب آب کرده بودند، با یکدیگر مخلوط گردیده و محلول حاصل مجدداً روی همزن مغناطیسی به مدت ۱ دقیقه قرار گرفت. پس از این مرحله، تیمار حرارتی مطابق زیر صورت پذیرفت.

3. MicroSYNTH

4. Milestone

5. French cooking

6. Hot plate

1. Maltodextrin (MD)

2. Ortho-phthalaldehyde (OPA)

وارد ظرف مخصوص شده و پارامترهای رنگی آن در فضای L^* a^* b^* ثبت شد.

۲-۵-۲- محاسبه ثابت سرعت واکنش

محاسبه ثابت سرعت بر حسب قانون سرعت واکنش‌های شیمیایی و بر اساس مصرف آمین آزاد صورت گرفت (گوان و همکاران، ۲۰۰۶) [۱۷]:

$$\frac{dA}{dt} = kA^n$$

که در آن سرعت کاهش غلظت جزء A طی زمان t بستگی به غلظت آن جزء در نمونه و ثابت سرعت n و k (مرتبه واکنش) دارد. با انتگرال‌گیری از معادله بالا، روابط زیر حاصل خواهد شد:

$$[A] = [A]_0 e^{-kt}$$

$$[A] = [A]_0 e^{-kt}$$

$$[A]^{-1} = [A]_0^{-1} + kt$$

در این پژوهش، A غلظت آمین آزاد است. با توجه به معادلات بالا، ثابت سرعت واکنش برای مصرف آمین آزاد در هر دو روش حرارت‌دهی و در نسبت‌های مختلف از MD-BSA بدست آمد.

۶-۲-۲- آنالیز آماری

آزمون‌های شیمیایی حداقل در دو تکرار انجام گرفت. به منظور بررسی اثرات معنی‌داری تیمارها، داده‌های بدست آمده به روش تجزیه واریانس ANOVA در سطح معنی‌داری ۹۵ درصد توسط نرمافزار آماری SPSS (نسخه ۱۹، ۲۰۱۰، آمریکا) و اثرات مقابله‌ای متغیرها توسط نرمافزار آماری Minitab (نسخه ۱۶/۲/۴، ۲۰۱۳، آمریکا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- ارزیابی درجه گلیکوزیلاسیون

اساس آزمون ارتو- فتالدی‌آلدهید اینگونه است که ترکیب فلورسنسنی ارتو- فتالدی‌آلدهید می‌تواند در شرایط قلیایی شدید و در حضور بتا- مرکاپتواتانول و سدیم دو دسیل سولفات با گروه آمین آزاد پروتئین‌ها وارد واکنش شود. کمپلکس حاصل در

حاصل با آب دیونیزه به حجم ۵۰ میلی‌لیتر رسانده شد. به منظور اندازه‌گیری میزان آمین بلوکه شده طی واکنش مایلارد، ۴ میلی‌لیتر از محلول ارتو- فتالدی‌آلدهید تهیه شده به ۲۰۰ میکرولیتر از محلول‌های کونژوگه (با غلظت ۲ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر پروتئین) افزوده و پس از دو دقیقه گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۵°C، جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفس - مرئی (مدل یو وی ۲۶۰۱، شرکت رای لی، چین) در ۳۴۰ نانومتر خوانده شد. در صد گلیکوزیلاسیون به صورت زیر محاسبه گردید:

$$DG = \frac{(A_m - A_s)}{A_p}$$

که در آن DG ، A_m ، A_s و A_p به ترتیب نمایانگر در صد گلیکوزیلاسیون، میزان آمین آزاد در محلول پروتئین و پلی‌ساقارید (بدون تیمار حرارتی)، میزان آمین آزاد در محلول کونژوگه حاصل و میزان آمین آزاد در محلول پروتئینی می‌باشد. منحنی استاندارد با استفاده از L - لیزین مونوهیدرات و با تهیه محلول مادر با غلظت ۱ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر رسم گردید (غلظت‌های ۰/۱۵ - ۰/۰۲ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از محلول مادر L - لیزین مونوهیدرات).

۳-۲-۲- اندازه‌گیری جذب در ۴۲۰ و ۲۹۴ نانومتر

به منظور بررسی پیشرفت تولید ترکیبات ملانوئیدینی و ترکیبات آمادوری طی واکنش مایلارد با اندکی تغییر بر اساس روش گوان و همکاران (۲۰۱۱) [۲۲]، به ترتیب جذب محلول‌های کونژوگه در ۴۲۰ و ۲۹۴ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفس - مرئی (مدل یو وی ۲۶۰۱، شرکت رای لی، چین) اندازه pH گیری شد. محلول کونژوگه ۵ برابر با بافر فسفات سدیم ۷/۵ برابر و غلظت ۵۰ میلی‌مولار) رقیق و سپس جذب در ۲۹۴ نانومتر، محلول‌های کونژوگه حاوی ۳ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر پروتئین تهیه و سپس جذب آن‌ها در ۴۲۰ نانومتر قرائت گردید.

۴-۲-۴- اندازه‌گیری پارامترهای رنگی L^* ، a^* و b^*

برای تعیین پارامترهای رنگی از رنگ‌سنج دیجیتال (مدل ۴۱۰- سی آر، شرکت کونیتا مینولتا سنسینگ، ژاپن) استفاده گردید. کالیبراسیون اولیه دستگاه به کمک کاشی سفید استاندارد انجام شد. به این ترتیب که مقدار ۸ میلی‌لیتر از محلول‌های کونژوگه

مايكروويو و حمام آب به ترتيب برابر ۱۱/۱ و ۱۲ درصد بود که اين ميزان با گذشت ۱۲۰ دقیقه به ترتيب به ۶۶/۶۵ و ۶۳/۰۵ درصد افزایش يافت. گارسيا آمسکوتا و همکاران (۲۰۱۴) [۳۰] و ستو و همکاران (۲۰۱۲) [۳۳] در پژوهش‌های خود، کاهش درصد آمين‌های آزاد را با افزایش زمان تیمار حرارتی طی واکنش مايلارد گزارش کردند. اثر زمان را می‌توان این گونه تفسیر کرد که در پروتئین‌های کروی شکل، بسياری از گروه‌های فعال جهت شرکت در واکنش مايلارد، در ساختمان سوم و چهارم پروتئين پنهان شده‌اند؛ با افزایش زمان حرارت دادن و دناتوراسيون پروتئين، اين گروه‌ها در معرض قرار گرفته و قابلیت شرکت در واکنش را بدست می‌آورند [۷]. با توجه به شکل ۲ می‌توان دریافت که سرعت افزایش درصد گلیکوزیلاسیون طی زمان در تیمارهای تحت مايكروويو بيشتر از تیمارهای حمام آب بوده است. گوان و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیق خود در خصوص بررسی اثرات غير حرارتی مايكروويو بر واکنش مايلارد دریافتند که سرعت شکستن پيوندهای دی‌سولفیدی پروتئین‌ها در حرارت دهی مايكروويو به طور معنی‌داری بيشتر از شکستن اين پيوندها در حرارت دهی معمول است. اين امر موجب باز شدن سريعتر ساختمان پروتئين شده، که نتيجتاً افزایش سرعت گلیکوزیلاسیون را به همراه خواهد داشت [۲۲].

نتایج آنالیز آماری، تغییرات معنی‌دار درجه گلیکوزیلاسیون را در نسبت‌های مختلف مالتودکسترين: سرم آلبومین گاوی نشان داد (شکل ۲). به اين صورت که ميانگين درصد گلیکوزیلاسیون در نسبت‌های ۱:۳، ۱:۱ و ۱:۵ مالتودکسترين: سرم آلبومين گاوی به ترتيب برابر ۲۸، ۲۴ و ۴۰ درصد مشاهده شد. ژائو و همکاران (۲۰۱۳) گزارش کردند که طی گلیکوزیلاسیون پروتئین سويا توسط دكستران، با افزایش نسبت پلی‌ساكارید به پروتئین، درجه گلیکوزیلاسیون نيز افزایش می‌يابد [۳۴]. يافته‌های ژائگ و همکاران (۲۰۱۲) روی تاثير نسبت دكستران بر پيشبرد گلیکوزیلاسیون بتاكانگلايسين سويا طی واکنش مايلارد نيز اين موضوع را تاييد نمود [۳۵].

طول موج ۳۴۰ نانومتر جذب خواهد داشت که نشانگر درصد گلیکوزیلاسیون می‌باشد [۲۹].

اندازه‌گيري‌ها نشان دادند که ميزان آمين بلوكه شده در هر سه نسبت ۱:۱، ۱:۳ و ۱:۵ از مالتودکسترين: سرم آلبومين گاوی بدلون تیمار حرارتی، تقریباً برابر صفر بودند (نتایج نشان داده نشده‌اند). در نتیجه، کاهش ميزان آمين آزاد در محلول کونزنوگه حاصل و به عبارتی افزایش درصد گلیکوزیلاسیون می‌تواند نشان‌گر اتصال کووالانسی مالتودکسترين به گروه‌های آمين آزاد سرم آلبومين گاوی باشد.

نتایج حاصل از آنالیز واريانس نشان داد که روش حرارت دهی مايكروويو نسبت به روش حرارت دهی حمام آب اثر بيشتری بر افزایش ميزان گلیکوزیلاسیون سرم آلبومين گاوی دارد ($p < 0.05$). يافته‌های گوان و همکاران (۲۰۱۱) [۲۲] روی گلیکوزیلاسیون پروتئین سويا به همراه چهار عامل قندی متفاوت، نشان داد طی تیمار حرارتی، ساختمان پروتئین از حالت تاخورده به حالت باز تبدیل می‌شود؛ در حرارت دهی متداول ساختمان پروتئین دستخوش آگلومریزاسیون ثانویه می‌گردد. در حالی که تحت مايكروويو، به علت تغييرات ساختمان دوم پروتئین و همچنين شکستن بيشتر پيوندهای دی‌سولفیدی، آگلومریزاسیون به ميزان كمتری رخ می‌دهد در نتیجه وجود ساختارهای تجمعی كمتر در تیمارهای تحت مايكروويو می‌تواند عاملی برای دسترسی بيشتر گروه‌های آمين آزاد برای انجام واکنش مايلارد و به تبع آن درجه گلیکوزیلاسیون بالاتر باشد (شکل ۱). بر اساس يافته‌های بوهر و بوهر (۲۰۰۰) امواج مايكروويو می‌تواند منجر به تغيير سيتنيک تاشدگی و دناتوراسيون پروتئين‌ها گردد [۳۱]. همچنين، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که امواج مايكروويو با اثر بر الکتروليتهای موجود در سامانه‌های غذائي می‌تواند بر تسريع واکنش مايلارد و در نتیجه افزایش شدت رنگ و تركيبات طعمی اثر گذار باشد [۳۲].

با افزایش زمان حرارت دهی، روند افزایشي در گلیکوزیلاسیون سرم آلبومين گاوی مشاهده شد. همانطور که از شکل ۲ پيداست، درصد گلیکوزیلاسیون طی ۱۵ دقیقه از گذشت واکنش در نسبت ۱:۵ مالتودکسترين: سرم آلبومين گاوی، در روش‌های حرارت دهی

نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری بین دو روش حرارت دهنده در جذب ۴۲۰ نانومتر وجود دارد ($p<0.05$), به طوری که مقدار مشاهده شده در گرمادهی مایکروویو (۰/۱۵) بالاتر از حمام آب (۰/۱۲) ثبت گردید. این پدیده را می‌توان به بالاتر بودن درجه گلیکوزیلاسیون در گرمادهی مایکروویو نسبت داد. نتایج مشابهی در پژوهش بی و همکاران (۲۰۱۵) و گوان و همکاران (۲۰۱۱) به ترتیب در گلیکوزیلاسیون کازئین و پروتئین سویا طی روش مایلارد مشاهده شد و علت آن بالاتر بودن درجه گلیکوزیلاسیون و به دنبال آن پیشرفت واکنش به سمت تولید ترکیبات قهوه‌ای رنگ گزارش گردید [۱۹، ۲۲]. این در حالی است که گوان و همکاران (۲۰۰۶) در گلیکوزیلاسیون پروتئین سویا توسط مالتوز و لاکتوز عدد جذب بالاتری را در طول موج ۴۲۰ نانومتر برای نمونه‌های تحت تیمار حمام آب نسبت به مایکروویو بدست آوردند و علت این پدیده را انجام واکنش جانبی کارامیلزاسیون طی حرارت دهنی حمام آب گزارش کردند [۱۷].

با توجه به شکل ۳، با گذشت زمان میزان جذب در هر دو روش حرارتی روند افزایشی به دنبال داشت که با نتایج حاصل از پژوهش بی و همکاران (۲۰۱۵) و تو و همکاران (۲۰۱۳) مطابقت داشت [۱۹، ۳۹]. چرا که با گذشت زمان و پیشرفت واکنش، تشکیل ترکیبات مولد رنگ قهوه‌ای افزایش یافت و در نتیجه جذب در ۴۲۰ نانومتر نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بود. با توجه به شکل ۳ می‌توان دریافت که با تغییر نسبت مالتودکسترین به سرم آلبومین گاوی از نسبت ۱:۱ به نسبت ۱:۵ مالتودکسترین: سرم آلبومین گاوی در هر دو روش حرارت دهنده میزان جذب به طور چشم‌گیری در ۴۲۰ نانومتر افزایش یافت ($p<0.05$). این نشان می‌دهد که با افزایش مقدار مالتودکسترین به عنوان قند احیاکننده در محیط واکنش، پیشرفت واکنش بیشتر شده است. زیرا تعداد آمین‌های آزاد به ازای هر مولکول پروتئین نسبت به تعداد گروه احیاکننده در هر مولکول پلی‌ساقارید بیشتر بوده و در نتیجه مقدار بیشتر پلی‌ساقارید در محیط واکنش به پیشرفت واکنش کمک می‌کند. گارسیا آمسکوتا و همکاران (۲۰۱۴) مشاهده کردند با تغییر نسبت مالتودکسترین: پروتئین آب پنیر از نسبت ۱:۱ به ۱:۲ جذب در ۴۲۰ نانومتر به طور چشم‌گیری افزایش یافت [۳۰].




Fig 1 Development of degree of glycation (DG) under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.




Fig 2 Development of degree of glycation (DG) under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min of BSA: MD.

۲-۳- پیشرفت قهوه‌ای شدن

تولید ترکیبات رنگی از ویژگی‌های مهم واکنش مایلارد می‌باشد. یکی از روش‌های آسان به منظور بررسی رنگ تولید شده، اندازه‌گیری میزان جذب در ناحیه مرئی و در طول موج ۴۲۰ نانومتر است [۳۶]. مطالعات نشان داده است بخشی از رنگ تولید شده طی واکنش مایلارد مربوط به مولکول‌های غیر اشباع با وزن مولکولی پایین و دارای باندهای دوگانه مزدوج [۳۷] و بخشی مربوط به ترکیبات هتروسیکلیک با وزن مولکولی بالا مانند پیریدین و پیروزین است که در مراحل انتهایی واکنش تولید می‌شوند و در تشکیل رنگ قهوه‌ای نقش بهسزایی دارند [۳۸].

جذب در ۲۹۴ نانومتر در زمان‌های ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه به ترتیب برابر $0/57$ ، $0/48$ ، $0/45$ ، $0/40$ و $0/37$ بود. همچنین کمترین و بیشترین میزان جذب در ۲۹۴ نانومتر در هر دو روش حرارت‌دهی به ترتیب در نسبت‌های ۱:۵ و ۱:۱ مالتودکسترن: سرم آلبومین گاوی مشاهده گردید، که نشان می‌دهد در یک نسبت ثابت از پروتئین، افزایش میزان پلی‌ساقارید در محیط واکنش، منجر به تسريع واکنش مایلارد شده و سرعت مصرف محصولات ثانویه و تبدیل آن‌ها به محصولات پایانی را افزایش می‌دهد. نتایج حاصل از آزمون‌های اندازه‌گیری آمین آزاد و جذب در ۴۲۰ نانومتر نیز تایید کننده این واقعیت بودند. همچنین آجاندوز و همکاران (۲۰۰۱) در رابطه با کاهش جذب در این طول موج اظهار داشتند یکی از علل آن می‌تواند تبدیل شدن محصولات ثانویه به محصولات پلیمری باشد که باعث می‌شود جذب در این طول موج کاهش یابد [۴۱].




Fig 4 UV absorbance at 294 nm under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.

۴-۳- بررسی تغییرات پارامترهای رنگی a^* و b^*

۴-۳-۱- شاخص L^*

شاخص L^* نمایانگر روشنایی نمونه بوده (مقادیر صفر تا ۱۰۰) و مرتبط با میزان نوری است که توسط نمونه انعکاس می‌یابد. تغییرات شاخص L^* در برابر زمان در شکل ۵ رسم شده است. با گذشت زمان، شاخص L^* در هر دو روش حرارتی مایکروویو و حمام آب به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p<0.05$). علته




Fig 3 Development of browning intensity (as an indicator of MR end products) under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.

۳-۳- بررسی تغییرات جذب ۲۹۴ نانومتر

بر اساس یافته‌های هادج (۱۹۵۳) در مرحله ثانویه واکنش مایلارد، ترکیباتی بی‌رنگ و یا زرد رنگ تولید می‌شوند که جذب بالایی در ناحیه فرابینفشن دارند. در واقع، این ترکیبات هستند که با شرکت در واکنش‌های بعدی محصولات پایانی و قهوه‌ای رنگ را ایجاد می‌نمایند [۴۰].

مقایسه میانگین‌های بدست آمده از آزمون اندازه‌گیری جذب در ۲۹۴ نانومتر در دو روش حرارت‌دهی، نشان داد که روش مایکروویو (میانگین $0/54$) جذب بالاتری در ناحیه فرابینفشن نسبت به روش حمام آب (میانگین $0/46$) به خود اختصاص داده است ($p<0.05$) که می‌تواند نمایانگر تشکیل ترکیبات حدواتسط بیشتر، در نمونه‌های تحت تیمار حرارتی مایکروویو باشد. پژوهش بی و همکاران (۲۰۱۵) روی تفاوت دو روش حرارت‌دهی متداول و مایکروویو بر تسريع گلیکوزیلایاسیون کازئین توسط گلوکز نیز تایید کننده نتایج تحقیق حاضر بود. آن‌ها دریافتند طی زمان‌های اولیه از شروع واکنش، مقدار جذب ۲۹۴ نانومتر در تیمارهای حمام آب بالاتر از مایکروویو بود؛ در حالی که پس از گذشت زمان ۳۰ دقیقه، نتایج عکس آن مشاهده گردید [۱۹].

میزان جذب در ۲۹۴ نانومتر طی زمان با افزایش معنی‌داری همراه بود ($p<0.05$)، که نشان داد با افزایش زمان تیمار حرارتی، تشکیل ترکیبات حدواتسط بیشتر شده است. براین اساس، میزان




Fig 5 Changing of L^* value under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.

۲-۴-۳- شاخص a^*

مولفه رنگی a^* از رنگ قرمز تا سبز را شامل می‌شود که مقادیر مثبت آن قرمزی و مقادیر منفی سبزی بیشتر نمونه را نشان می‌دهد. با گذشت زمان و ورود واکنش مایلارد به مراحل انتها بیان، تشکیل ترکیبات پلیمری رنگی با وزن مولکولی بالا و با ساختمان نامشخص افزایش می‌یابد. به این دسته از ترکیبات ملانوئیدین^۳ گفته می‌شود [۴۰] که حاوی ۳-۴ درصد نیتروژن بوده و عامل اصلی تولید رنگ قهقهه‌ای طی واکنش مایلارد می‌باشد [۳۶]. با تحلیل آماری داده‌های حاصل از آزمون اندازه‌گیری شاخص رنگی a^* مشخص شد که با افزایش زمان تیمار حرارتی از ۱۵ به ۹۰ دقیقه، این مولفه با افزایش معنی‌داری همراه بود ($p<0.05$) و پس از آن در زمان ۱۲۰ دقیقه کاهش یافت (شکل ۶). همانطور که در آزمون جذب ۴۲۰ نانومتر دیده شد، طی زمان با ورود واکنش مایلارد به مراحل پایانی واکنش، تشکیل ترکیبات رنگی قهقهه‌ای افزایش یافته که می‌تواند علتی برای افزایش مولفه a^* از عدد ۰/۴۸ به سمت عدد مثبت‌تر ۱/۰۸ (قرمزی بیشتر) باشد.

از طرف دیگر، نسبت‌های مختلف مالتودکسترنین: سرم آلبومین گاوی نیز اختلاف آماری معنی‌داری را در این مولفه رنگی نشان دادند ($p<0.05$) به طوری که مقادیر ۰/۶۵، ۰/۹۳ و ۰/۹۷ برای مولفه a^* به ترتیب برای نسبت‌های ۱:۱، ۱:۳ و ۱:۵ مالتودکسترنین: سرم آلبومین گاوی ثبت گردید. براساس یافته‌های حاصل از آزمون اندازه‌گیری آمین آزاد و جذب در ۴۲۰ نانومتر (شکل‌های ۱، ۲ و ۳) با افزایش نسبت مالتودکسترنین به سرم

که در توجیه این پدیده وجود دارد این است که با شروع فرآیند حرارتی در دمای ۹۰°C، ساختمان پروتئین‌های سرم آلبومین به سرعت باز شده و دناتوراسیون جزئی (باز شدن یک یا دو منطقه از پروتئین) اتفاق می‌افتد [۴۲]. در اثر باز شدن ساختمان پروتئین، گروه‌های هیدروفوب به سطح آمده و در نتیجه با افزایش برهمهای هیدروفوب- هیدروفوب تشکیل ساختارهای تجمعی^۱ تسریع می‌شوند [۴۳]. این ساختارهای تجمعی به علت دارا بودن سطح بزرگتر، نور تابیده شده را منعکس کرده که نمایانگر شاخص رنگی L^* می‌باشد. به این ترتیب، با گذشت زمان، پروتئین‌ها به طور برگشت‌ناپذیر دناتوره و باعث افزایش ساختارهای تجمعی می‌شوند که این پدیده افزایش معنی‌دار شاخص L^* با ادامه فرآیند حرارتی را توجیه می‌کند.

از سوی دیگر، با افزایش نسبت مالتودکسترنین به سرم آلبومین گاوی، شاخص L^* به صورت چشمگیری کاهش یافت ($p<0.05$). به طوری که مقادیر ۱/۷۸، ۱/۸۹ و ۳/۰۴ در نسبت‌های ۱:۵، ۱:۳ و ۱:۱ از مالتودکسترنین: سرم آلبومین برای این شاخص حاصل گردید. براساس یافته‌های میلیتلو و همکاران (۲۰۰۴) و کوسا و همکاران (۱۹۹۸) که اثر گرمادهی بر پایداری حرارتی سرم آلبومین گاوی و سیستیک تجمع آن را مورد مطالعه قرار دادند، یکی از فاکتورهای موثر بر پدیده تجمع پروتئین‌ها، غلظت پروتئین در محیط واکنش است [۴۴، ۴۵]. به طور کلی با بالا رفتن غلظت پروتئین، تعداد ساختارهای تجمعی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند بر افزایش شاخص L^* موثر باشد. علت دیگری که در تفسیر این پدیده می‌توان در نظر گرفت این است که با افزایش میزان مالتودکسترنین (نسبت ۱:۵) در محیط واکنش و به دنبال آن تسریع واکنش مایلارد، تشکیل ترکیبات مولد رنگ افزایش یافت (شکل ۳، ۲۰ نانومتر). بنابراین بخشی از نور تابیده شده به نمونه جهت اندازه‌گیری شاخص L^* جذب این ترکیبات مولد رنگ شده و از مقدار پرتو منعکس شده کاسته می‌شود که تیرگی بیشتر نمونه (کاهش شاخص L^*) را به دنبال خواهد داشت.

همانطور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود، اختلاف آماری معنی‌داری در مولفه L^* در روش‌های حرارتی مایکروویو و حمام آب دیده نشد ($p>0.05$).

۵-۳- اندازه‌گیری ثابت سرعت واکنش

روش‌های مختلف حرارتی (حمام آب و مایکروویو) و نسبت‌های مختلف ۱:۱، ۱:۳ و ۱:۵ مالتودکسترنین: سرم آلبومین گاوی اثر معنی داری بر شاخص b^* نداشتند ($p>0.05$).

به منظور بررسی سرعت واکنش گلیکوزیلاسیون سرم آلبومین گاوی، کاهش میزان آمین آزاد طی زمان توسط مدل‌های سیتیکی برآورد گردید. با برازش داده‌های آزمایشی بر مبنای معادلات ۲، ۳ و ۴ برای هر یک از روش‌های حرارت‌دهی و در نسبت‌های مختلف از مالتودکسترنین: سرم آلبومین گاوی، اطلاعات حاصل از مدل سیتیکی بدست آمده با بالاترین ضریب تبیین (R^2) در جدول شماره ۱ آورده شده است. بر این اساس، مصرف آمین آزاد طی واکنش مایلارد در هر دو روش حرارتی و در نسبت‌های مختلف از مرتبه یک تعیت می‌کند؛ به استثنای روش مایکروویو که در نسبت ۱:۵ مالتودکسترنین: سرم آلبومین گاوی، مرتبه واکنش صفر را نسبت به مصرف آمین آزاد نشان داد. این نتایج حاکی از آن است که در نسبت ۱:۵ سرعت کل واکنش وابسته به تغییر غلاظت پروتئین نمی‌باشد.

اختلاف آماری معنی دار مشاهده شده در ثابت سرعت مصرف آمین آزاد طی واکنش در گرمادهی به روش‌های حمام آب و مایکروویو، می‌تواند در اثر دو پدیده صورت گرفته باشد: ۱) طبق معادله آرنسپوس، که رابطه بین ثابت سرعت و دما را بیان می‌کند، ضریب پیش‌نمایی A نشان دهنده کل برخوردهای موثر در واحد زمان و در واحد حجم بین مولکول‌های نمونه و وابسته به فرکانس ارتعاشات مولکول‌ها در واکنش است. امواج مایکروویو می‌توانند ارتعاش مولکول‌ها را در سطح چرخشی^۱ افزایش داده و به تبع آن بر افزایش ضریب پیش‌نمایی A و در نتیجه بر ثابت سرعت واکنش موثر باشد [۴۷]. ۲) علاوه بر این، امواج مایکروویو با اثر بر انرژی آزاد فعال‌سازی ΔG منجر به تغییر ضریب پیش‌نمایی می‌شوند [۴۸]. گوان و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که سرعت مصرف آمین آزاد در واکنش مایلارد در سامانه پروتئین سویا-دکستران تحت حرارت‌دهی مایکروویو، ۵۷ برابر سرعت آن در حمام آب بوده است [۱۷].

آلبومن گاوی، تسریع در سرعت واکنش مایلارد مشاهده شد که به دنبال آن ورود به مراحل پایانی واکنش و تشکیل ترکیبات ملانوئیدینی افزایش یافت.

پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که اختلاف آماری معنی داری در مولفه^{*} a در دو روش حرارت‌دهی مایکروویو و حمام آب وجود نداشت ($p>0.05$).




Fig 6 Changing of a^* value under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.

۴-۳- مولفه^{*} b^*

مولفه^{*} b نشان دهنده میزان زرد بودن و آبی بودن نمونه می‌باشد و مقادیر مثبت (زرد) تا منفی (آبی) را شامل می‌شود. همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است، مولفه رنگی^{*} b با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافت ($p<0.05$).




Fig 7 Changing of b^* value under both MH (microwave heating) and CH (conventional heating) at 90°C during 120 min in 1:1, 1:3 and 1:5 weight ratios (W/R) of BSA: MD.

Table 1 Rate constant and reaction order of free amino group consumption during MR, under MH (Microwave heating) and CH (conventional heating), at 90 °C.

Microwave heating			Convectional heating			BSA-MD weight ratio
R ²	k	Reaction order	R ²	k ¹	Reaction order	
0.9878	0.0165±0.0018 ^b	First-order	0.9676	0.0141±0.0020 ^d	First-order	1:1
0.9793	0.0160±0.0013 ^c	First-order	0.9716	0.0140±0.0012 ^d	First-order	1:3
0.8890	0.0020±0.0002*	Zero-order	0.9530	0.0169±0.0010 ^a	First-order	1:5

1The rate constant dimension for zero and first-order reactions are mol/s and 1/s, respectively.

* This treatment was not included in statistical analysis due to different reaction order.

Mean ± standard deviations of triplicate analysis are given. Different letters indicate significant ($p < 0.05$) differences among samples.

- [3] Sorrentino, R. and G. Bianchi, *Microwave and RF engineering*. Vol. 1. 2010: John Wiley & Sons.
- [4] Kingston, H.M. and L.B. Jassie, *Introduction to microwave sample preparation: theory and practice*. 1988: American Chemical Society.
- [5] de la Hoz, A., A. Diaz-Ortiz, and A. Moreno, *Microwaves in organic synthesis. Thermal and non-thermal microwave effects*. Chemical Society Reviews, 2005. 34(2): p. 164-178.
- [6] Datta, A.K., *Handbook of microwave technology for food application*. 2 :۰۰' CRC Press.
- [7] Kato, A., *Industrial Applications of Maillard-Type Protein-Polysaccharide Conjugates*. Food Science and Technology Research, 2002. 8(3): p. 193-199.
- [8] Fennema, O.R., S. Damodaran, and K.L. Parkin, *Fennema's Food chemistry*. 2008: CRC.
- [9] Sun, W.-W., et al., *Properties of whey protein isolate-dextran conjugate prepared using pulsed electric field*. Food Research International, 2011. 44(4): p. 1052-1058.
- [10] Zhu, D., S. Damodaran, and J.A. Lucey, *Physicochemical and emulsifying properties of whey protein isolate (WPI)-dextran conjugates produced in aqueous solution*. Journal of agricultural and food chemistry, 2010. 58(5): p. 2988-2994.
- [11] Wang, W.-q., Y.-h. Bao, and Y. Chen, *Characteristics and antioxidant activity of water-soluble Maillard reaction products from interactions in a whey protein isolate and sugars system*. Food chemistry, 2013. 139(1): p. 355-361.
- [12] Xue, F., et al., *Comparative studies on the physicochemical properties of soy protein isolate-maltodextrin and soy protein isolate-*

نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر تشکیل کونژوگه مایلارد بین سرم آلبومین گاوی و مالتودکسترن را در هر دو روش حرارت دهنده تایید نمود. آزمون ارتوفنالدی آلهید نشان داد که درصد آمینهای آزاد بلوکه شده به عنوان معیاری از درصد گلیکوزیلاسیون در روش حرارت دهنده مایکروویو به طور معنی داری بیشتر از حرارت دهنده در حمام آب بود. علاوه بر این، جذب در ۴۲۰ نانومتر و در ناحیه فرابنفش نیز تایید کننده این نتایج بودند. نسبت های مختلف مالتودکسترن: سرم آلبومین گاوی تفاوت آماری معنی داری در تغییرات شاخص های رنگی L^* , a^* و b^* با یکدیگر داشتند. با این وجود، اختلاف آماری معنی داری بین روش های حرارت دهنده مایکروویو و حمام آب در شاخص های L^* , a^* و b^* مشاهده نگردید. بررسی و اندازه گیری ثابت سرعت واکنش مایلارد نشان داد که مرتبه واکنش بر اساس مصرف آمین آزاد در هر سه نسبت از پروتئین و پلی ساکارید از درجه یک می باشد، به استثنای نسبت ۱:۵ در روش مایکروویو که از مرتبه صفر پیروی می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که امواج مایکروویو می تواند منجر به افزایش سرعت واکنش مایلارد نسبت روش حرارت دهنده متناول گردد.

منابع

- [1] Gedye, R., et al., *The use of microwave ovens for rapid organic synthesis*. Tetrahedron letters, 1986. 27(3): p. 279-282.
- [2] Gedye, R.N., F.E. Smith, and K.C. Westaway, *The rapid synthesis of organic compounds in microwave ovens*. Canadian Journal of Chemistry, 1988. 66(1): p. 17-26.

- [23] Peters Jr, T., *All about albumin: biochemistry, genetics, and medical applications*. 1995: Academic press.
- [24] Roche, M., et al., *The antioxidant properties of serum albumin*. FEBS letters, 2008. 582(13): p. 1783-1787.
- [25] Rondeau, P. and E. Bourdon, *The glycation of albumin: structural and functional impacts*. Biochimie, 2011. 93(4): p. 645-658.
- [26] Khodarahmi, R., et al., *Comparative spectroscopic studies on drug binding characteristics and protein surface hydrophobicity of native and modified forms of bovine serum albumin: possible relevance to change in protein structure/function upon non-enzymatic glycation*. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2012. 89: p. 177-186.
- [27] Liu, E.-H., L.-W. Qi, and P. Li, *Structural relationship and binding mechanisms of five flavonoids with bovine serum albumin*. Molecules, 2010. 15(12): p. 9092-9103.
- [28] Gülsen, İ., et al., *Structural and functional changes in ultrasonicated bovine serum albumin solutions*. Ultrasonics Sonochemistry, 2007. 14(2): p. 173-183.
- [29] Church, F.C., et al., *Spectrophotometric Assay Using o-Phthaldialdehyde for Determination of Proteolysis in Milk and Isolated Milk Proteins*. Journal of Dairy Science, 1983. 66(6): p. 1219-1227.
- [30] Garcia-Amezquita, L., et al., *Effect of Maillard reaction conditions on the degree of glycation and functional properties of whey protein isolate-Maltodextrin conjugates*. Food Hydrocolloids, 2014. 38: p. 110-118.
- [31] Bohr, H. and J. Bohr, *Microwave-enhanced folding and denaturation of globular proteins*. Physical Review E, 2000. 61(4): p. 4310.
- [32] YEO, H. and T. SHIBAMOTO, *Effects of moisture content on the Maillard browning model system upon microwave irradiation*. Journal of agricultural and food chemistry, 1991. 39(10): p. 1860-1862.
- [33] Seo, S., et al., *Glycation of lysozyme with galactose, galactooligosaccharides and potato galactan through the Maillard reaction and optimization of the production of prebiotic glycoproteins*. Process Biochemistry ,2012 2:, (47) p. 297-304.
- [34] gum acacia conjugate prepared through Maillard reaction. Food research international, 2013. 51(2): p. 490-495.
- [13] Hodge, J.E., *Origin of flavor in foods. Nonenzymatic browning reactions*. 1967: Avi Publishing: Westport, CT.
- [14] Donald, S., L. Bronislnv, and T. Andrew, *ACrylarnide is formed in the maillard reaction*. Nature, 2002. 419: p. 448-449.
- [15] Mottram, D.S., B.L. Wedzicha, and A.T. Dodson, *Food chemistry: acrylamide is formed in the Maillard reaction*. Nature, 2002. 419(6906): p. 448-449.
- [16] Martins, S.I. and M.A. Van Boekel, *Kinetics of the glucose/glycine Maillard reaction pathways: influences of pH and reactant initial concentrations*. Food chemistry, 2005. 92(3): p. 437-448.
- [17] Guan, J.-J., et al., *Microwave improvement of soy protein isolate-saccharide graft reactions*. Food chemistry, 2006. 97(4): p. 577-585.
- [18] CHEN, S.T., et al., *Rapid hydrolysis of proteins and peptides by means of microwave technology and its application to amino acid analysis*. International journal of peptide and protein research, 1987. 30(4): p. 572-576.
- [19] Bi, W., et al., *Study on microwave - accelerated casein protein grafted with glucose and β - cyclodextrin to improve the gel properties*. International Journal of Food Science & Technology, 2015. 50(6): p. 1429-1430.
- [20] Wang, H., et al., *Comparison of glycation in conventionally and microwave-heated ovalbumin by high resolution mass spectrometry*. Food chemistry, 2013. 141(2): p. 985-991.
- [21] Zhou, C., et al., *Examining of athermal effects in microwave-induced glucose/glycine reaction and degradation of polysaccharide from Porphyra yezoensis*. Carbohydrate polymers, 2013. 97(1): p. 38-44.
- [22] Guan, J.-J., et al., *Mechanism of microwave-accelerated soy protein isolate-saccharide graft reactions*. Food Research International, 2011. 44(9): p. 2647-2654.

- [42] Clark, A., G. Kavanagh, and S. Ross-Murphy, *Globular protein gelation—theory and experiment*. Food Hydrocolloids, 2001. 15(4): p. 383-400.
- [43] Van Stokkum, I., et al., *Temperature-induced changes in protein structures studied by Fourier transform infrared spectroscopy and global analysis*. Biochemistry, 1995. 34(33): p. 10508-10518.
- [44] Kosa, T., T. Maruyama, and M. Otagiri, *Species differences of serum albumins: II. Chemical and thermal stability*. Pharmaceutical research, 1998. 15(3): p. 449-454.
- [45] Militello, V., et al., *Aggregation kinetics of bovine serum albumin studied by FTIR spectroscopy and light scattering*. Biophysical chemistry, 2004. 107(2): p. 175-187.
- [46] Agoston, G.A ., *Color theory and its application in art and design*. Vol. 19. 2013: Springer.
- [47] Langa, F., et al., *Microwave irradiation: more than just a method for accelerating reactions*. Contemporary organic synthesis, 1997. 4(5): p. 373-386.
- [48] Berlan, J., et al ., *Organic-synthesis in microwave field-1st example of specific activation under homogeneous conditions*. Tetrahedron letters, 1991. 32(21): p. 2363-2366.
- [34] Zhuo, X.Y., et al., *Formation of soy protein isolate–dextran conjugates by moderate Maillard reaction in macromolecular crowding conditions*. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013. 93(2): p. 316-323.
- [35] Zhang ,X., et al., *Characterization of soy β -conglycinin–dextran conjugate prepared by Maillard reaction in crowded liquid system*. Food Research International, 2012. 49(2): p. 648-654.
- [36] Nursten, H.E., *The Maillard reaction: chemistry, biochemistry, and implications*. 2005: Royal Society of Chemistry.
- [37] Labuza, T.P., et al., *Maillard reactions in chemistry, food and health*. 1998: Elsevier.
- [38] Akagawa, M., T. Sasaki, and K. Suyama, *Oxidative deamination of lysine residue in plasma protein of diabetic rats*. European Journal of Biochemistry, 2002. 269(22): p. 5451-5458.
- [39]. Tu, Z.-c., et al., *Microwave heating enhances antioxidant and emulsifying activities of ovalbumin glycated with glucose in solid-state*. Journal of Food Science and Technology, 2013: p. 1-9.
- [40] Hodge, J.E., *Dehydrated foods, chemistry of browning reactions in model systems*. Journal of agricultural and food chemistry, 1953. 1(15): p. 928-943.
- [41] Ajandouz, E., et al., *Effects of pH on Caramelization and Maillard Reaction Kinetics in Fructose - Lysine Model Systems*. Journal of Food Science, 2001. 66(7): p. 926-931.

Evaluation of Maillard Reaction Progression through Microwave and Conventional Heating in Bovine Serum Albumin- Maltodextrin System

Nasrollahzadeh, F. ¹, Varidi, M. ^{2*}, Koocheki, A. ³, Hadizadeh, F. ⁴

1. M.Sc. student, Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2. Assistant professor (Ph.D), Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3. Associate professor (Ph.D), Department of Food Science and Technology, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4. Professor, Medicinal Chemistry Department, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

(Received: 2016/05/02 Accepted: 2016/09/11)

Microwave heating as a widely used method in food industry considered to have non-thermal effects in addition to thermal impacts on food. For examining this hypothesis, Maillard reaction as a pervasive reaction in food processing was evaluated in Microwave (MH) and conventional (CH) heating under well controlled condition. The glycation process was carried out in bovine serum albumin (BSA) – Maltodextrin model system with three different weight ratios (1:1, 1:3 and 1:5) for 15, 30, 60, 90 and 120 min at 90 °C. The extent of glycation was assessed by *ortho*-phthalodialdehyde assay (OPA), *Abs* 420, *Abs* 294 and CIE *L**, *a** and *b** parameters. Statistical analysis showed MH was much more influential in reduction of free amino groups and increase in *Abs* 420 and *Abs* 294 than CH ($p<0.05$). The least and the greatest glycation percent were observed about 9% in CH during 15 min, and 66.65% by MH in 120 min, respectively. The value of *L** and *a** increased in the time of heating. However, dramatic difference between MH and WH was not seen in these parameters ($p>0.05$). It showed that graft reactions under MH were much faster than those by WH and microwave can accelerate the rate of Maillard reaction.

Key words: Maillard reaction, Microwave heating, Conventional heating, Bovine Serum Albumin, Maltodextrin

* Corresponding Author E-Mail Address: m.varidi@um.ac.ir,