



مقاله علمی- پژوهشی

## بهینه‌سازی ریزازدیادی مامیران (*Chelidonium sp.*) و بررسی میزان فنول تام در اندام‌های مختلف آن در شرایط درون‌شیشه‌ای

مسعود قاسمی<sup>۱</sup> - حسین آرویی<sup>۲\*</sup> - پژمان آزادی<sup>۳</sup> - آتوسا علی احمدی<sup>۴</sup>

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

### چکیده

مامیران (*Chelidonium sp.*) دارای رویشگاه‌های محدودی در ایران است. این گیاه حاوی مقدار زیادی متابولیت‌های ثانویه نظیر آلکالوئیدهای ایزو کینولین و ترکیبات فنولی می‌باشد. هدف از این تحقیق، بهینه‌سازی ریزازدیادی و مقایسه فنول تام موجود در برگ، ساقه و ریشه گیاهچه‌های آن است. آزمایش به صورت طرح پایه کاملاً تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. در این تحقیق ابتدا اثر سایتوکینین‌های BAP در غلظت‌های صفر، ۰/۵، ۱، ۱/۵، ۲ میلی‌گرم در لیتر و TDZ در غلظت‌های صفر، ۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ میلی‌گرم در لیتر بررسی شد. سپس بهترین تیمار سایتوکینین از نظر درصد باززایی به صورت ترکیب با یکی از اکسین‌های IBA و NAA در غلظت‌های ۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ میلی‌گرم در لیتر ارزیابی شد. شاخه‌های باززایی شده به منظور ریشه‌زایی بر روی محیط کشت‌های MS حاوی ۳ گرم در لیتر زغال فعال با تیمارهای IBA، NAA و IAA در غلظت‌های صفر، ۰/۵، ۱ و ۲ میلی‌گرم در لیتر کشت شدند. سپس گیاهچه‌های ریشه‌دار شده سازگار شدند. برای اندازه‌گیری میزان فنول تام از روش فولین استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین پرآوری در تیمار ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ با میانگین ۸/۱۲ عدد شاخه بدست آمد. در این مطالعه محیط کشت MS حاوی ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر IBA، مناسب‌ترین تیمار به منظور ایجاد ریشه تشخیص داده شد. همچنین نتایج نشان داد، میزان فنول تام برگ بیشتر از ساقه و ریشه است.

واژه‌های کلیدی: پرآوری، ریزازدیادی، فنول تام، مامیران

### مقدمه

ترکیبات فنولی می‌باشد (۱۵). کشت بافت گیاهی استفاده گسترده‌ای دارد که از جمله کاربردهای آن می‌توان به ریزازدیاری گونه‌های گیاهی که تکثیر طبیعی آنها مشکل است، ایجاد تنوع سوماکلونال و بهره‌گیری از خصوصیات مفید بدست آمده در برنامه‌های اصلاحی و بهره‌گیری از این تکنیک در فرآیند مهندسی ژنتیک و حفاظت از ذخایر ژنتیکی اشاره نمود (۱۰). پیرامون باززایی مستقیم گیاه مامیران و اندازه‌گیری فنول تام اندام‌های گیاهچه مامیران گزارش‌های اندکی وجود دارد. مطالعاتی در مورد باززایی و اندازه‌گیری میزان فنول تام اندام‌های گیاهچه‌های مامیران و برخی گیاهان دارویی انجام شده است که به طور نمونه می‌توان به آنها اشاره نمود: اسفندیار و همکاران (۸)، بیشترین باززایی و تولید برگ را در گیاه مامیران از کالوس‌های کشت شده در محیط MS حاوی ۲ میلی‌گرم در لیتر BAP و ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر 2,4-D بدست آوردند. شائیک و همکاران (۲۱)، بیشترین تعداد شاخه باززایی شده را از میانگیره خیار

مامیران با نام علمی *Chelidonium majus* L. و با نام لاتین Greater celandine از تیره خشخاش (Papaveraceae)، در گستره وسیعی از آسیا و اروپا رویش دارد. نمونه‌هایی از این گیاه در استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان مشاهده شده است (۱۴). گیاه مامیران خاصیت ضد میکروبی، ضد سرطانی و ضد التهابی دارد (۶). این گیاه دارای مقدار زیادی متابولیت‌های ثانویه آلکالوئیدهای ایزو کینولینی از جمله کلیدونین<sup>۳</sup>، سنگوئینارین<sup>۴</sup>، کپتسین<sup>۵</sup>، بربرین<sup>۶</sup> و

۱ و ۲- به ترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(\*- نویسنده مسئول: Email: aroiee@um.ac.ir)

۳- استادیار، گروه مهندسی ژنتیک، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

۴- استادیار، گروه بیولوژی، پژوهشگاه گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید

بهشتی

و TDZ در غلظت‌های صفر، ۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ میلی‌گرم در لیتر کشت شدند. پس از بررسی درصد باززایی، بالاترین تیمار هورمونی از نظر درصد باززایی به صورت ترکیب با یکی از اکسین‌های IBA و NAA در غلظت‌های ۰/۲۵، ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ میلی‌گرم در لیتر کشت شدند. شاخه‌های باززایی شده به منظور ریشه‌زایی بر روی محیط‌های MS حاوی ساکارز ۳۰ گرم در لیتر و ۳ گرم در لیتر زغال‌فعال با تیمارهای IBA، NAA و IAA در غلظت‌های (صفر، ۰/۵، ۱/۵ و ۲ میلی‌گرم در لیتر) واگشت شدند. یک ماه پس از کشت، صفات تعداد شاخه، طول شاخه و شاخص ظرفیت تشکیل شاخه، تعداد ریشه و طول ریشه گیاهچه‌های مامیران محاسبه شد. شاخص ظرفیت تشکیل شاخه طبق فرمول ذیل بدست آورده شد:

$$\text{شاخه} = \frac{100}{\text{میانگین تعداد شاخه در هر ریز نمونه}} \times (\text{درصد تشکیل شاخه}) = \text{شاخص ظرفیت تشکیل شاخه}$$

#### مرحله سازگاری

گیاهان ریشه‌دار با آب ولرم شستشو داده شده و در گلدان با قطر دهانه ۷ سانتی‌متر که ترکیبی از کوکوپیت، پرلیت، پیت ماس با نسبت‌های مختلف پر شده بودند، قرار داده شدند (جدول ۱). گلدان‌ها با مقدار کمی آب مقطر مه‌پاشی و به منظور حفظ رطوبت، روی گلدان‌ها با سرپوش پلاستیکی پوشانده شده و به اتاقک رشد با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و شرایط ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی منتقل شدند. برای انجام سازگاری تدریجی روزی یکبار سرپوش را برداشته و اندکی مه‌پاشی انجام شد. پس از دو هفته به منظور سازگار شدن گیاهان با محیط بیرون منافذی در سرپوش ایجاد شد تا اینکه سرپوش‌ها به طور کامل برداشته و بعد از دو هفته گیاهان به گلخانه با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۵۰ درصد انتقال یافتند و درصد سازگاری بعد از یک ماه محاسبه شد.

جدول ۱- بسترهای کشت مورد استفاده به منظور سازگاری گیاهچه‌های مامیران

Table 1- Media used for acclimatization of *Chelidonium majus* L. plantlets

بستر	نسبت اجزای بسترهای کشت		
	کوکوپیت	پرلیت	پیت ماس
Medium	Cocopeat	Perlite	Peat moss
A	2	1	-
B	1	1	1
C	1	2	1
D	1	1	-
E	-	1	1

چنبر تلخ (*Momordia charanti*) در محیط کشت پایه MS حاوی ۲ میلی‌گرم در لیتر TDZ و بیشترین ریشه‌زایی را در غلظت ۳ میلی‌گرم در لیتر IBA گزارش نمودند. باقل و بانسال (۲)، بیشترین تعداد شاخه را از جوانه انتهایی گیاه دان سیاه (*Guizotia absinica*) را در محیط حاوی ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ بدست آوردند. صدیقی و همکاران (۲۰) نشان دادند که تولید ترکیبات فنولی در گل آذین‌های انگور در غلظت ۲ و ۴ میکرومولار هورمون بنزیل آمینوپورین در ترکیب با ۴/۹ میکرومولار ایندول بوتیریک اسید کاهش یافت و در محیط عاری از هورمون، تولید ترکیبات فنولی در گل آذین انگور افزایش یافت. مامیران دارای رویشگاه‌های محدودی در ایران است. به همین دلیل ریزازدیاری می‌تواند روش مؤثری برای تکثیر سریع و انبوه و حفاظت از آن محسوب شود که منجر به تولید گیاهان با یکنواختی بالا می‌شود. در پژوهش حاضر تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی مستقیم گیاه مامیران بررسی شده است تا ضمن بهینه‌سازی کشت درون شیشه‌ای آن بستر مناسب برای انجام سایر پژوهش‌ها نظیر انتقال ژن و نیز افزایش کمیت و کیفیت مواد مؤثره از طریق دست‌ورزی ژنتیکی فراهم شود. همچنین مقدار فنول تام اندام‌های گیاهچه‌های مامیران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

#### مواد و روش‌ها

##### آماده‌سازی مواد گیاهی و شرایط کشت

به منظور بررسی اثر برخی تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی گیاه دارویی مامیران، بذور این گیاه از ارتفاعات شیطان کوه لاهیجان جمع‌آوری شدند (شکل ۸-۱). سپس با هدف از بین بردن آلودگی در ابتدا بذور با آب مقطر دارای چند قطره توتین شسته شده، سپس با الکل ۷۰ درصد به مدت یک دقیقه و با آب مقطر دوبار شستشو داده شدند. سپس با هیپوکلریت سدیم یک درصد به مدت پنج دقیقه، ضدعفونی شده و مجدداً با آب مقطر در سه مرحله زمانی ۵، ۱۵ و ۱۸۰ دقیقه زیر هودلامینار شستشو داده شدند و بعد از مراحل آلودگی‌زدایی، در محیط MS دارای ۳۰ گرم بر لیتر ساکارز و ۳ گرم در لیتر زغال‌فعال و ۸ گرم در لیتر آگار که pH محیط آن بر روی ۵/۸ تنظیم شده بود کشت شدند (۸). سپس تمامی کشت‌ها در اتاقک رشد در شرایط دمایی ۲۵±۲ درجه سانتی‌گراد و طول روز ۱۶ ساعت و ۸ ساعت تاریکی نگهداری شدند.

##### پراوری و ریشه‌زایی

برای مطالعه پراوری از گیاهچه‌های درون شیشه‌ای (شکل ۸-۲)، میانگروهایی به طول ۲/۵ سانتی‌متر، در محیط‌های MS حاوی ساکارز ۳۰ گرم در لیتر و ۳ گرم در لیتر زغال‌فعال و با تیمارهای هورمونی BAP در غلظت‌های صفر، ۰/۵، ۱، ۱/۵، ۲ میلی‌گرم در لیتر

## استخراج عصاره

ابتدا نمونه‌های برگ، ریشه و ساقه خشک شده با آسیاب به صورت پودر در آمدند. برای استخراج، ۵ گرم نمونه گیاهی توزین نموده و سپس، پنج میلی‌لیتر متانول به آن اضافه نموده و مخلوط حاصل به مدت ۲۰ دقیقه در حمام التراسونیک قرار گرفت. سپس عصاره‌ها توسط کاغذ صافی صاف شده و سپس توسط دستگاه روتاری تغلیظ شدند، و در نهایت بر روی عصاره‌های خشک شده متانول ریخته تا در نهایت عصاره‌های ۱۰۰ ppm از آن‌ها تهیه شد (۵).

## تعیین مقدار فنول تام در گیاهچه‌های درون شیشه‌ای

برای اندازه‌گیری مقدار فنول تام برگ، ساقه و ریشه گیاهچه‌های درون شیشه‌ای مامیران از روش فولین<sup>۱</sup> استفاده شد. به همین منظور، یک میلی‌لیتر از عصاره یا محلول استاندارد گالیک اسید (۱۰۰، ۸۰، ۴۰، ۲۰ میلی‌گرم در لیتر) به چاهک‌های دارای نه میلی‌لیتر آب مقطر دو بار تقطیر شده و یک میلی‌لیتر فولین افزوده شدند. بعد از پنج دقیقه، ده میلی‌لیتر محلول سدیم کربنات ۷ درصد به چاهک‌ها افزوده گردید. در نهایت پلیت الیزای حاوی محلول به مدت نود دقیقه در دمای اتاق روی شیکر تکان داده شد. سپس جذب آن روی طول موج ۷۵۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد. این آزمایش در ۳ تکرار انجام گردید (۵).

## تجزیه و تحلیل آماری

آزمایش‌های مربوط به پرآوری و ریشه‌زایی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با ۴ تکرار برای هر تیمار که هر تکرار حاوی ۴ ریز نمونه بود انجام شد. مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) در سطح احتمال ۵ درصد انجام و نمودارها توسط نرم افزار EXCEL رسم شدند.

## نتایج و بحث

### تعداد شاخه گیاهچه مامیران

نتایج حاصل از بررسی اثرات هورمون‌ها، شاخه‌زایی گیاهچه مامیران در کشت درون شیشه‌ای نشان داد که هورمون TDZ در مقایسه با سایر هورمون‌ها از کارآمدی و اثرگذاری بیشتری بر شاخه‌زایی برخوردار بود. همان‌گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون TDZ بر صفت شاخه‌زایی مامیران در سطح احتمال یک

درصد معنی‌دار است. همچنین برای صفت شاخه‌زایی، تیمار ۰/۵ میلی گرم در لیتر TDZ با میانگین ۸/۱۲ شاخه در گیاهچه، بالاترین شاخه‌زایی را از خود نشان داد (شکل ۸-D) که با غلظت ۰/۲۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ اختلاف معنی‌داری نداشت که دلیل این امر این است که TDZ در غلظت‌های پایین تعداد شاخه زیادی تولید می‌کند (۱۷). کمترین شاخه‌زایی نیز مربوط به محیط شاهد بود. با افزایش میزان هورمون TDZ، شاخه‌زایی کاهش یافت. به طوری که در غلظت ۱ میلی‌گرم در لیتر TDZ، میانگین شاخه‌زایی به ازای هر نمونه ۴ عدد شاخه در ریزنمونه بود. همچنین بهترین تیمار TDZ توانایی ۱۰۰ درصد شاخه‌زایی را نسبت به شاهد داشت. مطالعات انجام شده توسط فیصل و همکاران (۹) نشان داد که هورمون TDZ با غلظت ۱/۱ میلی‌گرم در لیتر بر روی ریزنمونه‌های گره، بهترین نتیجه را برای شاخه‌زایی روولفیا آدر بین غلظت‌های ۲/۲ تا ۰/۱۱ میلی‌گرم در لیتر بوده که صحت نتایج این تحقیق را تایید می‌نماید. در مطالعه احمد و همکاران (۱) بر روی پرآوری ریزنمونه‌های گره فلفل دلمه‌آ، بیشترین تعداد شاخه در محیط کشت حاوی ۰/۲۲ میلی‌گرم در لیتر TDZ بدست آمد که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد. در تحقیقی حسین و همکاران (۱۱) با استفاده از غلظت ۰/۰۸۸ میلی‌گرم در لیتر، بیشترین درصد باززایی در گیاه کینو<sup>۴</sup> در گره‌های کوتیلدونی را از بین غلظت‌های ۲/۲ تا ۰/۰۲۲ میلی‌گرم در لیتر TDZ بدست آوردند. که صحت نتایج این تحقیق را اثبات می‌کند. اثر هورمون BAP بر شاخه‌زایی گیاهچه مامیران نیز نشان داد، بیشترین شاخه‌زایی در تیمار ۱ میلی‌گرم در لیتر این هورمون با میانگین ۵/۱۸ ایجاد شد که با غلظت ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر اختلاف معنی‌دار داشت. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون BAP بر صفت شاخه‌زایی مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. همچنین ترکیب ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ با اکسین‌های IBA و NAA تأثیر کمتری بر شاخه‌زایی مامیران داشت (شکل ۱). به طوری که در ترکیب ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ به همراه ۱ میلی‌گرم در لیتر IBA میانگین شاخه‌زایی ۰/۵ بود.

### طول شاخه گیاهچه مامیران

مقایسه نتایج حاصل از اثر غلظت‌های مختلف هورمون‌های مورد بررسی در این تحقیق بر روی افزایش رشد طولی شاخه گیاهچه مامیران نشان داد که هورمون BAP، مناسب‌ترین هورمون به منظور افزایش طول شاخه در مقایسه با هورمون‌های دیگر می‌باشد. اثر

۲- *Rauwolfia tetraphylla*

3- *Capsicum annum*

4- *Kino*

1- Folin

BAP با میانگین ۴ و ۳/۷ سانتی‌متر، بیشترین میانگین طول را نشان داد و در یک گروه قرار گرفتند (شکل ۲)، همچنین با کاهش غلظت این هورمون، طول شاخه به حدود ۳/۳ سانتی‌متر، به میزان ۱۷ درصد کاهش داشت.

غلظت‌های مختلف هورمون BAP، بر روی رشد طولی شاخه نشان داد که بلندترین شاخه‌ها در تیمار ۲ میلی‌گرم در لیتر این هورمون ایجاد شد و مقایسه میانگین‌ها اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای ۲ و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر BAP در سطح احتمال پنج درصد نشان نداد و در بین تیمارهای مورد آزمون، تیمارهای ۲ و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر



جدول ۲- تجزیه واریانس شاخه‌زایی گیاه مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم‌کننده‌های رشد

Table 2- ANOVA for *Chelidonium majus* L. shoot proliferation at different concentrations of PGRs

منابع تغییرات Sources of variation	درجه آزادی DF	میانگین مربعات Mean of squares
تیمار TDZ TDZ treatment	4	40.14**
خطای آزمایش Error	15	0.57
کل Total	19	
تیمار BAP BAP treatment	4	14.96**
خطای آزمایش Error	15	1.08
کل Total	19	
تیمار 0.5 TDZ+IBA 0.5 TDZ+IBA treatment	3	34.73**
خطای آزمایش Error	12	0.79
کل Total	15	
تیمار 0.5 TDZ+NAA 0.5 TDZ+NAA treatment	3	11.05**
خطای آزمایش Error	12	0.24
کل Total	15	

بدست آمد که با نتایج مالیک و همکاران (۱۶) که بر روی ریزازدیادی گیاه گارسینی<sup>۲</sup> مطالعه کردند و نشان دادند که هورمون BAP بیشترین نقش را در افزایش رشد طولی شاخه دارد همخوانی دارد و هر دو نتایج این تحقیق را تایید می‌کند. بیشترین رشد طولی در مامیران در میان تیمارهای TDZ، تیمار ۱ میلی‌گرم در لیتر TDZ با میانگین ۲/۹ سانتی‌متر و در تیمارهای TDZ ترکیب با اکسین‌ها، تیمار ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ به همراه ۱ میلی‌گرم در لیتر IBA، با میانگین ۳/۶ بیشترین رشد طولی را به خود اختصاص دادند. همچنین تیمارهای TDZ ترکیب با NAA تأثیر کمتری بر افزایش رشد طولی شاخه داشتند.


هورمون TDZ تأثیر کمتری بر رشد طولی شاخه نشان داد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون TDZ و همچنین ترکیب آنها با اکسین‌ها بر صفت طول شاخه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. در تحقیق حسین و همکاران (۱۱) در گره‌های کوتیلدونی کینو با افزایش غلظت TDZ از رشد طولی شاخه کاسته شد و بیشترین رشد طولی شاخه در غلظت ۱/۱۲ میلی‌گرم بر لیتر BAP حاصل شد که صحت نتایج این تحقیق را اثبات می‌کند. در مطالعه‌ای راجسواری و پالیوال (۱۹) بر روی گره کوتیلدونی گل<sup>۱</sup> ابریشم با استفاده از غلظت‌های مختلف بنزیل آمینوپورین و آدنین و کینتین، بیشترین رشد طولی شاخه در غلظت ۲/۲۵ میلی‌گرم در لیتر BAP و ۱/۳۵ میلی‌گرم در لیتر آدنین



شکل ۱- مقایسه میانگین شاخه‌زایی مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد سایتوکینین و اکسین

(الف)- اثر سایتوکینین TDZ و BA. (ب)- محیط حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر TDZ به همراه غلظت‌های مختلف IBA و NAA

**Figure 1- Means comparison of *Chelidonium majus* L. shoot proliferation at different concentrations of cytokinin and auxin**  
 A) Effect of media containing TDZ and BA B) The medium contains 0.5 mg L<sup>-1</sup> TDZ with various concentrations of IBA and NAA.  
 (LSD,  $p \leq 0.05$ )



شکل ۲- مقایسه میانگین رشد طولی شاخه مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد اکسین و سایتوکینین

(الف) - اثر غلظت‌های مختلف سیتوکینین TDZ و BA. (ب) - محیط حاوی ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ به همراه غلظت‌های مختلف IBA و NAA

**Figure 2- Means comparison of shoot elongation of *Chelidonium majus* L. at different concentrations of cytokinin and auxin**  
 A) Effect of media containing TDZ and BA. B) The medium contains 0.5 mg L<sup>-1</sup> TDZ with various concentrations of IBA and NAA.  
 (LSD,  $p \leq 0.05$ )



غلظت ۲/۲ میلی‌گرم در لیتر TDZ، بالاترین شاخص ظرفیت تشکیل شاخه را در میان هورمون‌ها دارد. همچنین در بررسی‌های بختیار و همکاران (۳) با استفاده از غلظت‌های ۲/۹۷-۰/۴۸۴ میلی‌گرم در لیتر TDZ موفق به شاخه‌زایی از میانگره‌های گیاه آویشن ایرانی<sup>۲</sup> شدند و غلظت ۰/۹۹ میلی‌گرم در لیتر TDZ، بالاترین شاخص ظرفیت تشکیل شاخه را نشان دادند که نتایج این تحقیق را اثبات می‌کند. غلظت ۲ میلی‌گرم در لیتر BAP بعد از تیمارهای شاهد در مامیران کمترین شاخص ظرفیت تشکیل شاخه را با میانگین ۰/۶۲ شاخه دارد. از طرف دیگر تیمارهای ترکیبی TDZ با اکسین‌ها، تیمار ۰/۵

#### شاخص ظرفیت تشکیل شاخه گیاهچه مامیران

نتایج حاصل از تیمارهای شاخه‌زایی گیاهچه مامیران نشان داد که تیمار ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ در میان هورمون‌ها، بیشترین شاخص ظرفیت تشکیل شاخه را با میانگین ۸/۱۲ داد که با تیمارها ۰/۲۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ، اختلاف معنی‌داری ندارد (شکل ۳). نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون TDZ بر صفت شاخص ظرفیت تشکیل شاخه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. بررسی‌های کاروپاسامی و کالیموتو (۱۳)، بر روی گره‌های گیاه آندروگرافیس<sup>۱</sup> نیز نشان داد که

میلی گرم TDZ، ۱۵ درصد شاخص ظرفیت تشکیل شاخه‌اش کاهش یافت.

میلی گرم TDZ با ۰/۲۵ IBA بالاترین شاخص ظرفیت شاخه را با ۶/۸۷ نشان داد که این تیمار در مقایسه با ۰/۵



شکل ۳- مقایسه میانگین شاخص ظرفیت تشکیل شاخه مامیران در غلظت‌های تنظیم کننده‌های رشد مختلف

(الف)- اثر غلظت‌های مختلف سیتوکینین TDZ و IBA. (ب)- محیط حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر TDZ به همراه غلظت‌های مختلف IBA و NAA

**Figure 3-** Means comparison of shoot-forming capacity index of *Chelidonium majus* L. at different PGRs concentration  
A) Effect of media containing TDZ and BA. B)-The medium contains 0.5 mg L<sup>-1</sup> TDZ with various concentrations of IBA and NAA. (LSD,  $p \leq 0.05$ )


تجزیه واریانس (جدول ۳) نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون IBA بر صفت تعداد ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است.

تعداد ریشه گیاهچه مامیران

نتایج حاصل از تیمارهای ریشه‌زایی گیاهچه مامیران با استفاده از اکسین‌های IBA، NAA و IAA نشان داد که هورمون IBA بهترین تاثیر را در افزایش تعداد ریشه تولیدی در بردارد. نتایج جدول

جدول ۳- نتایج تجزیه واریانس تعداد ریشه گیاه مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم کننده رشد اکسین  
Table 3- ANOVA for root number of *Chelidonium majus* L. at different concentrations of auxin PGRs

منابع تغییرات Sources of variation	درجه آزادی DF	میانگین مربعات Mean of squares
تیمار IBA IBA treatment	4	21.82**
خطای آزمایش Error	15	0.35
تیمار NAA NAA treatment	4	11.95**
خطای آزمایش Error	15	0.4
تیمار IAA IAA treatment	4	5.92**
خطای آزمایش Error	15	0.3



شکل ۴- مقایسه میانگین تعداد ریشه مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد اکسین

Figure 4- Means comparison of *Chelidonium majus* L. root number at different plant growth regulators concentrations of auxin (LSD,  $p \leq 0.05$ )

موثرترین غلظت برای افزایش تعداد ریشه این گیاه اعلام شد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. همچنین اثرات مثبت IBA به منظور ریشه‌زایی برخی گیاهان خانواده چتریان نظیر واناسوشاوا توسط کاروپاسامی و همکاران (۱۲)، شویدآ توسط شارما و همکاران (۲۲) گزارش شده که با نتایج این تحقیق نیز مشابهت دارد. بررسی اثر هورمون NAA بر تعداد ریشه گیاهچه مامیران (شکل ۴) نشان داد که بیشترین تعداد ریشه در تیمار ۲ میلی‌گرم در لیتر این هورمون با ۴/۲۵ عدد ریشه بوجود آمد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان

همچنین برای صفت تعداد ریشه تیمار ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر IBA با ۶ عدد ریشه در گیاهچه، بالاترین ریشه‌زایی را از خود نشان داد (شکل ۸- E) که با تیمار ۲ میلی‌گرم در لیتر IBA، اختلاف معنی‌داری نداشت. کمترین تعداد ریشه مربوط به تیمار شاهد بود. بهترین غلظت IBA برای ریشه‌زایی گیاهچه مامیران توانایی ۱۰۰ درصد ریشه‌زایی را نسبت به تیمار شاهد داشت. در بررسی انای (۱۸) در باززایی مستقیم گیاه پسته<sup>۱</sup> از گره‌هایش، از بین غلظت‌های ۰ تا ۳/۹۷ میلی‌گرم در لیتر IBA، غلظت ۱/۹۸ میلی‌گرم در لیتر بهترین و




۳/۲۵ ریشه بدست آمد. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون IAA بر صفت تعداد ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است.

می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر صفت تعداد ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. همچنین بررسی اثر هورمون IAA بر تعداد ریشه گیاهچه مامیران، نشان داد که بیشترین تعداد ریشه در تیمار ۱ میلی‌گرم در لیتر IAA با میانگین


جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس طول ریشه گیاه مامیران در غلظت‌های متفاوت تنظیم‌کننده‌های رشد اکسین  
Table 4- ANOVA for root length of *Chelidonium majus* L. at different concentrations of auxins

منابع تغییرات Sources of variation	درجه آزادی DF	میانگین مربعات Mean of squares
تیمار IBA IBA treatment	4	2.55**
خطای آزمایش Error	15	0.26
تیمار NAA NAA treatment	4	0.95**
خطای آزمایش Error	15	0.04
تیمار IAA IAA treatment	4	0.53**
خطای آزمایش Error	15	0.04




شکل ۵- مقایسه میانگین طول ریشه مامیران در غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد

Figure 5- Means comparison of *Chelidonium majus* L. length root at different concentrations of PGRs (LSD,  $p \leq 0.05$ )



شکل ۶- مقایسه میانگین اثر ترکیب‌های مختلف بسترهای کشت بر سازگاری گیاهچه‌های مامیران

Figure 6- Mean comparison of the effect of different combinations of media on plantlets *Chelidonium majus L.* acclimatization (LSD,  $p \leq 0.05$ )




شکل ۷- مقایسه میانگین فنول تام اندام‌های مختلف مامیران

Figure 7- Mean comparison of total phenol content of various *Chelidonium majus L.* organs. (LSD,  $p \leq 0.05$ )

میلی‌گرم در لیتر IBA، اختلاف معنی‌داری نداشت (شکل ۵). نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول ۴) نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون IBA بر صفت طول ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. همچنین مشاهدات نشان می‌دهد که در بین غلظت‌های NAA بررسی شده، بیشترین رشد طولی ریشه در تیمار ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر NAA با میانگین ۱/۳ سانتی‌متر بدست آمد.

#### طول ریشه گیاهچه مامیران

نتایج حاصل از بررسی اثرات غلظت‌های مختلف هورمون‌ها بر افزایش رشد طولی ریشه گیاهچه مامیران نشان داد که هورمون IBA، بیشترین افزایش رشد طولی ریشه را در مقایسه با هورمون‌های دیگر دارد. اثر غلظت‌های هورمون IBA بر رشد طولی ریشه نشان داد که بیشترین رشد طولی ریشه در تیمار ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر این هورمون با میانگین رشد طولی ۲ سانتی‌متر حاصل شده که با غلظت ۱



شکل ۸- تکثیر درون شیشه‌ای مامیران

(A) گیاهان انتخاب شده به منظور جمع‌آوری بذر از ارتفاعات شیطان کوه لاهیجان (B) تولید گیاهچه‌های درون شیشه‌ای از بذور در محیط کشت MS دارای ۳ گرم در لیتر زغال فعال (C) تولید گیاهچه‌های درون شیشه‌ای بعد از ۳ ماه. (D) پرآوری شاخه در محیط کشت MS دارای ۳ گرم در لیتر زغال فعال و ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ بعد از یک ماه (E) ریشه‌زایی در محیط کشت MS دارای ۳ گرم در لیتر زغال فعال و ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر IBA بعد از یک ماه (F) سازگاری ۸۵ درصد گیاهچه‌های درون شیشه‌ای در بستر کشت ۲ : ۱ : ۰ پیت ماس، پرلیت و کوکوپیت

Figure 8- *In vitro* propagation of *Chelidonium majus* L.

A) Selected plants for seeds collection from the Shaytan kooH in Lahijan elevations. B) Production of *in vitro* plantlets from seeds in MS medium containing 3 g L<sup>-1</sup> activated charcoal. C) Production of *in vitro* plantlets after 3 months. D) Shoot proliferation in MS medium containing 3 g L<sup>-1</sup> activated charcoal and 0.5 mg L<sup>-1</sup> TDZ after 1 month. E) Rooting in MS medium containing 3 g L<sup>-1</sup> activated charcoal and 1.5 mg L<sup>-1</sup> IBA after 1 month. F) Acclimatization of 85% *in vitro* plantlets in 0: 1:2 peat moss perlite and cocopeat medium

میزان فنول تام در برگ یافت شد. همچنین در مطالعه دیگر چاوان و همکاران (۵) بر روی گیاه سروپچیا<sup>۳</sup> یافتند که بالاترین مقدار فنول تام در برگ‌ها وجود دارد که با این تحقیق مطابقت دارد.

### نتیجه‌گیری

در این پژوهش دستورالعمل ریزازدیادی گیاه دارویی مامیران با بیشترین تعداد شاخه در محیط کشت MS دارای ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر TDZ بدست آمد. و با افزایش میزان هورمون TDZ، شاخه‌زایی کاهش یافت. به طوری که در غلظت ۱ میلی‌گرم در لیتر TDZ، میانگین شاخه‌زایی به ازای هر نمونه ۴ عدد شاخه در ریزنمونه بود. و همچنین بیشترین تعداد ریشه در محیط کشت MS حاوی ۱/۵ میلی‌گرم در لیتر IBA بدست آمد. و بررسی میزان فنول تام بخش‌های گیاهچه‌های مامیران نشان داد که برگ مامیران در مقایسه با ساقه و ریشه دارای میزان بالاتر (۱۲۰/۹۶ میلی‌گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) و ریشه دارای کمترین مقدار فنول تام (۱۰/۹۹ میلی‌گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) در مقایسه با دو بافت دیگر بود با توجه به این نتایج، این روش می‌تواند به عنوان روشی کارآمد برای تولید تجاری این گونه با ارزش در شرایط درون شیشه‌ای معرفی گردد.

علاوه بر این نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که اثر غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر صفت طول ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. علاوه بر این غلظت‌های IAA بررسی شده، بیشترین رشد طولی ریشه در غلظت‌های ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر با میانگین ۱ سانتی‌متر بدست آمد و نتایج جدول تجزیه واریانس حاکی از معنی‌دار بودن اثر غلظت‌های مختلف هورمون IAA بر صفت طول ریشه مامیران در سطح احتمال یک درصد است. همچنین کمترین رشد طولی در تیمارهای شاهد مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت‌های IBA در محیط‌های MS ۱/۲ و MS توسط تیماری و همکاران (۲۳) بر روی آب بشقابی<sup>۱</sup> مشخص شد که بالاترین تعداد و طول ریشه در غلظت ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر IBA ایجاد شد. و در مطالعه دیگر توسط بانرجی و همکاران (۴) در گیاه آب بشقابی، بیشترین تأثیر در ریشه‌زایی را هورمون IBA داشت و در عین حال کمترین تأثیر را هورمون IAA نشان داد که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

### مرحله سازگاری

به منظور سازگاری از نسبت‌های مختلف کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس استفاده شد و نتایج مقایسه میانگین درصد سازگاری (شکل ۶) نشان داد که نسبت ۲ : ۱ : ۰ پیت ماس، پرلیت و کوکوپیت اثر معنی‌داری بر درصد سازگاری در مقایسه با سایر بسترهای کشت داشت و ۸۵ درصد گیاهان سازگار شدند. درحالی‌که با کاربرد نسبت ۱ : ۲ : ۱ پیت ماس، پرلیت و کوکوپیت کمترین درصد سازگاری (۲۰٪) بدست آمد (شکل ۸-F). همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس داده‌های حاصل از درصد سازگاری در مرحله سازگاری نشان داد که نوع بسترهای کشت مورد استفاده در مرحله سازگاری در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود.

### مقدار فنول تام در گیاهچه‌های درون شیشه‌ای

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر انواع بافت‌های گیاهی بر صفت مقدار فنول تام معنی‌دار شده است. مقایسه میانگین مقدار فنول تام این سه بافت نیز نشان داد که برگ مامیران در مقایسه با ساقه و ریشه دارای میزان بالاتر (۱۲۰/۹۶ میلی‌گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) و ریشه دارای کمترین مقدار فنول تام (۱۰/۹۹ میلی‌گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) در مقایسه با دو بافت دیگر بود (شکل ۷). در مطالعه‌ای که توسط دویر و همکاران (۷) بر روی فنول تام اندام‌های گیاهچه‌های ویتانیا<sup>۲</sup> انجام گرفت. بالاترین

1- *Centella asiatica*

2- *Withania somnifera*

## منابع

- 1- Ahmad N., Siddique I., and Anis M. 2006. Improved plant regeneration in *Capsicum annum* L. from nodal segments. *Biologia Plantarum* 50 : 701-704.
- 2- Baghel S., and Bansal Y.K. 2014. Thidiazuron promotes *in vitro* plant regeneration and phytochemical screening of *Guizota Absinica* – A MultiPurpose oil crop. *A World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science* 4786: 1193–1217.
- 3- Bakhtiar Z., Mirjalili M.H., Sonboli A., and Farimani M. 2014. *In vitro* propagation, genetic and phytochemical assessment of *Thymus persicus*– A medicinally Important Source of pentacyclic triterpenoids. *Biologia* 69: 594–603.
- 4- Banerjee S., and Kumar S. 1999. *In vitro* multiplication of *Centella asiatica*. *Current Science* 76: 147-148.
- 5- Chavan J.J., Gaikwad N.B., Umdale S.D., Kshirsagar P.R., Bhat K.V., Yadav S.R. 2013. Efficiency of direct and indirect shoot organogenesis, molecular profiling, secondary metabolite production and antioxidant activity of micropropagated *Cerpegia Santapau*. *Plant Growth Regulation* 72: 1-15.
- 6- Colombo M.L., and Bosisio E. 1996. Pharmacological activities of *Chelidonium majus* L. *Pharmaceutical Research* 33: 127-134.
- 7- Dewir Y.H., Chakrabary D., and Paek Y. 2010. Indirect regenerative of *Withania somnifera* and Comparative analysis of Withanolides in *in vitro* and greenhouse grown plants. *Biologia Plantarum* 54: 357–360.
- 8- Esfandiari A., Kazemitabar S.K., and Kiani G.H. 2016. Investigation of callus induction and indirect shoot regeneration in *Chelidonium majus* L. affected by plant growth regulators. 30(3):656-671. (In Persian with English abstract)
- 9- Faisal M., Ahmad N., and Anis M. 2005. Shoot multiplication in *Rauwolfia tetraphylla* using thidiazuron. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 80: 187 – 190.
- 10- Hartman H.T.T., and Kester D.E. 1990. *Plant propagation principles and practices*. Prentice Hal, Inc, Engle Wood Cliffs.
- 11- Husain M., Anis M., and Shahzad A. 2007. *In vitro* propagation of Kino using thidiazuron. *In Vitro Cellular and Developmental Biology–Plant* 43: 59–64.
- 12- Karuppusamy S.C., Aruna V., and Pullaiah T. 2006. Micropropagation of *Vanasushava pedata*- An endangered medicinal plant of south India. *Plant Tissue Culture and Biotechnology* 16: 85–94.
- 13- Karuppusamy S., and Kalimuthu K. 2010. Rapid *in vitro* multiplication and plant regeneration from nodal explants of *Andrographis neesiana*: A valuable endemic medicinal plant. *Advances in Biological Research* 4: 211-216.
- 14- Kiani K. 2009. *Atlas of medicinal plants*. Zarghalam.
- 15- Kupeli E., Kosar M., Yesilada E., Itusun K., and Baser C. 2002. A comparative study on the anti-inflammatory, antinociceptive and anti-Pyretic effects of isoquinoline alkaloids from the roots of Turkish *Berberis* Species. *Life Sciences* 72: 645–657.
- 16- Malik S.K., Chaudhury R., Kalia R.K. 2005. Rapid *in vitro* multiplication and conservation of *Garcinia indica*: A tropical medicinal tree Species. *Scientia Horticulturae* 106: 539–553.
- 17- Nayak N.R., Rath S.H., and Patnaik S. 1997. *In vitro* propagation of three epiphytic orchid, *Cymbidium aloifolium*, *Dendrobium aphyllum*, and *Dendrobium moschatum* through thidiazuron induced high frequency shoot proliferation. *Scientia Horticulturae* 71: 243-250.
- 18- Onay A. 2000. Micropropagation of pistachio from mature trees. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 60: 159–163.
- 19- Rajesewary V., and Paliwal K. 2006. *In vitro* propagation of *Albizia Odoratissima* from cotyledonary node and leaf nodal explants. *In Vitro Cellular and Developmental Biology– Plant* 42: 399–404.
- 20- Sedighi A., Sedighi Dehkordi F., Gholami M., and Rafieian Kopaei. 2014. Study of the effect of plant growth regulators, size and cultivar of grape inflorescence explant on production of phenolic compounds in an *in vitro* condition. *Journal of Herbal Medicine Pharmacology* 3: 35-40.
- 21- Shaik P., Samraju R., Chithakari R., and Mohammad M. 2016. TDZ induced *in vitro* plant regeneration of *Momordica balsamina* and *Momordica Charanta*, Important Medicinal Cucurbits. *International Journal of Current Research* 8: 31067–31070.
- 22- Sharma R.K., Wakhlu A.K., and Boleria M. 2004. Micropropagation of *Anethum graveolens* L. through axillary shoot proliferation. *Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology* 13: 157–159.
- 23- Tiwari K.N., Sharma N.C., Tiwari V., and Singh B.D. 2000. Micropropagation of *Centella asiatica*. A valuable medicinal herb. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture* 63: 179–185.



## Optimization of Micropropagation of *Chelidonium majus* L. and Study on Total Phenol Content in Different Organs in *In Vitro* Conditions

M. Ghasemi<sup>1</sup>- H. Aroiee<sup>2\*</sup>- P. Azadi<sup>3</sup>- A. Ali Ahmadi<sup>4</sup>

Received: ...-...-2019

Accepted: ...-...-2020

**Introduction:** Greater celandine (*Chelidonium* sp) is one of the plants that its propagation through seed occurs slowly. In addition, *Chelidonium majus* L. has limited habitats in Iran. For this reason, micropropagation can be considered as an effective method for its rapid and massive propagation and conservation, which can lead to the production of highly uniform plants. *Chelidonium majus* L. also contains a large amount of secondary metabolites of Isoquinoline alkaloids, including Chelidonine, Sanguinarine, Captasin, Berberine and Chloritrine, and phenolic compounds. Therefore, the aim of this study was to investigate micropropagation of *Chelidonium majus* L. and compare the total phenol content in leaf, stem and root in obtained plantlets.

**Materials and Methods:** To begin the experiment, seeds of *Chelidonium majus* L. were first washed with distilled water containing a few drops of tween20. Then they were washed with 70% alcohol for 1 min and were finally washed with double-distilled water. Next, they were disinfected with 1% sodium hypochlorite for 5 min, and again were rinsed with distilled water for 3 times of 5, 15, and 180 min under laminar air flow hood. The effects of TDZ at concentrations 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg/L, BAP at concentrations 0, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/L considered. Then, the effect of best treatment in combination with NAA and IBA at 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg/L on growth parameters (number of shoot, shoot length and shoot formation capacity index), were studied. The effect of IBA, NAA and IAA at 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/L on rooting parameters (number of root and root length) in MS medium supplemented with 3 g/L activated charcoal in *in vitro* conditions were evaluated. Then different ratios of cocopeat, perlite and peat moss were used for acclimatization of the obtaining plants. Folin method was used to measure total phenol content. The experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with four replications.

**Results:** The results of analysis of variance for proliferation and rooting traits showed that there were significant differences among the treatments at 1% probability level. The results of means comparison showed that the highest numbers of shoots and shoot formation capacity index were obtained from the treatment of 0.5 mg/L TDZ with the average of 8.12, which did not show a significant difference from the concentration of 0.25 mg/L TDZ, and the lowest shoot number was related to the control treatment. Increasing the amount of TDZ hormone led to the reduction in shoot number, so that at concentration of 1 mg/L TDZ, the average shoot number per explant was four. Combination of 0.5 mg/L TDZ with IBA and NAA had lower effect on *Chelidonium majus* L. proliferation. Moreover, the greatest shoot length was observed in the treatment of 2 mg/L BAP. Comparison of means values showed no significant difference between the treatments of 2 and 1.5 mg/L BAP at 1% probability level. In this study, MS medium containing 1.5 mg/L IBA was the most appropriate treatment for root formation. The effect of NAA hormone on root number of *Chelidonium majus* L. showed that the highest number of root was obtained from the treatment of 2 mg/L NAA. Besides, the effect of IAA on root number of *Chelidonium majus* L. showed that the highest number of root was observed in the treatment of 1 mg/L IAA, and the lowest number of root was related to the control treatment. The results of means comparison for the percentage of acclimatized plants showed that the ratio of 0:2:1 had a significant difference from the rest of the culture media and 85% of the plants were acclimatized, while the ratio of 1:2:1 showed the lowest percentage of acclimatization (20%). Furthermore, the results showed that the culture media had significant effect on acclimatization stage at 1% probability level. The results of the analysis of variance for total phenol content in leaf, stem and root tissues showed that there were significant differences among these three tissues. The results showed that the amount of total phenol in leaf was higher than in the stem, and the amount of phenol in root was

1 and 2- Ph.D. Student and Associate Professor, Department of Horticulture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, respectively.

(\*- Corresponding Author Email: aroiee@um.ac.ir)

3- Assistant Professor, Department of Genetic Engineering, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj

4- Assistant Professor, Department of Biology, Medicinal Plant and Drug Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

insignificant.

**Conclusion:** Based on the results of this study, micropropagation can be used as a method for commercial production of this species under *in vitro* conditions.

**Keywords:** *Chelidonium sp.*, Micropropagation, Proliferation, Total phenol