



Efficiency of Chemical and Physical Hard Water Softening Methods to Reduce the Incompatibility of Hard Water Cations with herbicide Glyphosate

A. Aliverdi^{1*}, A. Ghanbari², M.H. Rashed-Mohassel³, M. Nassiri-Mahallati⁴, E. Zand⁵

Received: 10-02-2018

Revised: 20-05-2018

Accepted: 30-05-2018

Available Online: 15-02-2023

How to cite this article:Aliverdi, A., Ghanbari, A., Rashed Mohassel, M.H., Nasiri Mahalati, M., & Zand, E. (2023). Efficiency of Chemical and Physical Hard Water Softening Methods to Reduce the Incompatibility of Hard Water Cations with herbicide Glyphosate. *Journal of Iranian Plant Protection Research* 36(4): 439-451. (In Persian with English abstract)DOI: [10.22067/jpp.2021.32208.0](https://doi.org/10.22067/jpp.2021.32208.0)

Introduction

Water is the most frequently used carrier for herbicide applications. Thus, the physicochemical properties of water in spray mixture can affect the activity of herbicides. A high concentration of Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Fe³⁺ and other cations in hard water can decrease herbicide efficacy. Weak acid herbicides that have been antagonized by one or more of the above cations include sethoxydim, 2,4-D, 2,4-DB, clethodim, imazethapyr, tralkoxydim, and glufosinate and glyphosate. Approaches to minimize hard water antagonism have included decreasing the spray carrier volume and using water-conditioning additives that have proven effective at ameliorating cation-caused antagonism include ammonium sulfate, ammonium nitrate, potassium phosphate, and citric acid. Passing hard water containing Ca²⁺, Mg²⁺ or Na⁺ through an external magnetic device results in the nucleation and crystallization of the respective carbonates. As a result, hard water can be softened for a period. Considering that the hardness of Iranian agriculture is increasing and adding an adjuvant to spray solution is also considered to be more environmental contamination, therefore, the physical conversion of hard water to soft water via its passage through a magnetic field is definitely a good alternative. The objectives of this research were to investigate the effect of adding CaCO₃, MgCO₃, Na₂CO₃, K₂CO₃, or Fe₂(CO₃)₃ to distilled water on glyphosate efficacy to jimsonweed (*Datura stramonium* L.), and to compare the chemical hard water softening methods (ammonium sulfate, ammonium nitrate, citric acid and potassium phosphate) to a new physical hard water softening method (passing carrier through a magnetic field) to Reduce the incompatibility of hard water cations with glyphosate.

Materials and Methods

The seeds of jimsonweed were collected from plants in the fields of Qazvin city, Iran. They were stored in the dark at room temperature until use. Bioassays were conducted in a greenhouse located on the Ferdowsi University of Mashhad, Iran. To increase seed germination before starting the experiment, the seeds were washed every 1 hour for 7 days to remove seed germination inhibitors. Twenty-five seeds were sown at 0.5 cm depth in 2 L plastic pots filled with a mixture of sand, clay loam soil, and peat (1:1:1 by volume). At cotyledon-leaf stage, the seedlings were thinned to four per pot. The pots were irrigated every four days with tap water. Treatments were sprayed at the four-leaf stage. The experiment was arranged as a completely randomized design with four replications as a factorial design with factors of carrier type (distilled water alone or containing 0.5 g L⁻¹ of CaCO₃, MgCO₃, Na₂CO₃, K₂CO₃, or Fe₂(CO₃)₃) and hard water softening method (ammonium sulfate, ammonium nitrate, potassium phosphate, citric acid, and passing through a magnetic field) and glyphosate dose (0, 12.81, 25.62, 51.25, 102.5 and 205 g a.i. ha⁻¹). For magnetizing the carriers, it was passed 10 times through a magnetic treatment device modified from Rashed-Mohassel (30). The mixing order for treatment solutions was (i) adding CaCO₃, MgCO₃, Na₂CO₃, K₂CO₃, or Fe₂(CO₃)₃ to distilled water, then (ii) adding/using water

1, 2, 3 and 4– Ph.D. Graduated and Professors in Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively.

(*- Corresponding Author Email: a.aliverdi@basu.ac.ir)

5- Professor in Department of Weed Research, Plant Protection Research Institute, Tehran, Iran

conditioning method, and after 15 min (iii) adding glyphosate. Then, the solutions were sprayed after about 5 min using a calibrated moving boom sprayer at 180 L ha⁻¹ at 200 kPa with 11002 flat-fan nozzle. Shoots were harvested four weeks after treatment, dried for 48 h at 70°C, and dry weight was determined. The data of shoot dry weight were subjected to a non-linear regression analysis for determination of ED₅₀ values (herbicide dose needed to obtain 50% reduction in dry weight) using the following logarithmic logistic dose-response model. The relative potency (R), the horizontal displacement between the two curves, was also calculated.

Results and Discussion

As judged by the relative potency values given in Table 1, the hard water softening methods decreased the ED₅₀ values when distilled water was used as the carrier. Therefore, the activity of glyphosate against jimsonweed was significantly increased in the presence of the hard water softening methods. There were significant differences in performance among hard water softening methods as ammonium sulfate was the most effective method. Glyphosate activity was not decreased when applied in a K₂CO₃ solution but it was decreased when applied in Na₂CO₃, MgCO₃, CaCO₃ or Fe₂(CO₃)₃ solutions. Except potassium phosphate which had only a significant effect at reducing the antagonism in the CaCO₃ carrier; all hard water softening methods could restore glyphosate activity in hard water contaminated carriers to efficacy levels comparable to glyphosate alone in distilled water. There was no statistical difference in response between the magnetized carrier and ammonium sulfate when they were used in Na₂CO₃, MgCO₃, or Fe₂(CO₃)₃ solutions. It is reported that hard water softening methods may adjust the spray solution pH so that more active ingredient can transport across the leaf surface into the plant via ion trapping phenomenon. Ammonium sulfate was the most successful method to ameliorate the decreased glyphosate activity due to antagonism with Na⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, or Fe³⁺ in the spray solution. By adding ammonium sulfate, the sulfate ion (SO₄²⁻) conjugates with the hard water cations and removes free cations from solution by forming cation-SO₄ molecule, allowing ammonium ion (NH₄⁺) to form glyphosate-NH₄ molecule. A glyphosate-NH₄ molecule diffuses across the cuticle easier and quicker. A mechanism for physical hard water softening method is illustrated in Fig. 2.

Conclusion

Although the physical hard water softening method was not effective as compared to some chemical hard water softening methods (ammonium sulfate and citric acid), from the point of view of economical and agricultural, applying the physical hard water softening method will be benefit because it needs no chemical.

Keywords: Adjuvants, Jimsonweed, Magnetic field

مقاله پژوهشی

جلد ۳۶، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۱، ص. ۴۵۱-۴۳۹

کارایی روش‌های شیمیایی و فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون‌های آب سخت با علف‌کش گلایفوسیت

اکبر علی‌وردی^{۱*} - علی قنبری^۲ - محمدحسن راشد محصل^۳ - مهدی نصیری محلاتی^۴ - اسکندر زند^۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

چکیده

وقتی آب حامل سم‌پاشی حاوی میزان بالایی از کاتیون‌های تک، دو و یا چند ظرفیتی باشد، کارایی علف‌کش‌های اسیدی ضعیف کاهش خواهد گرفت. در یک آزمایش دُز-پاسخی که در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل اجرا گردید، شش مقدار از علف‌کش گلایفوسیت (مقادیر ۰، ۱۲/۸۱، ۲۵/۶۲، ۵۱/۲۵، ۱۰۲/۵ و ۲۰۵ گرم ماده مؤثره در هکتار) با حامل‌های پاشش آب مقطر و آب مقطر به همراه ۰/۵ گرم در لیتر از کربنات‌های پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم و آهن بر روی علف‌هرز تاتوره پاشیده شد. هر یک از این تیمارها با و بدون کاربرد سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اسید سیتریک و فسفات پتاسیم و میدان مغناطیسی بکار برده شدند. وقتی آب مقطر به عنوان حامل پاشش استفاده شد، کارایی گلایفوسیت با کاربرد هر یک از روش‌های نرم‌سازی آب سخت به طور معنی‌داری افزایش یافت. در این بین، سولفات آمونیوم مؤثرترین ترکیب مورد استفاده بود که باعث افزایش کارایی ۴/۰۳ برابری نسبت به آب سخت شد. کارایی گلایفوسیت در کنترل تاتوره که با حامل پاشش حاوی کربنات پتاسیم بکار برده شده بود کاهش نیافت، ولی کارایی این علف‌کش وقتی با حامل‌های پاشش حاوی کربنات کلسیم، منیزیم، سدیم و آهن بکار برده شده بود به طور معنی‌داری کاهش یافت. در بین انواع کاتیون‌ها، حامل پاشش حاوی کاتیون آهن بیشترین اثر منفی را بر کارایی گلایفوسیت داشت. بجز فسفات پتاسیم که فقط دارای تأثیر کمی در تقلیل اثرات ناسازگار حامل پاشش حاوی کربنات کلسیم داشت، سایر روش‌های نرم‌سازی آب سخت قادر بودند تا بر اثرات منفی حضور کاتیون‌ها در آب سخت به طور کامل فایز آیند. زمانی که از حامل‌های پاشش حاوی کربنات سدیم، منیزیم و آهن استفاده شد، تفاوت معنی‌داری بین عملکرد سولفات آمونیوم و میدان مغناطیسی در نرم‌سازی آب سخت مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: تاتوره، مواد افزودنی، میدان مغناطیسی

مقدمه

عمدتاً، از آب به‌عنوان حامل پاشش برای کاربرد علف‌کش‌ها استفاده می‌شود. از این‌رو، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب مورد

استفاده در سم‌پاشی می‌تواند کارایی علف‌کش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد (Shahverdi et al., 2010). محققان ثابت کرده‌اند که حضور مقادیر بالایی از کاتیون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، منگنز، روی و آهن در آب سم‌پاشی می‌تواند کارایی علف‌کش‌ها را کاهش دهد (Patton et al., 2016). در این رابطه، عمدتاً علف‌کش‌های اسیدی ضعیف همچون ستوکسیدیم^۶ (Matysiak and Nalewaja, 1999)، کلتودیم^۷ (Nandula et al., 2007)، توفوردی^۸ (Roskamp

۱، ۲، ۳ و ۴- به‌ترتیب دانشجوی سابق دکتری و استادان گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
۵- استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات علف‌های هرز،

تهران، ایران

* - نویسنده مسئول:

(Email: a.aliverdi@basu.ac.ir)

DOI: 10.22067/jpp.2021.32208.0

6- Sethoxydim

7- Clethodim

8- 2,4-D

Chang and)^{۱۰} چگالی (Rashed-Mohassel et al., 2009)،
 Weng, 2006)،^{۱۱} تبخیرپذیری (Toledo et al., 2008) و
 اسیدپتته^{۱۲} (Fathi et al., 2006) رخ می دهد. تمامی ویژگی های
 فیزیکی و شیمیایی مذکور در کارایی علف کش های شاخ و برگ
 مصرف تأثیرگذار هستند (Rao, 2000).

با توجه به اینکه به میزان سختی آب های کشاورزی ایران روز به
 روز افزوده می شود (Osati and Nahvinia., 2016) و نیز افزودن
 هر نوع ماده افزودنی به محلول سم به نوعی آلودگی بیشتر محیط
 زیست محسوب می شود (Rashed-Mohassel et al., 2009)،
 بنابراین، تبدیل فیزیکی آب سخت به آب نرم از طریق عبور دادن آن
 از بین میدان مغناطیسی قطعاً گزینه کاربردی مناسبی خواهد بود. در
 این تحقیق، علاوه بر ارزیابی شدت ناسازگاری هر یک از کاتیون های
 سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهن موجود در آب سخت بر کارایی
 گلایفوسیت در کنترل تاتوره (*Datura stramonium* L.)، مقایسه ای
 بین روش های شیمیایی نرم سازی آب سخت (افزودن سولفات
 آمونیوم، نیترات آمونیوم، فسفات پتاسیم و اسید سیتریک) با روش
 فیزیکی نرم سازی آب سخت (عبور دادن حامل پاشش از میدان
 مغناطیسی) نیز انجام گرفت. علف هرز تاتوره گیاهی یکساله از تیره
 سیب زمینی است که به عنوان گیاهی مهاجم در طی چند سال اخیر
 در مزارع چغندر، حبوبات، سبزی و صیفی، پنبه و سویا و سایر دانه-
 های روغنی محسوب می شود. گزارش ها نشان داده است که افزایش
 تراکم تاتوره از ۱ به ۳۲ بوته در ۹/۱ متر از ردیف، کاهش ۹۲ درصدی
 در تعداد غوزه پنبه را سبب می شود (Khanjani et al., 2010). از
 آنجایی که منشاء کاتیون های ناسازگار با علف کش ها ممکن است
 سطح برگ خود علف هرز باشد (Young et al., 2003) و بر اساس
 حال و همکاران (Hall et al., 2000) که بیان داشتند که سطح برگ
 تاتوره دارای میزان کلسیم پایینی است، از این رو، تاتوره صرفاً به عنوان
 یک گیاه محک برای درک وجود اثرات تیمارها انتخاب شد.

مواد و روش ها

کپسول های شکافته تاتوره از روی گیاهان مادری در مزارع
 اطراف شهر قزوین جمع آوری شدند. پس از تخلیه بذرها از کپسول ها،
 بذرها در تاریکی تا شروع آزمایش در دمای اتاق نگهداری شدند.
 آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
 مشهد اجرا شد. به منظور یکنواختی و سهولت در جوانه زنی و سبز شدن
 گیاهچه های تاتوره، ابتدا بذرها در درون محلول هیپوکلریت سدیم ۵
 درصد به مدت ۵ دقیقه قرار گرفتند و سپس با آب شرب شهری

و دایکمبا^۱ (Patton et al., 2016 et al., 2013a
 et al., 2013a)،^۲ توفوردی بی (Somerville et al., 2012)،
 ایمازتاپیر^۳ (Aliverdi et al., 2014)، ترالکوکسیدیم^۴ (Devilliers
 et al., 2001)، گلیفوزینت آمونیوم^۵ (Soltani et al., 2011) و
 گلایفوسیت^۶ (Mahoney et al., 2014) حساسیت بسیار بالایی به
 حضور کاتیون های مذکور در آب سخت را نشان داده اند. به همین
 دلیل است که کاربرد مخلوط عناصر ریزمغذی منیزیم، منگنز، روی و
 آهن به همراه علف کش های اسیدی ضعیف توصیه نمی شود
 (Scroggs et al., 2009). استفاده از آب سخت به منظور سم پاشی
 می تواند به دلیل تشکیل کمپلکس کاتیون-توفوردی باعث ایجاد
 رسوب های سختی در درون اجزای مختلف سم پاش شود. در چنین
 وضعیتی، خسارت جبران ناپذیری به تجهیزات سم پاشی وارد خواهد شد
 چون رسوب زدایی بخش های داخلی سم پاش بسیار مشکل و گاهی غیر
 ممکن است (Somerville et al., 2012). راهکارهایی جهت
 کاهش ناسازگاری آب سخت با علف کش های اسیدی ضعیف ارائه
 شده است که عبارتند از کاهش حجم حامل پاشش (Wills et al.,
 1998) و افزودن مواد نرم کننده آب سخت (Devkota and
 Johnson, 2016). در تحقیقات قبلی، کارآمدی سولفات آمونیوم
 (Mahoney et al., 2014)، نیترات آمونیوم، فسفات پتاسیم (Wills
 et al., 1998) و اسید سیتریک (Thelen et al., 1995) به عنوان
 مواد افزودنی نرم کننده آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های
 آن با علف کش گلایفوسیت به اثبات رسیده است.

در منابع حوزه علوم پایه، محققان متعددی ثابت کرده اند که عبور
 دادن آب سخت حاوی آنیون کربنات و کاتیون های کلسیم
 (Madsen, 2004)، منیزیم و سدیم (Bin et al., 2011) از بین یک
 میدان مغناطیسی نسبتاً قوی باعث بلورسازی کربنات های نمکی
 مربوطه در درون محیط آب می شود. در نتیجه، آب سخت برای مدت
 زمانی در حدود ۲۰۰ ساعت به آب نرم تبدیل می شود (Coey and
 Cass, 2000). علاوه بر این، با عبور دادن آب از بین یک میدان
 مغناطیسی تغییرات معنی داری در ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب
 از جمله ظرفیت حل کنندگی^۷ (Moosa et al., 2015)، هدایت
 الکتریکی^۸ (Akopian and Airapetian, 2005)، کشش سطحی^۹

- 1- Dicamba
- 2- 2,4-DB
- 3- Imazethapyr
- 4- Tralkoxydim
- 5- Glufosinate-ammonium
- 6- Glyphosate
- 7- Solvent capacity
- 8- Conductivity
- 9- Surface tension

10- Viscosity

11- Evaporability

12- pH

کانال عبور قرار گرفت و سپس دو قطعه دیگر آهن‌ربا بر روی قطعات قبلی قرار داده شدند. همچنین، از آنجایی که با نزدیک کردن آهن رباهای دو طرف کانال عبور به یکدیگر شدت میدان مغناطیسی تقویت می‌شود؛ از اینرو، مقطع کانال عبور تا حد امکان باریک (۱ میلی‌متر در عرض) تهیه شد. شدت میدان مغناطیسی در درون کانال عبور ۰/۷ تسلا بود که با استفاده از تسلامتر لوپ‌دار مدل 1-ST AlphaLab اندازه‌گیری شد. دبی عبوری محلول از مقطع حدود ۱/۸ لیتر در دقیقه بود. علاوه بر این، از آنجایی که عبور پرتوهای مغناطیسی از فلز مس به خوبی انجام می‌گیرد (Gabrielli et al., 2001)؛ از این‌رو، از لوله‌ای از همین جنس برای تهیه کانال عبور استفاده شد.

چهار هفته پس از سمپاشی، گیاهان تیمار شده از سطح خاک برداشت شدند و وزن خشک آنها پس از ۴۸ ساعت قراردگی در درون آون در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد توزین شد. داده‌های بدست آمده تقسیم بر ۴ (تعداد بوته در هر گلدان) شدند. پاسخ وزن خشک علف-هرز تاتوره به تیمارها با تکنیک آنالیز رگرسیون غیرخطی با مدل چهار پارامتری لجستیک (معادله ۱) و با استفاده از نرم‌افزار R نسخه ۲٫۶٫۲ تجزیه و تحلیل شد (Ritz et al., 2015):

$$Y = \frac{C + (D - C)}{1 + \exp[B(\log X - \log ED)]} \quad \text{معادله ۱}$$


در این رابطه: Y بیانگر وزن خشک تاتوره، D و C حد مجانب بالا و پایین وزن خشک در مقادیر صفر و بی‌نهایت گلایفوسیت، ED₅₀ بیانگر مقدار علف‌کش لازم (x) برای کاهش ۵۰ درصدی در وزن خشک بین حد مجانب بالا و پایین است و B متناسب با شیب منحنی در محدوده ED₅₀ می‌باشد. از آنجایی که اهمیت پارامتر ED₅₀ در مطالعات بهینه‌سازی کارایی علف‌کش‌ها به روش دژ-پاسخ بیشتر از سایر پارامترها (مانند ED₁₀ و ED₉₀) است (Ritz et al., 2015)، از این‌رو؛ فقط نتایج مربوط به پارامتر ED₅₀ ارائه شد. پارامتر ED₅₀ بیانگر ویژگی موسوم به فعالیت ذاتی علف‌کش در گیاه است. به طوری که از نسبت آنها برای ارزیابی جابه‌جایی افقی منحنی در اثر افزودن مواد افزودنی استفاده می‌شود که به پتانسیل نسبی (R) موسوم است که براساس معادله ۲ محاسبه می‌شود (Ritz et al., 2015):

$$R = \frac{ED_{50} a}{ED_{50} b} \quad \text{معادله ۲}$$

در این رابطه: در صورت این کسر مقدار ED₅₀ علف‌کش بدون روش نرم‌سازی آب سخت و در مخرج این کسر مقدار ED₅₀ علف‌کش با اعمال یک روش نرم‌سازی آب سخت قرار می‌گیرد. اگر R برابر یک باشد، اعمال روش نرم‌سازی هیچ تأثیر معنی‌داری ندارد. اگر پتانسیل نسبی بزرگتر از یک باشد، کارایی افزایش یافته و اگر پتانسیل نسبی کوچکتر از یک باشد، برعکس آن صادق است.

شستشو شدند. بذرها درون یخچال در دمای ۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری و در طول مدت ۷ روز هر یک ساعت با آب شرب شهری شستشو شدند. با این روش، مواد بازدارنده جوانه‌زنی موجود در پوسته بذرها (Andersen, 1968) از بین رفته و موجبات سبز شدن ۸۸ درصدی بذرها پس از کاشت فراهم شد. تعداد ۲۵ بذر در سطح خاک گلدان ۲ لیتری حاوی خاک، خاکبرگ و ماسه بادی با نسبت حجمی برابر قرار داده شدند. سپس، بر روی بذرها به اندازه ۰/۵ سانتی‌متر خاک ریخته شد. گلدان‌ها هر چهار روز یکبار آبیاری شدند. در مرحله برگ لپه‌ای، گیاهچه‌ها به حدود ۴ گیاهچه در هر گلدان تنک شدند. دمای گلخانه در مدت رشد، بین ۲۷ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در طول روز و ۱۷ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد در طول شب در نوسان بود. گیاهان در مرحله ۴ برگگی کامل با استفاده از سم‌پاش متحرک ریلی مجهز به نازل بادبزی معمولی ۱۱۰۰۲ با خروجی ۲۰۴ لیتر در هکتار با فشار ۲۰۰ کیلو پاسکال تحت تیمار قرار گرفتند. دما در حین سم‌پاشی ۳ ± ۲۶ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶ ± ۴۴ درصد بودند.

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. فاکتور غلظت علف‌کش گلایفوسیت (رانداپ ۴۱٪ مایع قابل حل در آب، آریا شیمی، ایران) شامل غلظت‌های ۰، ۱۲/۸۱، ۲۵/۶۲، ۵۱/۲۵، ۱۰۲/۵، ۲۰۵ گرم ماده مؤثره در هکتار، فاکتور حامل پاشش شامل آب مقطر و آب سخت حاوی هر یک از کاتیون‌های Na^+ ، K^+ ، Mg^{2+} ، Ca^{2+} ، Fe^{3+} و فاکتور روش نرم‌سازی آب سخت شامل کاربرد و عدم کاربرد سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اسید سیتریک، فسفات پتاسیم و میدان مغناطیسی بود. ترتیب مخلوط‌سازی مواد به این صورت بود که ابتدا، کربنات نمکی به آب مقطر افزوده شد؛ سپس، روش نرم‌سازی آب سخت اعمال شد؛ و در نهایت و پس از ۱۵ دقیقه انتظار، مقادیر علف‌کش افزوده شد (Aliverdi et al., 2014). براساس اطلاعات موجود، سولفات آمونیوم $[(NH_4)_2SO_4]$ ، نیترات آمونیوم $[NH_4NO_3]$ (Soltani et al., 2011)، اسید سیتریک $[C_6H_8O_7]$ (Thelen et al., 1995) و فسفات پتاسیم $[KHPO_4]$ (Wills et al., 1998) به میزان ۲۰ گرم برای هر لیتر محلول پاشش استفاده شد. برای تهیه آب سخت حاوی هر یک از کاتیون‌های Na^+ ، K^+ ، Mg^{2+} ، Ca^{2+} ، Fe^{3+} ، به‌طور جداگانه مقدار ۰/۵ گرم از نمک‌های کربناتی آهن $(Fe_2(CO_3)_3)$ ، کلسیم $(CaCO_3)$ ، منیزیم $(MgCO_3)$ ، پتاسیم (K_2CO_3) و سدیم (Na_2CO_3) به یک لیتر آب مقطر اضافه شد (Patton et al., 2016). با افزودن این نمک به آب مقطر، هر یک از حامل‌ها حاوی آنیون کربنات (CO_3^{2-}) و کاتیون‌های مذکور بودند. به‌منظور مغناطیسی‌سازی، حامل‌های پاشش را ۱۰ بار از میدان مغناطیسی عبور دادیم. آرایش میدان مغناطیسی و اندازه کانال عبور محلول پاشش و قطعات آهن‌ربا در شکل ۱ نمایش داده شده است. با اصلاح روش راشد‌محصل و همکاران (Rashed-Mohassel et al., 2009)، ابتدا دو قطعه از آهن‌ربا از سمت قطب‌های مخالفشان بر روی دو طرف



شکل ۱- ابزار تیمار مغناطیسی (با اصلاح روش راشد محصل و همکاران (Pratt et al., 2003)

N و S به ترتیب نشان دهنده قطب های شمال و جنوب آهن ربا هستند. شدت میدان مغناطیسی برابر ۰/۷ تسلا بود.

Figure 1. Magnetic treatment device (modified from Rashed-Mohassel et al. (31))

N and S are the North and South poles, respectively. The strength of the magnetic field was 0.7 T.

سیتریک (۲/۸۳) ≤ نیترات آمونیوم (۲/۳۷) < میدان مغناطیسی (۲/۱۱) ≤ فسفات پتاسیم (۱/۹۹) بود. هیچ گونه اختلاف معنی داری بین مقادیر پارامتر شیب (b) منحنی های دز-پاسخ مشاهده نشد (داده ها نشان داده نشده است). به عبارتی دیگر، منحنی های علف کش تنها و همراه با روش های نرم سازی آب دارای شیب برابری هستند. براساس تحقیق کودسک و ماتیا سین (Kudsk and Mathiassen, 2007)، در زمانی که اختلاف معنی داری بین شیب منحنی ها وجود نداشته باشد، آنها را می توان موازی در نظر گرفت. در چنین وضعیتی، می توان نتیجه گیری کرد که روش های نرم سازی آب مورد استفاده در این تحقیق از نظر زیستی به خودی خود روی علف هرز تاتوره غیرفعال می باشند. پیش از این، محققان ثابت کرده اند که سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم موجب افزایش جذب و بهبود کارایی گلایفوسیت شده است. (Young et al., 2003; Mahoney et al., 2014)

نتایج و بحث

کاربرد تمامی روش های نرم سازی آب شیمیایی (سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اسید سیتریک و فسفات پتاسیم) و فیزیکی (عبوردی حامل از میدان مغناطیسی) موجب کاهش مقدار ED₅₀ گلایفوسیت در کنترل علف هرز تاتوره شد (جدول ۱). به طور کلی، مقادیر پتانسیل نسبی (R) زمانی که گلایفوسیت به همراه این روش های نرم سازی آب بکار برده شد از عدد ۱ بیشتر بود (جدول ۱)، که نشان دهنده افزایش قابل توجهی در کارایی این علف کش به وسیله این روش - هاست. براساس داده های پتانسیل نسبی، بیشترین و کمترین اثر به ترتیب مربوط به سولفات آمونیوم و فسفات پتاسیم بودند.

در این رابطه، بین فسفات پتاسیم و میدان مغناطیسی اختلاف معنی داری وجود نداشت. به منظور ایجاد درک مناسب از داده های پتانسیل نسبی، به عنوان نمونه باید ذکر شود که کارایی ۱ گرم در هکتار گلایفوسیت به همراه سولفات آمونیوم برابر کارایی ۴/۰۳ گرم در هکتار گلایفوسیت به تنهایی است. براساس داده های پتانسیل نسبی، رتبه بندی روش های نرم سازی آب در بهبود کارایی گلایفوسیت در کنترل علف هرز تاتوره به صورت: سولفات آمونیوم (۴/۰۳) < اسید

جدول ۱- مقادیر ED₅₀ برای گلایفوسیت پاشیده شده با آب مقطر در پاسخ به کاربرد روش‌های نرم‌سازی آب به منظور کنترل وزن خشک تاتوره

Table 1- ED₅₀ values of glyphosate applied with distilled water in response to water softening methods application to control the dry weight of jimsonweed

روش نرم‌سازی آب Water conditioner	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)	R
شاهد Control	35.47 (4.31)	1.00
سولفات آمونیوم Ammonium sulfate	8.81 (1.71)	4.03
نیترات آمونیوم Ammonium nitrate	14.98 (1.28)	2.37
اسید سیتریک Citric acid	12.53 (1.77)	2.83
فسفات پتاسیم Potassium phosphate	17.83 (1.78)	1.99
میدان مغناطیسی Magnetic field	16.76 (1.76)	2.11

اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد هستند.
The standard errors are in parentheses.

محلول پاشش سبب تشدید مکانیسم تله یونی شده و از این طریق باعث بهبود کارایی گلایفوسیت در کنترل تاتوره شده است. افزایش کارایی علف‌کش‌های گلایفوسیت در کنترل تاتوره با استفاده از میدان مغناطیسی می‌تواند به دو دلیل باشد. اول اینکه، مغناطیسی‌سازی حامل سبب کاهش کشش سطحی آب (Amiri and Dadkhah, 2006) و محلول علف‌کش (Rashed-Mohassel *et al.*, 2009) می‌شود. کاهش کشش سطحی، علاوه بر این که باعث نشست بیشتر قطره‌ها بر روی سطح برگ می‌شود، بلکه موجب کاهش زاویه تماس قطره با سطح برگ نیز می‌شود که این عمل باعث افزایش نفوذ کوتیکولی و روزنه‌ای می‌شود (Rashed-Mohassel *et al.*, 2009). دوم اینکه، با کاهش اسیدیته محلول پاشش تحت اثر میدان مغناطیسی (Tai *et al.*, 2008)، نفوذ علف‌کش‌های با خاصیت اسیدی ضعیف از عرض کوتیکول و غشاء سلول گیاهی به سبب تشدید مکانیسم تله یونی تسهیل و تسریع می‌شود. در مقایسه با حامل پاشش آب مقطر، حامل‌های پاشش آب مقطر حاوی نمک‌های کربناتی مختلف باعث افزایش معنی‌داری در مقدار گلایفوسیت برای کنترل ۵۰ درصدی تاتوره شدند (جدول ۲). به‌طور کلی، داده‌ها نشان می‌دهند که مقادیر پتانسیل نسبی (R) زمانی که علف‌کش با آب مقطر حاوی نمک‌های کربناتی بکار برده شده بود از عدد ۱ کمتر است، که نشان دهنده اثرات ناسازگار این کاتیون‌ها بر کارایی علف‌کش است.

افزودن سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم به محلول پاشش یون آمونیوم ایجاد می‌کند. این یون با تشدید مکانیسم تله یونی، موجب افزایش عبور علف‌کش‌های اسیدی ضعیف از غشاء سلول گیاهی شده و به بهبود کارایی آنها منجر می‌شود (Thelen *et al.*, 1995). حالیت علف‌کش‌های دارای خاصیت اسیدی ضعیف (مانند گلایفوسیت) با اسیدیته محلول پاشش تغییر می‌کند. این نوع علف‌کش‌ها وقتی در محلولی با اسیدیته پایین قرار می‌گیرند (جایی که پروتون زیاد است)، تمایل به تجمع با پروتون داشته و این عمل سبب آب‌گریزی و تسهیل و تسریع نفوذ آنها از عرض کوتیکول و غشاء سلولی می‌شود. این گونه علف‌کش‌ها در داخل سلول (جایی که پروتون به دلیل پمپاژ آن به بیرون سلول نسبتاً کمیاب است) پروتون از دست می‌دهند که این امر باعث آب‌دوستی یا حالیت آنها در آب درون سلولی می‌شود. بنابراین، علف‌کش‌های با خاصیت اسیدی ضعیف به این طریق در سلول (یا در آوندهای آبکش) به دام افتاده و تجمع می‌یابند (Thelen *et al.*, 1995). علاوه بر این، ثابت شده است که کاربرد سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم موجب کاهش اسیدیته محلول پاشش می‌شوند (Shahverdi *et al.*, 2010). کاهش اسیدیته محلول پاشش به وسیله این مواد افزودنی نیز سبب تشدید مکانیسم تله یونی می‌شود (Thelen *et al.*, 1995). پنر (Penner, 2006) بیان داشت که سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم می‌توانند کشش سطحی محلول پاشش را نیز کاهش داده و از این طریق موجب نشست و نگهداشت بیشتر پاشش بر روی سطح برگ هدف می‌شوند. به نظر می‌رسد که اسید سیتریک نیز با کاهش اسیدیته

جدول ۲- مقادیر ED₅₀ برای گلایفوسیت پاشیده شده با آب مقطر یا آب مقطر حاوی نمک های کربناتی مختلف به منظور کنترل وزن خشک تاتوره
 Table 2- ED₅₀ values of glyphosate applied with distilled water or distilled water + various carbonate salts to control the dry weight of jimsonweed

حامل پاشش Spray carrier	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)	R
آب مقطر Distilled water	35.47 (4.31)	1.00
آب مقطر + کربنات پتاسیم Distilled water + K ₂ CO ₃	44.21 (5.36)	0.80
آب مقطر + کربنات سدیم Distilled water + Na ₂ CO ₃	55.08 (11.93)	0.64
آب مقطر + کربنات منیزیم Distilled water + MgCO ₃	70.12 (8.53)	0.50
آب مقطر + کربنات کلسیم Distilled water + CaCO ₃	65.32 (8.46)	0.54
آب مقطر + کربنات آهن Distilled water + Fe ₂ (CO ₃) ₃	89.49 (10.90)	0.39

اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد هستند.

The standard errors are in parentheses.

به عبارتی دیگر، شدت اثر ناسازگار کاتیون های سه ظرفیتی (Fe³⁺) بیشتر از کاتیون های دو ظرفیتی (Ca²⁺ و Mg²⁺) و آنها نیز بیشتر از کاتیون های تک ظرفیتی (K⁺ و Na⁺) بود. احتمالاً این به آن دلیل است که هر سه عدد مولکول علف کش می تواند به وسیله یک کاتیون آهن خنثی شود. در حالی که هر یک عدد مولکول علف کش می تواند به وسیله یک کاتیون سدیم خنثی شود. این نتایج با یافته های نالواجا و ماتسیاک (Nalewaja and Matysiak, 1991) تطابق دارد.

به طور کلی، نتایج نشان داد که وقتی از روش های نرم سازی آب سخت (فیزیکی و شیمیایی) استفاده شد، به طور کارآمدی از اثرات منفی تمامی کاتیون های موجود در حامل پاشش بر کارایی گلایفوسیت در کنترل تاتوره جلوگیری به عمل آمد. به طوری که مقادیر ED₅₀ گزارش شده در جدول ۳ (بجز فسفات پتاسیم و میدان - مغناطیسی در ارتباط با کاربرد کربنات آهن) از مقدار ED₅₀ گزارش شده در جدول ۱ (۳۵/۴۷ گرم ماده مؤثره در هکتار) برای کاربرد گلایفوسیت تنها با حامل آب مقطر به طور معنی داری کمتر بود. براساس داده های پتانسیل نسبی (R)، کاربرد روش های نرم سازی آب سخت به طور معنی داری باعث غلبه بر اثرات منفی تمامی کاتیون ها بر کارایی گلایفوسیت شد (جدول ۳). به منظور غلبه بر اثرات منفی کاتیون پتاسیم بر کارایی گلایفوسیت کاربرد سولفات آمونیوم و فسفات پتاسیم به ترتیب مؤثرترین و کم اثرترین روش بودند. هر چند، بین روش های کاربرد فسفات پتاسیم، میدان مغناطیسی، اسید سیتریک و نیترات آمونیوم در این ارتباط اختلاف معناداری مشاهده نشد. به منظور غلبه بر اثرات منفی کاتیون سدیم بر کارایی گلایفوسیت کاربرد سولفات آمونیوم و فسفات پتاسیم به ترتیب مؤثرترین و کم اثرترین روش بودند. هر چند، بین روش های کاربرد

براساس داده های پتانسیل نسبی، اگرچه بین شدت اثر ناسازگار کاتیون های منیزیم، کلسیم و آهن و نیز بین شدت اثر ناسازگار کاتیون های پتاسیم و سدیم تفاوت معناداری مشاهده نشد، ولی بیشترین و کمترین اثر هم گاهی به ترتیب به وسیله کاتیون های آهن و پتاسیم مشاهده شد. براساس داده های پتانسیل نسبی، رتبه بندی کاتیون ها در کاهش کارایی گلایفوسیت در کنترل تاتوره به صورت: آهن ≤ منیزیم ≤ کلسیم < سدیم ≤ پتاسیم بود. تحقیقات قبلی نیز ثابت کرده اند که کاتیون های فلزی موجود در آب سخت سبب کاهش کارایی علف کش های اسیدی ضعیف می شوند (Soltani et al., 2011). به طوری که محققان گزارش کردند که کاتیون های کلسیم (Young et al., 2003)، منگنز (Bernards et al., 2005)، آهن، روی، منیزیم، سدیم و پتاسیم (Nalewaja and Matysiak, 1991) موجود در آب سخت باعث کاهش کارایی گلایفوسیت می شود. علف کش هایی که خاصیت اسید ضعیفی دارند، مثل گلایفوسیت، در محلول آب به بخش های آنیونی (یعنی جزء اسیدی آنها) و کاتیونی (یعنی یک پروتون) تفکیک می شوند. بخش آنیونی این علف کش ها با کاتیون های فلزی موجود در آب سخت پیوند برقرار کند. در نتیجه کمپلکس کاتیون-علف کش به وجود می آید (شکل ۲) که نسبت به مولکول علف کش نامحلول بوده و از طریق برگ گیاهان به خوبی جذب نمی شود (Penner, 2006). هافمن و همکاران (Hoffmann et al., 2008) نیز ثابت کردند که با افزایش سختی آب (حاوی کربنات کلسیم)، اندازه قطره های پاشش افزایش می یابد و این امر باعث کاهش نشست قطره ها روی برگ و متعاقباً موجب کاهش کارایی علف کش می شود. شدت اثر ناسازگار کاتیون ها بر فعالیت زیستی گلایفوسیت به ظرفیت کاتیونی آنها بستگی داشت (جدول ۲).

طور که قبلاً اشاره شد، ترکیباتی مانند سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم درون حامل پاشش تشکیل دو دسته یون می‌دهند. یون سولفات حاصل از افزودن سولفات آمونیوم و یون نیترات حاصل از افزودن نیترات آمونیوم می‌توانند با اتصال به کاتیون‌های کلسیم، منیزیم، روی، سدیم و آهن در آب سخت، از تأثیر ناسازگار این کاتیون‌ها بر فعالیت زیستی علف‌کش‌های اسیدی ضعیف جلوگیری می‌کنند (Thelen et al., 1995). یون آمونیوم حاصل از سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم نیز به مولکول علف‌کش اتصال می‌یابد. همان‌طور که قبلاً بیان شد، کمپلکس آمونیوم-علف‌کش قادر است از طریق تشدید مکانیسم تله اسیدی به سرعت و به میزان بالا از کوتیکول برگ نفوذ کند (Yoing et al., 2003). فسفات پتاسیم نیز دو نوع یون درون حامل پاشش تشکیل می‌دهد. یون فسفات می‌تواند همانند یون‌های سولفات و نیترات عمل کند. یون پتاسیم با اتصال به مولکول علف‌کش سبب تشکیل کمپلکس پتاسیم-علف‌کش شود که گاهی اوقات اثرات هم‌کاهی یا هم‌افزایی بسیار ناچیزی را بروز می‌دهد (Wills et al., 1998). افزودن اسید سیتریک نیز قادر است تا به طور مؤثری کاتیون‌های آب سخت را از محلول خارج نماید. افزودن اسید سیتریک، به سبب اینکه در محلول یون‌های هیدروژن آزاد می‌سازد، موجب کاهش اسیدیته محلول پاشش می‌شود (Bernards et al., 2005). اسیدی‌سازی محلول علف‌کش‌های اسیدی ضعیف باعث بهبود نفوذ گلایفوسیت از کوتیکول و بهبود انتقال آن از درون آوندهای آبکش می‌شود (Molin and Hirase, 2004).

نحوه عمل روش فیزیکی نرم‌سازی آب سخت با استفاده از میدان مغناطیسی در شکل ۲ پیشنهاد شده است. در مسیر شماره ۱، علف‌کش‌هایی با خاصیت اسید ضعیفی که درون آب به بخش‌های آبیونی و کاتیونی تفکیک می‌شوند، از طرف بخش آبیونی خود با کاتیون‌های آب سخت پیوند برقرار می‌کنند. در نتیجه، کمپلکس کاتیون-علف‌کش به وجود می‌آید که علی‌رغم اینکه نسبت به مولکول علف‌کش نامحلول بوده و به خوبی از طریق برگ‌های گیاهان جذب نمی‌شود (Penner, 2006)، بلکه تعداد مولکول علف‌کش کمی در محلول پاشش به طور آزاد وجود خواهد داشت تا به فعالیت زیستی خود بپردازد. در مسیر شماره ۲، عبور دادن آب سخت از میدان مغناطیسی (مغناطیسی‌سازی حامل) موجب تحریک فرآیند هسته‌زایی برای تولید بلور کربنات کلسیم می‌شود (Madsen, Coey and Cass, 2000)؛ قبلاً، فرآیند هسته‌زایی برای تولید بلور کربنات سدیم، کربنات کلسیم و کربنات منیزیم از آب سخت عبور کرده از میدان مغناطیسی به وسیله بین و همکاران (Bin et al., 2011) گزارش شده است.

سولفات آمونیوم، میدان مغناطیسی، اسید سیتریک و نیترات آمونیوم در این ارتباط اختلاف معناداری مشاهده نشد. به منظور غلبه بر اثرات منفی کاتیون منیزیم بر کارایی گلایفوسیت کاربرد سولفات آمونیوم و فسفات پتاسیم به ترتیب مؤثرترین و کم‌اثرترین روش بود. بین روش‌های کاربرد میدان مغناطیسی، اسید سیتریک و نیترات آمونیوم در این ارتباط اختلاف معناداری مشاهده نشد. همچنین، بین روش‌های فسفات پتاسیم و میدان مغناطیسی اختلاف معنی‌داری در این رابطه مشاهده نشد. در مورد کاربرد علف‌کش گلایفوسیت به همراه حامل حاوی کربنات کلسیم، نتایج نشان داد که کاربرد تمامی روش‌های نرم‌سازی آب سخت باعث غلبه بر اثرات منفی کاتیون کلسیم بر کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل علف‌هز تاتوره شد. در این ارتباط نیز بهترین روش برای این منظور با کاربرد سولفات آمونیوم بدست آمد. هرچند، بین کاربرد سولفات آمونیوم و اسید سیتریک اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. اگرچه فسفات پتاسیم تأثیرگذار بود ولی تأثیر آن در مقایسه با دیگر روش‌ها کمترین بود. بین روش‌های کاربرد میدان مغناطیسی، اسید سیتریک و نیترات آمونیوم در این ارتباط اختلاف معناداری مشاهده نشد. در رابطه با کاربرد گلایفوسیت به همراه حامل حاوی کربنات آهن نتایج مشابهی با کاربرد آن به همراه حامل حاوی کربنات کلسیم بدست آمد. به طوری که کاربرد تمامی روش‌های نرم‌سازی آب سخت باعث غلبه بر اثرات منفی کاتیون آهن بر کارایی گلایفوسیت در کنترل تاتوره شد. در این ارتباط نیز بهترین روش برای این منظور با کاربرد سولفات آمونیوم بدست آمد. هرچند، بین کاربرد سولفات آمونیوم و کاربرد اسید سیتریک و نیترات آمونیوم اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. اگرچه فسفات پتاسیم تأثیرگذار بود ولی تأثیر آن در مقایسه با روش‌های دیگر کمترین بود. بین روش‌های کاربرد فسفات پتاسیم و میدان مغناطیسی در این ارتباط اختلاف معناداری مشاهده نشد. در تحقیقات متعدد قبلی، به حداقل‌رسانی اثرات ناسازگار کاتیون‌های فلزی موجود در آب سخت به وسیله روش‌های شیمیایی نرم‌سازی آب سخت بر کارایی علف‌کش‌های اسیدی ضعیف به خوبی مستند شده است. برای مثال، کاربرد روش‌های شیمیایی نرم‌سازی آب سخت قبل از افزودن علف‌کش‌های گلایفوسیت (Hajmohammadnia Ghalibaf et al., 2014) و گلیفوزینت آمونیوم (Pratt et al., 2003; Soltani et al., 2011)؛ ترالکوکسیدیم (Devilliers et al., 2001)؛ دایکبما و توفوردی (Roskamp et al., 2013a)؛ سافلوفنیسیل^۱ (Roskamp et al., 2013b)؛ توفوردی + ام‌سی‌پی^۲ (Nosratti et al., 2012)؛ ایمازتاپیر (Aliverdi et al., 2014) به حامل آب سخت موجب غلبه بر اثرات منفی ناشی از کاتیون‌های موجود در حامل شده است. همان

1- Saflufenacil
2- MCPA

جدول ۳- مقادیر ED₅₀ برای گلایفوسیت پاشیده شده با آب مقطر حاوی نمک های کربناتی مختلف در پاسخ به کاربرد روش های نرم سازی آب به منظور کنترل وزن خشک تاتوره
 Table 3- ED₅₀ values of glyphosate applied with distilled water + various carbonate salts in response to water softening methods application to control the dry weight of jimsonweed


روش نرم سازی آب Water conditioner	حامل پاشش Spray carrier			
	آب مقطر + کربنات پتاسیم Distilled water + K ₂ CO ₃	آب مقطر + کربنات سدیم Distilled water + Na ₂ CO ₃	آب مقطر + کربنات منیزیم Distilled water + MgCO ₃	آب مقطر + کربنات کلسیم Distilled water + CaCO ₃
	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)	ED ₅₀ (g a.e. ha ⁻¹)
شاهد Control	44.21 (5.36)	55.08 (11.93)	70.12 (8.53)	89.49 (10.90)
سولفات آمونیوم Ammonium sulfate	14.30 (1.42)	18.44 (2.05)	18.32 (3.64)	28.66 (3.20)
نترات آمونیوم Ammonium nitrate	22.66 (3.63)	21.37 (2.02)	23.11 (2.86)	30.99 (3.47)
اسید سیتریک Citric acid	22.98 (3.70)	19.90 (2.59)	22.07 (3.12)	30.37 (3.91)
فسفات پتاسیم Potassium phosphate	26.78 (2.77)	30.01 (4.04)	40.31 (4.93)	195.18 (8.01)
میدان مغناطیسی Magnetic field	21.68 (2.66)	21.10 (2.26)	28.80 (6.63)	128.55 (8.39)
	R	R	R	R
	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.09	2.99	3.82	3.66
	1.95	2.58	3.03	2.40
	1.92	2.77	3.18	2.85
	1.65	1.84	1.74	2.28
	2.03	2.61	2.43	2.50

اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد هستند.

The standard errors are in parentheses.

افزودنی نرم‌کننده آب سخت استفاده شود. در این تحقیق مشخص شد که روش‌های نرم‌سازی آب سخت دارای کارایی مناسب در این جهت بوده‌اند. عملکرد سولفات آمونیوم و اسیدسیتریک در به حداقل رساندن واکنش کاتیون‌های مذکور با گلایفوسیت در مقایسه با دیگر روش‌های شیمیایی نرم‌سازی آب سخت بیشتر بود. اگرچه، روش فیزیکی نرم‌سازی آب سخت (میدان مغناطیسی) در مقایسه با فسفات پتاسیم و در برخی موارد از نیترات آمونیوم کارآمدتر ظاهر شد ولی در مقایسه با سولفات آمونیوم و اسید سیتریک دارای کارایی کمتری بود. از آنجایی که روش فیزیکی نهاده‌ی مصرف‌نشده‌ی است؛ لذا تقویت و بهینه‌سازی این روش دارای ارجحیتی در مقایسه روش‌های شیمیایی نرم‌سازی آب سخت، که نهاده‌ی مصرف‌شده‌ی آن، می‌باشد. از این‌رو، از نظر اکولوژیکی کاربرد روش فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در مقایسه با روش‌های شیمیایی سالم‌تر و ایمن‌تر به نظر می‌رسد. به همین سبب، برای تقویت سودمندی روش فیزیکی نرم‌سازی آب سخت در تحقیقات آینده، پیشنهادات ذیل احتمالاً مؤثر واقع خواهند شد: الف) کاربرد مواد پارامغناطیس به منظور تسهیل هسته‌زایی و تحریک کریستال‌زایی سریع و بیشتر کربنات‌های نمکی در محیط آب و ب) کاربرد نانو-فیلتر در مسیر خروجی جریان محلول به منظور جداسازی کریستال‌های تشکیل شده.

همانطور که قبلاً ذکر شد، کربنات کلسیم در داخل آب تشکیل دو نوع یون می‌دهد که عبارتند از کاتیون کلسیم (Ca^{2+}) و آنیون کربنات (CO_3^{2-}). کاتیون‌ها و آنیون‌ها به ترتیب به وسیله قطب شمال و جنوب آهن‌ربا جذب می‌شوند (Rashed-Mohassel et al., 2009). این عمل باعث می‌شود که تحت اثر میدان مغناطیسی کاتیون کلسیم و آنیون کربنات به تهیج آمده و در درون محیط آب متحد شده و تشکیل کریستال موقت کربنات کلسیم دهند (Coey and Cass, 2000). بدین ترتیب، این فرآیند از طریق کریستال‌سازی کربنات کلسیم، از حضور آزادانه کاتیون کلسیم در حامل پاشش آب سخت برای تشکیل کمپلکس کلسیم-علف‌کش جلوگیری می‌نماید. در نتیجه، مولکول علف‌کش به طور آزادانه درون حامل پاشش باقی می‌ماند تا به فعالیت زیستی خود یعنی کشتن علف‌هرز، پردازد (شکل ۲). به عنوان جمع‌بندی نهایی، وقتی از آب سخت، که دارای مقادیر بالایی از کاتیون (مانند منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم و آهن) است، برای تهیه محلول علف‌کش گلایفوسیت استفاده شد، کارایی آن در کنترل تاتوره کاهش یافت. قدرت ناسازگاری کاتیون‌های مورد آزمایش به ترتیب به صورت آهن < کلسیم < منیزیم < سدیم < پتاسیم بود. به همین سبب توصیه می‌شود که به منظور بهینه‌سازی مصرف علف‌کش‌های اسیدی ضعیف در چنین شرایطی از مواد



شکل ۲- نحوه عمل پیشنهادی برای روش فیزیکی نرم‌سازی آب سخت با استفاده از یک میدان مغناطیسی این مکانیسم در زمانی که از کربنات‌های سدیم، پتاسیم، منیزیم یا آهن برای تهیه آب سخت استفاده شود نیز قابل تعمیم است.

Figure 2- Proposed mechanism for hard water softening physical method by a magnetic field
This mechanism is generalized when K₂CO₃, Na₂CO₃, MgCO₃, or Fe₂(CO₃)₃ is used to prepare hard water.

سپاسگزاری

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد است. از خانم سمیه ابراهیم پور فرجی و آقای پرویز حسینی که در اجرای این تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

نتایج ارائه شده در این مقاله حاصل بخشی از رساله دکتری با شماره طرح: ۳/۲۳۲۹۳ در رشته علوم علف‌های هرز دانشکده

منابع

1. Akopian, S.N., & Aïrapetian, S.N. (2005). A study of specific electrical conductivity of water by the action of constant magnetic field, electromagnetic field, and low-frequency mechanical vibrations. *Biofizika* 50(2): 265–270.
2. Aliverdi, A., Ganbari, A., Rashed-Mohassel, M.H., Nassiri-Mahallati, M., & Zand, E. (2014). Overcoming the antagonistic effect from spray carrier minerals on imazethapyr activity. *Agronomy Journal* 106(5): 1569–1573. <https://doi.org/10.2134/agronj13.0514>.
3. Amiri, M., & Dadkhah, A. (2006). On reduction in the surface tension of water due to magnetic treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 278(1-3): 252–255. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2005.12.046>.
4. Andersen, R.N. (1968). *Germination and establishment of weeds for experimental purposes*. Weed Science Society of America, Urbana, IL, USA.
5. Bernards, M.L., Thelen, K.D., & Penner, D. (2005). Glyphosate efficacy is antagonized by manganese. *Weed technology*, 19(1), 27-34. <https://doi.org/10.1614/WT-03-193R2>.
6. Bin, G.U.O., HAN, H.B., & Feng, C.H.A.I. (2011). *Influence of magnetic field on microstructural and dynamic properties of sodium, magnesium and calcium ions*. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 21, s494-s498. [https://doi.org/10.1016/S1003-6326\(11\)61631-2](https://doi.org/10.1016/S1003-6326(11)61631-2).
7. Chang, K.T., & Weng, C.I. (2006). The effect of an external magnetic field on the structure of liquid water using molecular dynamics simulation. *Journal of Applied Physics* 100(4): 043917. <https://doi.org/10.1063/1.2335971>.
8. Coey, J.M.D., & Cass, S. (2000). Magnetic Water Treatment. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* 209(1-3): 71–74.
9. Devilliers, B.L., Kudsk, P., Smit, J.J., & Mathiassen, S.K. (2001). Tralkoxydim: adjuvant, MCPA and other effects. *Weed Research* 41(6): 547-556. <https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2001.00257.x>.
10. Devkota, P., & Johnson, W.G. (2016). Effect of carrier water hardness and ammonium sulfate on efficacy of 2,4-D choline and premixed 2,4-D choline plus glyphosate. *Weed Technology* 30(4): 878-887. <https://doi.org/10.1614/WT-D-16-00040.1>.
11. Fathi, A., Mohamed, T., Claude, G., Maurin, G., & Mohamed, B.A. (2006). Effect of a magnetic water treatment on homogeneous and heterogeneous precipitation of calcium carbonate. *Water Research* 40(10): 1941-1950. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.03.013>.
12. Gabrielli, C., Jaouhari, R., Maurin, G., & Keddad, M. (2001). Magnetic water treatment for scale prevention. *Water Research* 35(13): 3249-3259. [https://doi.org/10.1016/S0043-1354\(01\)00010-0](https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00010-0).
13. Hajmohammadnia Ghalibaf, K., Rashed Mohassel, M. H., Nassiri Mahallati, M., Zand, E., & Kudsk, P. (2014). Investigation on the influence of spray tank water quality on glyphosate performance and eliminate the adverse effects. *Weed Research Journal* 6(2): 105–120.
14. Hall, G.J., Hart, C.A., & Jones, C.A. (2000). Plants as sources of cations antagonistic to glyphosate activity. *Pest Management Science: formerly Pesticide Science* 56(4): 351-358. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1526-4998\(200004\)56:4<351::AID-PS151>3.0.CO;2-A](https://doi.org/10.1002/(SICI)1526-4998(200004)56:4<351::AID-PS151>3.0.CO;2-A).
15. Hoffmann, W.C., Bagley, W.E., Fritz, B.K., Lan, Y., & Martin, D.E. (2008). Effects of water hardness on spray droplet size under aerial application conditions. *Applied Engineering in Agriculture* 24(1): 11-14.
16. Khanjani, M., Mahmoodi, S., & Jami-Al-Ahmadi, M. (2010). Effect of density and relative time of emergence of Jimsonweed (*Datura stramonium* L.) on yield and yield components of Chittibeen (*Phaseolus vulgaris* L.). *Electronic Journal of Crop Production* 3(2): 215–228.
17. Kudsk, P., & Mathiassen, S.K. (2007). Analysis of adjuvant effects and their interactions with variable application parameters. *Crop Protection* 26(3): 328-334. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2005.06.012>.
18. Madsen, H.E.L. (2004). Crystallization of calcium carbonate in magnetic field in ordinary and heavy water. *Journal of Crystal Growth* 267(1-2): 251-255. <https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.03.051>.
19. Mahoney, K.J., Nurse, R.E., & Sikkema, P.H. (2014). The effect of hard water, spray solution storage time, and ammonium sulfate on glyphosate efficacy and yield of glyphosate-resistant corn. *Canadian Journal of Plant Science* 94(8): 1401-1405. <https://doi.org/10.4141/cjps-2014-13>.
20. Matysiak, R., & Nalewaja, J.D. (1999). Temperature, adjuvants, and UV light affect sethoxydim phytotoxicity. *Weed Technology* 13(1): 94-99. <https://doi.org/10.1017/S0890037X00044973>.

21. Molin, W.T., & Hirase, K. (2004). Comparison of commercial glyphosate formulations for control of prickly sida, purple nutsedge, morningglory and sicklepod. *Weed Biology and Management*, 4(3): 136-141. <https://doi.org/10.1111/j.1445-6664.2004.00130.x>.
22. Moosa, G.M., Khulaef, J.H., Khraibt, A.C., Shandi, N.R., & Al-Braich, M.S.K. (2015). Effect of magnetic water on physical properties of different kind of water, and studying its ability to dissolving kidney stone. *Journal of Natural Sciences Research*, 5(18):85-94.
23. Nalewaja, J.D., & Matysiak, R. (1991). Salt antagonism of glyphosate. *Weed Science* 39(4): 622-628. <https://doi.org/10.1017/S0043174500088470>.
24. Nandula, V.K., Poston, D.H., Reddy, K.N., & Koger, C.H. (2007). Formulation and adjuvant effects on uptake and translocation of clethodim in bermudagrass (*Cynodon dactylon*). *Weed Science* 55(1): 6-11. <https://doi.org/10.1614/WS-06-024.1>.
25. Nosratti, I., Alizade, H., & Mashhadi, H.R. (2012). Effect of some adjuvants in reducing antagonism of spray carrier water cations to 2, 4-D+MCPA efficacy on licorice (*Glycyrrhiza glabra* L.). *Annals of Biological Research* 3(6): 2631-2635.
26. Osati, K., & Nahvinia, M.J. (2016). Spatial variations of ground water quality in Birjand Plain for agriculture. *Environment and Water Engineering* 2(1): 25-36. (In Persian with English abstract)
27. Patton, A.J., Weisenberger, D.V., & Johnson, W.G. (2016). Divalent cations in spray water influence 2, 4-D efficacy on dandelion (*Taraxacum officinale*) and broadleaf plantain (*Plantago major*). *Weed Technology* 30(2): 431-440. <https://doi.org/10.1614/WT-D-15-00120.1>.
28. Penner, D. (2006). *Novel water conditioning agents for glyphosate*. In North Central Weed Science Society Proceedings (Vol. 61, p. 150).
29. Pratt, D., Kells, J.J., & Penner, D. (2003). Substitutes for ammonium sulfate as additives with glyphosate and glufosinate. *Weed Technology* 17(3): 576-581. [https://doi.org/10.1614/0890-037X\(2003\)017\[0576:SFASAA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1614/0890-037X(2003)017[0576:SFASAA]2.0.CO;2).
30. Rao, V.S. (2000). *Principles of weed science*, 2nd ed. Science Publishers, Enfield, NH.
31. Rashed-Mohassel, M.H., Aliverdi, A., & Ghorbani, R. (2009). Effects of a magnetic field and adjuvant in the efficacy of cycloxydim and clodinafop-propargyl on the control of wild oat (*Avena fatua*). *Weed Biology and Management* 9(4): 300-306. <https://doi.org/10.1111/j.1445-6664.2009.00354.x>.
32. Ritz, C., Baty, F., Streibig, J.C., & Gerhard, D. (2015). Dose-response analysis using R. *PloS One* 10(12): e0146021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146021>.
33. Roskamp, J.M., Chahal, G.S., & Johnson, W.G. (2013a). The effect of cations and ammonium sulfate on the efficacy of dicamba and 2,4-D. *Weed Technology* 27(1): 72-77. <https://doi.org/10.1614/WT-D-12-00106.1>.
34. Roskamp, J.M., Turco, R.F., Bischoff, M., & Johnson, W.G. (2013b). The influence of carrier water pH and hardness on saflufenacil efficacy and solubility. *Weed Technology* 27(3): 527-533. <https://doi.org/10.1614/WT-D-12-00154.1>.
35. Scroggs, D.M., Miller, D.K., Stewart, A.M., Leonard, B.R., Griffin, J.L., & Blouin, D.C. (2009). Weed response to foliar coapplications of glyphosate and zinc sulfate. *Weed Technology* 23(1): 171-174. <https://doi.org/10.1614/WT-08-103.1>.
36. Shahverdi, F., Montazeri, M., & Dianat, M. (2010). The effect of ammonium sulphate on efficacy of a few weak acidic herbicides. *Iranian Journal of Weed Science* 6(1): 113-121. (In Persian with English abstract)
37. Soltani, N., Nurse, R., Robinson, D., & Sikkema, P. (2011). Effect of ammonium sulfate and water hardness on glyphosate and glufosinate activity in corn. *Canadian Journal of Plant Science* 91(6): 1053-1059. <https://doi.org/10.4141/cjps2011-047>.
38. Somerville, A., Betts, G., Gordon, B., Green, V., Burgis, M., & Henderson, R. (2012). *Adjuvants: oils, surfactants and other additives for farm chemicals*. Grains Research and Development Corporation, Kingston, Australia.
39. Tai, C.Y., Chang, M.C., Shieh, R.J., & Chen, T.G. (2008). Magnetic effects on crystal growth rate of calcite in a constant-composition environment. *Journal of Crystal Growth* 310(15): 3690-3697. <https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2008.05.024>.
40. Thelen, K.D., Jackson, E.P., & Penner, D. (1995). The basis for the hard-water antagonism of glyphosate activity. *Weed Science* 43(4): 541-548. <https://doi.org/10.1017/S0043174500081613>.
41. Toledo, E.J., Ramalho, T.C., & Magriotis, Z.M. (2008). Influence of magnetic field on physical-chemical properties of the liquid water: Insights from experimental and theoretical models. *Journal of Molecular Structure* 888(1-3): 409-415. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2008.01.010>.
42. Wills, G.D., Hanks, J.E., Jones, E.J., & Mack, R.E. (1998). Effect of oil adjuvants and nitrogen fertilizer on the efficacy of imazethapyr applied at conventional and ultralow spray volumes. *Weed Technology* 12(3): 441-445. <https://doi.org/10.1017/S0890037X00044110>.
43. Young, B.G., Knepp, A.W., Wax, L.M., & Hart, S.E. (2003). Glyphosate translocation in common lambsquarters (*Chenopodium album*) and velvetleaf (*Abutilon theophrasti*) in response to ammonium sulfate. *Weed Science* 51(2): 151-156. [https://doi.org/10.1614/0043-1745\(2003\)051\[0151:GTICLC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1614/0043-1745(2003)051[0151:GTICLC]2.0.CO;2).