

اثر علف‌کش‌های مختلف بر کنترل اویارسلام ارغوانی (*Cyperus rotundus*) (L. در پیاز (*Allium cepa* L.))

محمد روزخش^۱، مهدی راستگو*^۲، کمال حاج محمدنیا قالی‌باف^۲، بهروز خلیل طهماسبی^۳، احمد آئین^۳

۱: دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز، ۲: عضو هیأت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ۳: عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان (جیرفت)
*: نویسنده مسئول: مهدی راستگو Email: m.rastgoo@um.ac.ir

چکیده

اویارسلام ارغوانی (*Cyperus rotundus* L.) یکی از مشکل‌سازترین علف‌های هرز موجود در مزارع پیاز (*Allium cepa* L.) در جنوب کرمان است و تاکنون علف‌کش اختصاصی برای کنترل آن در مزرعه پیاز گزارش نشده است. به‌منظور ارزیابی تأثیر چند علف‌کش، آزمایشی دو ساله (۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در مزارع کشت و صنعت جیرفت انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آلایل ایزو تیوسیانات (دامینوس) و کلرتال دی متیل (داکتال) به‌صورت قبل از کاشت، بنتازون + ام‌سی‌پی آ (بازاگران ام ۶۰) پنوکسالام (ریزلان)، آیوکسینیل (توتریل)، اگزادپازون (رونستار)، گلایفوسیت + توفوردی + ام-سی‌پی آ (رانداپ + یو ۴۶ کمبی‌فلوئید) به‌صورت پس رویشی، شاهد (عاری از علف هرز) و شاهد (آلوده به علف هرز) بودند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها در صفات تراکم ساقه، تراکم غده، وزن خشک اندام هوایی و زیر زمینی اویارسلام ارغوانی، قطر گردن پیاز، متوسط وزن پیاز و عملکرد پیاز وجود داشت. **برترین تیمار آزمایشی طی دو سال آزمایش از نظر میزان عملکرد پیاز علفکش آلایل ایزوتیوسیانات با ۷۰/۶۶۱ و ۷۰/۵۴۲ تن در هکتار بود.** میزان افت عملکرد پیاز در اثر رقابت اویارسلام ارغوانی (تیمار شاهد آلوده) نسبت به تیمار شاهد عاری از علف هرز، در دو سال آزمایش به ترتیب ۸۹/۵۳ و ۸۹/۷۳ درصد بود. **لذا مؤثرترین تیمار علف‌کشی کاربرد آلایل ایزوتیوسیانات به مقدار ۲۸۰ لیتر در هکتار بود که توانست تراکم و وزن خشک علف هرز اویارسلام را به میزان ۱۰۰ درصد کاهش دهد.**

کلمات کلیدی: پیاز، جگن، عملکرد، علف‌کش زیستی، نشاء

مقدمه

پیاز (*Allium cepa* L.) یکی از مهم‌ترین محصولات سبزی در جهان است به طوری که بعد از سیب‌زمینی (*Solanum tuberosum*) و گوجه‌فرنگی (*Lycopersicon esculentum*) در رده سوم قرار می‌گیرد و مردم سراسر دنیا از آن تغذیه می‌کنند (FAO Stat, 2021). ایران مقام پنجم جایگاه تولید پیاز را در جهان به خود اختصاص داده است (FAO, 2021). سطح زیر کشت پیاز در منطقه جنوب کرمان بالغ بر ۱۱۳۰۰ هکتار است. این منطقه با میانگین تولید ۶۲۱۵۰۰ تن پیاز در سال، رتبه اول تولید در کشور را به خود اختصاص داده است (Anonymous, 2021). به دلیل گستردگی سطح زیر کشت و همچنین میزان تولید، پیاز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد و اشتغال‌زایی در جنوب کرمان و ایران ایفا می‌نماید (Khalghani, 2019).

در سراسر جهان خسارت علف‌های هرز در مزرعه پیاز بین ۲۶ تا ۹۴/۷ درصد تخمین زده شده است (Rameshwar *et al.*, 2001)، بسته به تنوع گونه‌ای، تراکم و فراوانی نسبی علف‌های هرز و نیز بسته به شدت و مدت رقابت خسارت علف‌های هرز در مزارع پیاز در مواردی تا ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۹۶ درصد (Mishra, 1986; Kropff & Spitters, 1991; Bond & Burston, 1996; Qasem, 2006) گزارش شده است. در تمامی تحقیقات صورت گرفته، وجین دستی علف‌های هرز به‌عنوان برترین تیمار با بالاترین عملکرد پیاز گزارش گردیده ولی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم وجود نیروی کارگری در مزارع وسیع اقتصادی نیست (Daneshvar, 2006). از این رو یکی از بهترین راهکارها برای کنترل علف‌های هرز در مزارع پیاز کنترل شیمیایی است. علف‌کش‌های ثبت شده در کشور برای کنترل علف‌های هرز در مزرعه پیاز شامل آیوکسینیل، اکسی فلورفن، اگزادیازون، پندیمتالین، کلرتال دی متیل، سیکلوکسیدیم، ستوکسیدیم و هالوکسی فوپ آر متیل استر مورد استفاده قرار می‌گیرند (Sankar *et al.*, 2015; Mburu *et al.*, 1997). کنترل اویارسلام ارغوانی به دلیل عدم انتقال علف‌کش‌ها به داخل غده اغلب ناکارآمد است (Miles *et al.*, 2002). اویارسلام ارغوانی در رقابت با ۵۰ نوع گیاه زراعی و در بیش از ۹۲ کشور به‌عنوان علف هرز مهم به ثبت رسیده است (Holm *et al.*, 1997). پراکنش گسترده، تولید غده بسیار و قابلیت رقابتی بالا در این گیاه باعث شده است که به‌عنوان یک علف هرز خطرناک برای دنیا به شمار آید (Holm *et al.*, 1997; Roozkhosh *et al.*, 2017). اویارسلام از طریق رقابت بر سر آب، مواد غذایی، نور و همچنین آلوپاتی، به گیاه زراعی خسارت شدید وارد می‌کند، این علف هرز به‌طور ویژه در تولید زراعت پیاز مشکل‌ساز است و قادر است عملکرد پیاز را ۵۵ تا ۸۴ درصد کاهش دهد (Ransom *et al.*, 2004; El-Metwally & Shalaby 2019; Minz *et al.*, 2018). تاکنون تلاش‌های بسیار زیادی برای کنترل اویارسلام ارغوانی در محصول پیاز صورت گرفته اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است، وجود گرما و رطوبت کافی مصادف با کشت زودهنگام خارج از فصل پیاز (شهریور) در جنوب کرمان شرایط مناسبی برای رشد سریع و

تکثیر مجدد اویارسلام ارغوانی فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که کنترل آن از طریق وجین دستی هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد (۶۰ میلیون تومان در هر هکتار) و از سوی دیگر استفاده از ادوات مکانیکی برای کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی باعث افزایش جوانه‌زنی و تحریک رشد غده و پراکنش مکانی آن‌ها شده است و این‌گونه در مزارع پیاز به یک مشکل جدی برای کشاورزان جنوب کرمان تبدیل شده است، همچنین یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه عدم وجود علف‌کش اختصاصی برای کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی در زراعت پیاز است (Sankar *et al.*, 2015). آلایل ایزوتیوسیانات (دامینوس) از سال ۲۰۰۹ توسط آزمایش‌های ایساگرو برای کاربردهای مختلف در خاک مورد استفاده قرار گرفت، این محصول توسط آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا (EPA) به‌عنوان آفت‌کش زیستی ثبت شده است (Isagro, 2016). در بسیاری از کشورهای پیشرفته بلافاصله پس از بررسی‌های اولیه و حصول نتایج موفقیت‌آمیز، این آفت‌کش زیستی^۱ به‌سرعت جایگزین متیل بروماید شد. از مزایای بسیار خوب این آفت‌کش زیستی می‌توان به تحمل تمام محصولات زراعی نسبت به آن، کنترل طیف وسیعی از آفات خاکزی شامل بیماری‌های قارچی، علف‌های هرز و حشرات، عدم بقایا در خاک، سالم بودن آن برای محیط‌زیست و عدم تخریب لایه ازن دانست (Vig *et al.*, 2009). این آفت‌کش طبیعی از سال ۲۰۰۹ در ایالات متحده آمریکا (کالیفرنیا، کارولینای شمالی، فلوریدا و جورجیا) به‌صورت مداوم مورد بررسی قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی از کاربرد این ماده در حفاظت گیاهان (کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) زراعی حاصل شده است (Bangarwa *et al.*, 2011; Devkota & Norsworthy, 2014). جیالین و همکاران (Jialin *et al.*, 2019) بیان کردند که کاربرد آلایل ایزوتیوسیانات باعث کنترل مؤثری در بیماری‌های خاکزاد مانند فوزاریوم، نماتد *Meloidogyne spp.* و کنترل اویارسلام ارغوانی (*Cyperus rotundus*) و اویارسلام زرد (*Cyperus esculentus*) در کشت گوجه‌فرنگی شده است. در نتیجه بررسی تأثیر تیمار علف‌کش‌های اگزادیازون و بنتازون روی کنترل اویارسلام ارغوانی در جنوب کرمان کمترین مقدار زیست‌توده اویارسلام ارغوانی در کرت‌های مورد آزمایش نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز مشاهده شد (Rafiee sarbijan nasab *et al.*, 2020). علف‌کش جدید پنوکسولام از خانواده شیمیایی تریازولوپیریمیدین سولفونامید، گروه بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) است و برای کنترل توأم سوروف (*Echinochloa crus-galli*)، جگن‌ها و پهن‌برگ‌ها در مزارع برنج توصیه شده است. علف‌کش ذکر شده از طریق ریشه، ساقه و برگ قابل جذب بوده و در گیاه به‌صورت سیمپلاست و آپوپلاست قابل انتقال است (Williams *et al.*, 2005). در آزمایشی که برای کنترل علف‌های هرز پیاز در روسیه انجام شد نشان داده شد که کاربرد علف‌کش کلرتال دی متیل (داکتال) به میزان ۱۶ کیلوگرم در هکتار پس از کاشت پیاز، تأثیر عالی بر کنترل علف‌های هرز در اوایل فصل رشد داشت و تا پایان فصل کاشت وجین دستی صورت

¹ Biopesticide

نگرفت (Alirzaev, 1989). کاربرد علف‌کش آیوکسینیل به میزان ۲ کیلوگرم در هکتار در مزرعه پیاز سبب کاهش علف‌های هرز دولپه به میزان ۶۹ تا ۸۴ درصد شده است (Lebedinskii, 1994). همچنین در گزارشی کاهش تراکم، زیست‌توده اندام هوایی و زیرزمینی اوپارسلام ارغوانی توسط علف‌کش اگزادیازون (رونستار) در مزرعه پیاز گزارش شده است (Qasem, 2006; Rafiee sarbijan nasab *et al.*, 2020). لذا این تحقیق به منظور بررسی کارایی علف‌کش‌های منتخب در کنترل علف هرز اوپارسلام ارغوانی در مزارع پیاز نشایی، ارزیابی اثر آلایل ایزوتیوسیانات و تعیین میزان خسارت احتمالی و معرفی علف‌کش‌هایی با کمترین خسارت روی محصول پیاز انجام شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در جنوب استان کرمان در مزارع کشت و صنعت جیرفت با طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۴۱ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه شمالی که دارای آب‌وهوای گرم و مرطوب با ارتفاع ۶۲۴ متر از سطح دریا انجام شد. با توجه به اینکه اوپارسلام ارغوانی به‌عنوان علف هرز خسارت‌زا در مزرعه پیاز جنوب کرمان است، این آزمایش به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین علف‌کش با حداکثر عملکرد در مزارع پیاز به روش کاشت نشایی طی دو سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲، با مشخصات تیمارهای مورد آزمایش در جدول (۱) صورت گرفت.

جدول ۱. فهرست و مشخصات سموم علف‌کش مورد استفاده در آزمایش طی مدت دو سال آزمایش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

Table 1. List and specifications of herbicides used in this experiment (2021-2021)			
Herbicide	Trade name	Application time	Application rate (ha ⁻¹)
Allyl isothiocyanate	Dominus (SL)	Pre Plant	280L (Isagro, 2016)
Penoxsulam	Rezlan	Post emergence	49g (Zand <i>et al.</i> , 2019)
Ioxynil	Totril	Post emergence	3L (Zand <i>et al.</i> , 2019)
Oxadiazon	Ronstar	Pre emergence	3L (Zand <i>et al.</i> , 2019)
Dimethyl tetrachloroterephalate	Dacthal	Pre Plant	7000 g (Zand <i>et al.</i> , 2019)
		Post emergence	
Glyphosate + 2,4-D + MCPA	Roundup + U,46 combi fluid	Weed and Preplant	4 L + 2 L (Zand <i>et al.</i> , 2019)
		Onion	
Bentazon+ MCPA	Basagran M60	Post emergence	2.5 L (Zand <i>et al.</i> , 2019)

بعد از انتخاب محل اجرای آزمایش برای کشت پیاز، به منظور مشخص نمودن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه کشت و صنعت، قبل از آماده سازی زمین از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری نمونه برداری خاک انجام شد نتایج آنالیز خاک در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول ۲- نتایج تجزیه خاک (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی) محل اجرای آزمایش طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰-۱۴۰۱).

Table 2- Results of soil analysis (Physical and chemical characteristic) at Location of the experiment (2021-2022)

Soil texture	EC (dS/m)	K (ppm)	P (ppm)	N (%)	Organic carbon (%)	pH	Depth (cm)
Sandy loam (2021)	1.66	368.63	4.2	0.023	0.115	7.6	0-30cm
Sandy loam (2022)	1.43	409.41	3.9	0.045	0.119	7.4	0-30 cm

به منظور انجام این آزمایش طی دو سال زراعی در مهرماه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ زمینی که دارای سابقه آلودگی شدید به علف هرز اویارسلام ارغوانی بود انتخاب شد. قبل از اجرای آزمایش عملیات آماده سازی خاک با استفاده از دستگاه های خاکورزی انجام شد. هر کرت شامل چهار جوی و پشته به طول هشت متر و عرض ۲۴۰ سانتی بود، فاصله بین شیارها ۳۰ سانتیمتر و بر روی هر پشته چهار ردیف کاشت پیاز در نظر گرفته شد. کاشت در طی دو سال زراعی در تاریخ ۳۰ مهرماه طبق عرف منطقه انجام شد. برای تهیه نشاء رقم مینروا از بذوری که در منطقه سردسیر جیرفت در اول مردادماه طی دو سال آزمایش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کشت شدند استفاده شد، به طوری که بعد از هشت هفته نشاءهایی با ارتفاع تقریباً ۲۰ سانتی متر در تاریخ ۳۰ مهرماه به مزرعه انتقال داده شدند. به دلیل محبوبیت بالا در بین بازارهای جهانی و کشاورزان جنوب استان کرمان از رقم مینروا به صورت کاشت نشاء استفاده گردید.

با توجه به زمان کاربرد (پیش کاشت، پیش رویشی و پس رویشی) علف کش با دز مناسب اعمال شد (جدول ۱)، علف کش ها با سم پاش پشتی لانس دار مدل ماتابی، مجهز به نازل شره ای و با فشار دو بار، با حجم پاشش ۴۰۰ لیتر آب در هکتار به کار برده شدند. زمان سم پاشی تیمارهای علف کشی پس رویشی دو هفته پس از کشت یا زمانی که علف های هرز در مرحله دو تا چهار برگی بودند صورت گرفت. نحوه اعمال آفت کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات (تزریق دامینوس) یک روز قبل از تیمار آلایل ایزوتیوسیانات و پس از فرآیند آماده سازی خاک مزرعه، با استفاده از آبیاری قطره ای رطوبت خاک به ۹۰ درصد ظرفیت زراعی رسانده شد. آبیاری با دقت و یکنواخت صورت گرفت و این اطمینان حاصل شد که آب به مقدار کافی به غده ها برای جوانه زنی رسیده است.

در زمان اعمال تیمار آفت‌کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات خاک مزرعه (عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتر) در حد ظرفیت زراعی رسانده شد. (Isagro, 2016)، علف‌کش با استفاده از سمپلر از گالن برداشت و به‌صورت تزریقی به کرت‌های مورد آزمایش افزوده شد. برای جلوگیری از فراربت ماده آلایل ایزوتیوسیانات روی کرت‌ها (به مساحت ۲۴۰ سانتی‌متر) به مدت ۱۰ روز با پلاستیک پوشانده شد و پس از این مدت‌زمان نایلون‌ها از سطح خاک برداشته و اقدام به کشت نشاء شد.

به‌منظور بررسی اثر گیاه‌سوزی تیمارهای مورد استفاده، ارزیابی خسارت چشمی در دو نوبت ۱۵ روز و ۳۰ روز پس از اعمال تیمارهای مختلف علف‌کشی بر اساس روش استاندارد کمیته پژوهش علوم علف‌های هرز اروپا (EWRC) روی محصول پیاز بر اساس جدول (۳) صورت گرفت (Sandral et al., 1997).

جدول ۳- ارزیابی چشمی تأثیر علف‌کش‌ها بر روی گیاه زراعی پیاز بر اساس روش استاندارد کمیته پژوهش علوم علف‌های هرز اروپا (EWRC)

Table3- Visual evaluation the effect of herbicides on onion crop based on the standard method of the European Weed Research Committee (EWRC).

explanation	Damage to onion	Rating scale
بدون خسارت یا کاهش عملکرد پیاز No damage or reduction in onion yield	0	1
خسارت و رنگ‌پریدگی بسیار کم و یا علائم خفیف مشابه Very slight effects; discoloration or similar mild symptoms	1-2.5	2
خسارت کمی شدیدتر ولی ناپایدار بر پیاز Slightly more severe damage but unstable in onion	3.7-7	3
خسارت متوسط و پایدارتر بر پیاز Moderate damage and more stable in onion	7-12.5	4
خسارت متوسط و پایدار بر پیاز Moderate damage and persistent in onion	12.5-20	5
خسارت سنگین بر پیاز Heavy damage in onion	20-30	6
خسارت بسیار سنگین بر پیاز Very heavy damage in onion	30-50	7
خسارت در حد نابودی کامل پیاز Damage to the extent of the destruction in onion	50-99	8
نابودی کامل پیاز Total loss of onion and yeild	100	9

برای بررسی تأثیر آلایل ایزوتیوسیانات و دیگر علف‌کش‌ها بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی و همچنین کاشت پیاز نشایی، نمونه‌برداری در پایان فصل رشد پیاز، طی دو سال زراعی انجام شد. در هر کرت قبل از برداشت پیاز، ابتدا تراکم اویارسلام ارغوانی با استفاده از کوادرات ۰/۵ در ۰/۵ مترمربع برآورد گردید، همچنین در هر کوادرات تعداد و وزن غده‌ها از عمق ۰ تا ۴۰ سانتی‌متری سطح خاک محاسبه شد. بعد از انتقال

نمونه‌ها به آون، وزن خشک اندام‌های هوایی و زیرزمینی پس از ۷۲ ساعت اندازه‌گیری و توزین گردید. برای تعیین صفات مرتبط با پیاز شامل، متوسط وزن پیاز به صورت تصادفی در هر کرت، قطر گردن پیاز و برای افزایش دقت و حذف اثرات حاشیه‌ای عملکرد محصول پیاز از دو خط کشت وسط از هر کرت آزمایشی به طول ۴ مترمربع برداشت انجام شد.

تجزیه آماری داده‌ها به وسیله نرم‌افزار Genstat ver.9 و مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون کمترین اختلاف معنی‌دار FLSD در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. همچنین نمودارها نیز با نرم‌افزار Excel رسم شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر علف‌کش‌های مختلف بر تعداد غده، تعداد ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و زیر زمینی اویارسلام ارغوانی، قطر گردن پیاز، میانگین وزن پیاز و عملکرد پیاز طی دو سال آزمایش معنی‌دار بود ($P \leq 0.01$) (جدول ۴).

جدول ۴: تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مرتبط با رشد اویارسلام ارغوانی و پیاز تحت تأثیر تیمارهای مختلف کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱).

Table 4. Analysis of variance of measured traits of onion set and *Cyperus rotundus* under the influence of different weed control treatments of *Cyperus rotundus* (2021-2022).

source of Variation (S.O.V)	Df	Number of Tuber of purple nutsedge	Number of shoot of purple nutsedge	Shoot dry weight of purple nutsedge	Below ground organs dry weight of purple nutsedge	Onion Yield	Average of onion bulb weight	Onion neck diameter
Year	1	163.87 ^{ns}	354.68 ^{ns}	106.14 ^{ns}	24.97 ^{ns}	1.043 ^{ns}	40701.83 ^{ns}	0.0319 ^{ns}
Block(Year)	2	16.10	13.39	2.98	2.15	5.52	495.46	2.99
Treatments	8	5484.84 ^{**}	10215.56 ^{**}	5517.26 ^{**}	617.97 ^{**}	3270.32 ^{**}	2642002.40 ^{**}	360.68 ^{**}
* Treatment Year	8	17.54 ^{ns}	32.88 ^{ns}	6.23 [*]	5.32 ^{**}	1.37 ^{ns}	3315.9 [*]	1.58 ^{ns}
ErrorII	32	16.93	26.44	2.26	1.48	2.99	1282.03	2.70
C. V. (%)	-	16.50	13.46	5.33	16.70	3.38	2.60	7.01

*, ** and ns: significant at 5% and 1% of probability levels and non-significant, respectively.

تراکم اندام‌های هوایی اویارسلام ارغوانی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که علف‌کش‌های مختلف تأثیر معنی‌داری بر صفات موردبررسی اویارسلام ارغوانی شامل تراکم ساقه، وزن تر و خشک اندام‌های هوایی، تراکم غده و وزن خشک اندام‌های زیرزمینی در دو سال

زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ داشتند. مقایسه میانگین نشان داد تیمار کاربرد علفکش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات به عنوان برترین تیمار برای کنترل اویارسلام ارغوانی در کرت‌های مورد آزمایش طی دو سال آزمایش بود و با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری را نشان نداد، اما با سایر تیمارهای آزمایش اختلاف معنی‌داری داشتند (جدول ۵). محلول علفکش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات از طریق سیستم نوار تیپ که برای آبیاری مزرعه بکار رفته بود به خاک تزریق شد، لذا اعمال این محلول با کمترین هزینه انجام گرفت. اما باید در نظر گرفت که هزینه اعمال علفکش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات در مجموع ۱۸۶ میلیون ریال که شامل ۱۲۰ میلیون ریال پلاستیک، ۵۶ میلیون ریال علفکش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات و ۱۰ میلیون ریال برای اعمال پلاستیک در سطح مزرعه بود برآورد گردید. در صورتی که بیشترین هزینه برای کنترل اویارسلام ارغوانی در یک هکتار مربوط به تیمار وجین دستی با ۶۰۰ میلیون ریال محاسبه گردید. با توجه به هزینه اعمال تیمار علفکش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات و مقایسه‌ی افزایش عملکرد پیاز و کنترل کامل اویارسلام ارغوانی نسبت به سایر تیمارها، کاربرد این تیمار رضایت‌بخش بود. بیشترین تراکم ساقه اویارسلام ارغوانی در تیمار شاهد آلوده به علف هرز در طی دو سال زراعی به ترتیب با ۱۱۳/۶۶ و ۱۲۵/۶۶ بوته در مترمربع و کمترین تعداد ساقه اویارسلام ارغوانی در تیمار علفکشی آلیل ایزوتیوسیانات بدون هیچ‌گونه تولید ساقه‌ای در مترمربع مشاهده شد و تعداد ساقه اویارسلام ارغوانی را نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز، ۱۰۰ درصد کاهش داد (جدول ۵ و شکل ۱). اعمال علفکش فوق باعث کاهش شدید تراکم اویارسلام ارغوانی شد و به عنوان برترین تیمار مورد آزمایش در کرت‌های پیاز انتخاب شد (شکل ۱). استفاده از آلیل ایزوتیوسیانات باعث کنترل مؤثری در بیماری‌های خاکزاد مانند فوزاریوم، نماتد *Meloidogyne spp.* و کنترل اویارسلام ارغوانی (*Cyperus rotundus*) و اویارسلام زرد (*Cyperus esculentus*) در کشت گوجه‌فرنگی شده است (Jialin et al, 2019). در بین تیمارهای آزمایشی پس از تیمار شاهد آلوده به علف هرز، بیشترین تراکم ساقه اویارسلام ارغوانی از علفکش داکتال در هر دو سال آزمایش با ۹۸/۳۳ و ۱۱۰/۶۶ عدد و سپس مخلوط علفکش گلایفوسیت + توفوردی با ۵۱ و ۵۵ عدد ساقه در مترمربع برآورد گردید (جدول ۵)، بدین ترتیب، نتایج این آزمایش نشان داد که علفکش داکتال قادر به کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی در زراعت پیاز نیست.

جدول ۵. تأثیر تیمارهای مختلف علف‌کشی بر صفات اویارسلام ارغوانی در منطقه جیرفت طی دو سال آزمایش (۱۴۰۱ و ۱۴۰۰)

Table 5. The effect of different herbicide treatments on purple nutsedge trait at harvest time in 2021 and 2022.

Year	Treatment	Stem density (no. m ⁻²)	Tuber density (no. m ⁻²)	Aboveground fresh weight (g m ⁻²)	Aboveground dry weight (g m ⁻²)	Belowground fresh weight (g m ⁻²)	Belowground dry weight (g m ⁻²)
	allyl isothiocyanate	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^f	0.00 ^e
	Bentazon + MCPA	36.66 ^{de}	23.66 ^b	65.40 ^{cd}	30.50 ^d	16.30 ^c	8.20 ^b

2021	Dimethyl tetrachloroterephthalate	98.33 ^b	75.00 ^a	157.00 ^b	77.10 ^b	47.00 ^a	23.63 ^a
	Penoxsulam	24.33 ^f	8.00 ^{de}	46.60 ^f	19.70 ^e	3.90 ^e	1.30 ^{de}
	Oxadiazon	38.66 ^d	15.66 ^c	64.03 ^c	29.56 ^d	8.83 ^d	4.16 ^c
	Ioxynil	30.00 ^{ef}	15.00 ^{cd}	57.70 ^e	20.70 ^e	6.40 ^{de}	2.40 ^{cd}
	Glyphosate + 2,4-D	51.00 ^c	29.33 ^b	71.43 ^c	33.66 ^c	19.73 ^b	9.06 ^b
	Weed free	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^f	0.00 ^e
	Weedy	113.66 ^a	77.00 ^a	173.00 ^a	83.60 ^a	49.26 ^a	24.70 ^a
LSD (0.05)		10.61	7.62	8.33	2.47	4.55	2.26
2022	allyl isothiocyanate	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^g	0.00 ^g	0.00 ^g	0.00 ^f
	Bentazon + MCPA	44.00 ^d	26.66 ^c	72.40 ^{cd}	34.70 ^{cd}	17.60 ^c	9.20 ^c
	Dimethyl tetrachloroterephthalate	110.66 ^b	82.00 ^a	171.66 ^b	82.16 ^b	59.23 ^a	27.90 ^b
	Penoxsulam	31.33 ^f	10.00 ^e	51.13 ^f	22.53 ^f	4.80 ^{ef}	1.40 ^{ef}
	Oxadiazon	41.00 ^{de}	18.00 ^d	67.10 ^{de}	32.94 ^d	9.83 ^d	4.73 ^d
	Ioxynil	35.00 ^{ef}	18.00 ^d	62.46 ^e	25.70 ^e	8.50 ^{de}	3.20 ^{de}
	Glyphosate + 2,4-D	55.00 ^c	36.66 ^b	75.60 ^c	36.06 ^c	23.83 ^b	10.23 ^c
Weed free	0.00 ^g	0.00 ^f	0.00 ^g	0.00 ^g	0.00 ^g	0.00 ^f	
Weedy	125.66 ^a	87.00 ^a	183.23 ^a	88.20 ^a	61.20 ^a	30.23 ^a	
LSD (0.05)		10.44	7.82	8.30	3.07	4.20	2.36

Means with the same letters in each column do not differ significantly according to the LSD test at $p \leq 0.05$.



شکل ۱- مقایسه آلودگی علف هرز اویارسلام ارغوانی در مزرعه پیاز کشت و صنعت جیرفت بین تیمار شاهد آلوده به علف هرز (چپ) و کاربرد علف کش آلیل ایزوتیوسیانات (سمت راست) (عکس از نویسنده)

Figure 1- Comparison of weed infestation of purple nutsedge in onion field of Jiroft Agro-industry between weed infested control treatment (left), application of allyl isothiocyanate herbicide (right) (Photo by Author)

جدول ۶. ارزیابی خسارت چشمی تیمارهای مختلف علف کشی بر روی گیاه پیاز در مزارع کشت و صنعت جیرفت طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)

Table 6. Evaluation onion visual injury in herbicide treatments in Jiroft Agro-Industrial Farms in onion in 2021 and 2022.

Treatment	Application time	Onion visual injury (%)	
		2021	2022

allyl isothiocyanate	Pre Plant	0 ^e	0 ^f
Ioxynil	Post emergence	17.33 ^c	16.66 ^d
Bentazon + MCPA	Post emergence	5 ^d	5 ^e
Dimethyl tetrachloroterephthalate	Pre Plant	0 ^e	0 ^f
Penoxsulam	Post emergence	30 ^b	35 ^b
Oxadiazon	Pre emergence	18.33 ^c	21.66 ^c
Glyphosate + 2,4-D	Post emergence Weed and Preplant Onion	38.33 ^a	41.66 ^a
Weed free	Not applicable	0 ^e	0 ^f
Weedy	Not applicable	0 ^e	0 ^f

وزن تر و خشک اندام هوایی اویارسلام ارغوانی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر علف‌کش‌های مختلف بر وزن تر و خشک اندام هوایی اویارسلام ارغوانی در هر دو سال آزمایش معنی‌دار بود ($P \leq 0.01$) (جدول ۴). بر اساس مقایسه میانگین‌های وزن تر و خشک اندام هوایی (جدول ۵) می‌توان اذعان نمود که در هر دو سال آزمایش علف‌کش آلایل ایزوتیوسیانات دارای کمترین وزن تر و خشک اویارسلام ارغوانی (صفر گرم - صفر گرم)، در کرت‌های مورد آزمایش بوده و با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری نداشت. به‌طور کلی تمام علف‌کش‌های مورد آزمایش به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به ترتیب وزن تر و خشک اندام هوایی اویارسلام ارغوانی را نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز به ترتیب به میزان ۱۷۳ گرم و ۱۸۳/۶۰ گرم در مترمربع در سال اول و ۱۸۳/۲۳ و ۸۸/۲۰ گرم در مترمربع در سال دوم کاهش دادند (جدول ۵)، کاربرد علف‌کش آلایل ایزوتیوسیانات باعث کاهش شدید زیست‌توده اویارسلام ارغوانی شد و بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی اویارسلام ارغوانی در تیمار علف‌کش داکتال به ترتیب با ۱۵۷ و ۷۷/۱۰ گرم در مترمربع و ۱۷۱/۶۶ - ۸۲/۱۶ گرم در مترمربع در هر دو سال آزمایش به دست آمد (جدول ۵). سایر تیمارهای علف‌کشی شامل اگزادپازون با ۶۴/۶۴ و ۶۲/۶۵ درصد، آیوکسینیل ۷۵/۲۳ و ۷۰/۸۶ درصد، گلایفوسیت + توفوردی ۵۹/۷۳ و ۵۹/۱۱ درصد، پنوکسالام ۷۲/۴۴ و ۷۴/۴۵ درصد و بنتازون + ام‌سی‌پی آ ۶۳/۵۱ و ۶۰/۶۵ درصد، وزن خشک اندام هوایی اویارسلام ارغوانی را نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز، به ترتیب طی دو سال آزمایش کاهش دادند (جدول ۵). پژوهش صورت گرفته در روسیه با کاربرد علف‌کش کلرتال دی متیل (داکتال) به میزان ۱۶ کیلوگرم در هکتار بعد از کاشت پیاز و کاربرد علف‌کش آیوکسینیل (توتریل) به میزان ۱/۲ لیتر در هکتار در مرحله سه تا پنج‌برگی و یا ۱/۵ لیتر در هکتار در مرحله هفت تا نه برگی سبب کنترل مؤثر علف‌های هرز در اوایل فصل رویش شد و نتایج این پژوهش باعث شد در طی فصل رشد وجین دستی صورت نگیرد (Alirzaev, 1989).

تعداد غده اویارسلام ارغوانی

مقایسه میانگین تعداد غده اویارسلام ارغوانی در هر مترمربع (جدول ۵) نشان داد که بین تیمار علف‌کش آلایل ایزوتیوسیانات با تیمار شاهد عاری از علف هرز هیچ اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. سبز نشدن ساقه اویارسلام در کرت‌های تیمار شده با آلایل ایزوتیوسیانات نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز با ۷۷ و ۸۷ غده در مترمربع طی دو سال آزمایش حاکی از کاهش صددرصدی تولید غده است (جدول ۵ و شکل ۲). همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که آفت‌کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات در کنترل نماتدها (Wu *et al*, 2011)، علف‌های هرز (Noble *et al*, 2002), (Devkota and Norsworthy, 2014), (Bangarwa *et al*, 2011) و پاتوژن‌های خاکزی گیاهی (Gilardi *et al*, 2000) به‌صورت قابل توجه‌ای مؤثر است. در بین تیمارها طی دو سال موردبررسی، تیمار داکتال با تولید بیشترین تعداد غده با ۷۵ و ۸۲ عدد در مترمربع در هر **کادر** به‌عنوان ضعیف‌ترین تیمار ارزیابی گردید، همچنین داده‌ها نشان داد که بین تیمار داکتال با تیمار شاهد آلوده به علف هرز اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (جدول ۵). به عبارات دیگر کاربرد علف‌کش داکتال هیچ‌گونه تأثیری بر کنترل تعداد غده اویارسلام ارغوانی طی دو سال آزمایش نداشت، همچنین تیمارهای علف‌کشی مورد آزمایش شامل اگزادیازون با ۷۹/۶۶ و ۷۹/۳۱ درصد، آیوکسینیل با ۸۰/۵۲ و ۷۹/۳۱ درصد، گلایفوسیت + توفوردی با ۶۱/۷۳۹۰ و ۵۷/۸۶ درصد، پنوکسالام با ۸۹/۶۱ و ۸۸/۵۰ درصد و بنتازون + ام‌سی‌پی آ ۶۹/۲۷ و ۶۹/۳۵ درصد، تعداد غده اویارسلام ارغوانی را نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز، به ترتیب طی دو سال آزمایش کاهش دادند (جدول ۵).



شکل ۲- مقایسه زنده‌مانی غده اویارسلام ارغوانی در مزرعه پیاز بین تیمار شاهد عدم کاربرد آلایل ایزوتیوسیانات (سمت راست) و کاربرد علف‌کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات (دامینوس) (سمت چپ) (عکس از نویسنده)

Figure 1- Comparison of the viability of purple nutsedge tuber in onion field between weed infested treatment no use of allyl isothiocyanate (right), application of allyl isothiocyanate herbicide (left) (Photo by Author)

وزن تر و خشک اندام زیر زمینی اویارسلام (غده)


نتایج نشان‌دهنده اثر معنی‌دار علف‌کش‌های مختلف بر وزن تر و خشک اندام زیر زمینی (غده) اویارسلام ارغوانی در هر دو سال آزمایش بود ($P \leq 0.01$). نتایج مقایسه میانگین‌های وزن تر و خشک اندام زیر زمینی اویارسلام

ارغوانی نشان داد آفت‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات (دامینوس) کمترین وزن تر و خشک اوپارسلام ارغوانی در کرت‌های مورد آزمایش را موجب شد و به‌عنوان تیمار برتر آزمایش در کرت‌های پیاز انتخاب شد و با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری نداشت (جدول ۵). بیشترین وزن تر و خشک اندام زیر زمینی اوپارسلام در تیمار علف‌کش کلرتال دی متیل (داکتال) بود و با تیمار شاهد آلوده به علف هرز اختلاف معنی‌داری نداشت (جدول ۵). نتیجه بررسی تأثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی در کشت نشائی پاییزه استان هرمزگان نشان داد که علف‌کش اگزادیازون، تراکم و وزن خشک اوپارسلام ارغوانی را به ترتیب ۶۰ و ۵۹ درصد کاهش داد (Babaei nejad et al, 2017). بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام زیرزمینی (غده) از تیمار علف‌کشی داکتال در هر دو سال آزمایش مشاهده شد و با تیمار شاهد آلوده به علف هرز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (جدول ۵). میشل و همکاران (۲۰۰۵) بیان داشتند که تیمار علف‌کش گلایفوسیت زنده‌مانی و دوام غده اوپارسلام ارغوانی را در سویا و پنبه به ترتیب ۸۰ و ۶۵ درصد کاهش داد (Michael et al, 2005).

عملکرد پیاز

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین عملکرد پیاز از تیمار آفت‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات (دامینوس) طی دو سال آزمایش مشاهده شد و با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری نداشت (نمودار ۱). پایین‌ترین عملکرد با ۱۰/۹۰۴ – ۹/۹۹۴ تن در هکتار در تیمار علف‌کش داکتال به دست آمد که با تیمار شاهد آلوده به علف هرز ۸/۳۳۳ – ۷/۲۶۱ تن در هکتار طی دو سال آزمایش اختلاف معنی‌داری نداشت (نمودار ۱). نکته قابل توجه، میزان کاهش عملکرد در تیمار شاهد آلوده به علف هرز نسبت به تیمار شاهد عاری از علف هرز طی دو سال آزمایش بود، به‌طوری که درصد کاهش عملکرد طی دو سال موردبررسی در تیمار آلوده به علف هرز نسبت به تیمار عاری از علف هرز به ترتیب ۸۹/۵۳ و ۸۹/۷۱ درصد برآورد گردید (نمودار ۱). گزارش محققان دیگر حاکی از آن است که تراکم شدید اوپارسلام زرد با ۲۵۰ بوته در مترمربع سبب کاهش بیش از ۹۰ درصدی عملکرد سبزیجات در مزرعه پیاز (*Allium cepa* L.) و کلم (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*) شده است (Total et al., 2018). میزان عملکرد پیاز در تیمارهای علف‌کشی از جمله بنتازون + ام‌سی‌پی آ با ۶۲/۶۶۶ – ۶۳/۴۷۵ تن در هکتار، اگزادیازون با ۵۷/۷۱۴ – ۵۶/۷۱۰ تن در هکتار، گلایفوسیت + توفوردی با ۵۵/۲۸۵ – ۵۳/۶۶۶ تن در هکتار، آیوکسینل با ۵۳/۰۹۵ – ۵۳/۰۴۷ تن در هکتار طی دو سال آزمایش بود و همچنین اختلاف معنی‌داری بین علف‌کش گلایفوسیت + توفوردی و علف‌کش آیوکسینل از لحاظ عملکرد پیاز مشاهده نشد (نمودار ۱). افزایش عملکرد پیاز در تیمار علف‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات به دلیل کنترل کامل علف هرز اوپارسلام ارغوانی و عدم رقابت آن با پیاز ایجاد گردید. همچنین مشخص شد که

پس از علف کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات بیشترین عملکرد پیاز در تیمار علف کشی بنتازون + امسی پی آ تولید شد (نمودار ۱).




نمودار ۱- اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر عملکرد پیاز نشایی در منطقه جیرفت طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱). میانگین‌های با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار فاقد اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

Figure 1. The effect of different experimental treatments on transplanted onion yield in Jiroft region (2021- 2022). Means with at least one common letter based on the least significant difference test have no significant difference.

با توجه به کارایی بالای علف کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات (دامینوس) در کنترل علف هرز اوپارسلام ارغوانی و عملکرد بالای پیاز، می‌توان از این علف کش در زراعت پیاز برای کنترل این گونه علف هرز استفاده نمود. همچنین علف کش بنتازون + امسی پی آ توانست با کنترل مناسب علف هرز ارغوانی (۸۰ درصد) و عدم خسارت (۵ درصد) به محصول پیاز به‌عنوان دومین تیمار برتر در این آزمایش معرفی شود (جدول ۶). اما در خصوص کارایی علف کش بنتازون و خسارت آن به محصول پیاز نتایج ضدونقیضی ارائه گردید (Peachey et al. 2008; Smith, 2007)، به طوری که هرمن و همکاران (۲۰۱۷) بیان داشتند که کاربرد علف کش بنتازون در زراعت پیاز ضمن کنترل مناسب اوپارسلام زرد (*Cyperus esculentus*) خسارت جدی بر این محصول داشت (Herrmann et al, 2017). اما رفیعی و همکاران ضمن بیان کنترل قابل قبول علف هرز اوپارسلام بیان داشتند که این علف کش خسارت چندانی بر محصول پیاز ایجاد نکرد (Rafiee SarbijanNasab et al., 2020).

قتر گردن پیاز

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین مقدار قطر گردن پیاز متعلق به تیمار علف‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات (دامینوس) با ۳۰ و ۲۹/۷۶ میلی‌متر به ترتیب طی دو سال موردبررسی بود و با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (نمودار ۲)، در بین تیمارهای علف‌کشی کمترین میزان قطر گردن پیاز مربوط به تیمار علف‌کش داکتال با ۹ و ۹/۱۶ میلی‌متر بود که با تیمار شاهد آلوده به علف هرز با مقدار ۸/۵۳ و ۸/۱۳ میلی‌متر اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (نمودار ۲). افزایش قطر گردن پیاز نیز در تیمار علف‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات به دلیل کنترل کامل علف هرز اوپارسلام ارغوانی و عدم رقابت آن با پیاز ایجاد گردید. در بین تیمارهای علف‌کشی پس از علف‌کش زیستی آلیل ایزوتیوسیانات بیشترین مقدار قطر گردن در تیمار علف‌کشی بنتازون + ام‌سی‌پی آ به دست آمد (نمودار ۲). به نظر می‌رسد که کنترل مناسب اوپارسلام ارغوانی به علت تأثیر علف‌کش‌ها، سبب استفاده مناسب از عوامل محیطی و جذب مؤثر مواد غذایی شده است و در نتیجه قطر گردن پیاز افزایش یافته است (Rafiee Sarbijan Nasab *et al*, 2019). افزایش قطر گردن، سبب افزایش تولید ماده خشک و در نهایت افزایش عملکرد می‌شود. شرط لازم برای دستیابی به عملکرد بالا در پیاز، تولید ماده خشک بیشتر است زیرا ذخیره ماده خشک در برگ‌ها و کل ماده ذخیره‌شده در واحد سطح، از بهترین خصوصیات رشدی گیاه هست که بر روی عملکرد تأثیر می‌گذارد (Tel *et al*, 1996). رقابت شدید اوپارسلام ارغوانی در اوایل فصل، سایه‌اندازی کانوپی علف هرز، تراکم بالای اوپارسلام ارغوانی و عدم نفوذ نور را می‌توان از دلایل اصلی در کاهش قطر گردن پیاز دانست.




نمودار ۲- اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر قطر گردن پیاز در منطقه جیرفت طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰-۱۴۰۱). میانگین‌های با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار فاقد اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

Figure 2. The effect of different experimental treatments on neck diameter in Jiroft region (2021-2022). Means with at least one common letter based on the least significant difference test have no significant difference.

متوسط وزن پیاز

نتایج مقایسه میانگین نشان داد اثر علف‌کش‌های مورد آزمایش بر متوسط وزن پیاز طی دو سال آزمایش در سطح احتمال ($P \leq 0.01$) معنی‌دار بود. بر اساس نتایج نمودار (۳) بالاترین متوسط وزن پیاز در تیمار علف‌کشی آلیل ایزوتیوسیانات با ۱۹۳۶/۶۶ و ۱۹۶۳/۳۳ گرم به دست آمد که با تیمار شاهد عاری از علف هرز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (نمودار ۳)، درحالی‌که کمترین وزن پیاز از تیمار علف‌کشی داکتال با میانگین ۱۶۵ و ۱۴۰ گرم تولید شد و با تیمار شاهد آلوده به علف هرز ۸۰ و ۷۶/۶۶ گرم اختلاف معنی‌داری طی دو سال آزمایش مشاهده نشد (نمودار ۳). همچنین درصد کاهش وزن پیاز طی دو سال موردبررسی در تیمار شاهد آلوده به علف هرز نسبت به تیمار علف‌کشی آلیل ایزوتیوسیانات به ترتیب ۹۵/۸۳ و ۹۶/۰۹ درصد برآورد گردید (نمودار ۳). در همین راستا رفیعی و همکاران (۲۰۲۰) بیان داشتند که در تیمار وجین دستی و تیمارهای اگزادیازون به صورت پیش رویشی و بنتازون به صورت پس رویشی، بالاترین میانگین وزن پیاز به دست آمد (Rafiee SarbijanNasab *et al*, 2020). همچنین خوکار و همکاران (۲۰۰۶) گزارش دادند که بیشترین میانگین وزن پیاز در کشور پاکستان از تیمار وجین دستی و تیمار پندیمتالین حاصل گردید (Khokhar *et al*, 2006).



نمودار ۳- اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر متوسط وزن پیاز در منطقه جیرفت طی دو سال آزمایش (۱۴۰۰-۱۴۰۱). میانگین‌های با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار فاقد اختلاف معنی‌دار می‌باشند.

Figure 3. The effect of different experimental treatments on onion bulb weight in Jiroft region (2021-2022). Means with at least one common letter based on the least significant difference test have no significant difference.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد علف کش زیستی آلایل ایزوتیوسیانات (دامینوس) به صورت قبل از کاشت می تواند جایگاه خوبی در کنترل علف هرز اوپارسلام ارغوانی در زراعت پیاز داشته باشد، چراکه ضمن کنترل مؤثر اوپارسلام ارغوانی، هیچ گونه خسارتی بر گیاه پیاز در این تیمار مشاهده نگردید.

کارایی علف کش بنتازون + ام سی پی آ در کنترل اوپارسلام ارغوانی نیز قابل قبول بود، با توجه به این موضوع که کاربرد این تیمار نیز در مقایسه با علف کش آلایل ایزوتیوسیانات هزینه کمتری برای کشاورز در پی دارد، می تواند به عنوان یک علف کش مناسب برای محصول پیاز در جنوب استان کرمان مورد استفاده قرار گیرد. اما باید توجه داشت که بخش ام سی پی آ این علف کش، از گروه علف کشی فنوکسی ها بوده و احتمال خسارت زایی و گیاه سوزی بر محصول پیاز توسط این علف کش متحمل است، لذا رعایت دز توصیه شده از علف کش مدنظر باید در دستور کار قرار گیرد. کاربرد سایر تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش با توجه به گیاه سوزی شدید و کاهش عملکرد به هیچ عنوان در زراعت پیاز قابل توصیه نیستند (جدول ۶). اگرچه کشاورزان جنوب استان کرمان به صورت سنتی از علف کش داکتال برای کنترل اوپارسلام ارغوانی در مزارع پیاز استفاده می کنند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از عدم تأثیر علف کش داکتال در کنترل اوپارسلام ارغوانی بود. لذا کاربرد داکتال با هدف کنترل اوپارسلام ارغوانی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در ارتباط با علف هرز اوپارسلام ارغوانی در شرایط آب و هوایی جنوب استان کرمان صورت گرفته است، لذا توصیه می شود برای شناخت دقیق تر این گیاه در شرایط آب و هوایی ذکر شده جهت دستیابی به کنترل تلفیقی در دستور کار قرار گیرد.

Reference

- Alirzaev, D.G. 1989. Herbicides for onion weeding. *Zashchita Rastenii*. 12: 32-33.
- Anonymous, 2021. Statistics on agriculture (2019-2020 Crop year). Ministry of Jihad-e-agriculture, department of planning & economic affairs, information and communication technol center. Volume 1. page 75. (In Persian)
- Babaei Nejad, B., Rostami M. and Dadkhah, A.R. 2017. The effect of mechanical and chemical weed control on the yield of onion (*Allium cepa* L.) seedlings cultivated fall in Hormozgan province. *Weed Search J*. 8:79-91.
- Bangarwa, S.K., Norsworthy, J.K., Gbur, E.E., Zhang, J. and Habtom, T. 2011. Allyl isothiocyanate: A methyl bromide replacement in polyethylene mulched bell pepper. *Weed Technol*. 25:90-96.
- Bond, W. and Burston, S. 1996. Timing the removal of weeds from drilled salad onions to prevent crop losses. *Crop Prot*. 15: 205-211.
- Daneshvar, M. 2006. Vegetable production. (5th Ed.) Shahid Chamran University. Pp: 461. (In Persian)
- Devkota, P. and Norsworthy, J.K. 2014. Allyl isothiocyanate and metham sodium as methyl bromide alternatives for weed control in plasticulture tomato. *Weed Technol*. 28:377-384.
- El-Metwally, I. and Shalaby, S. 2019. Herbicidal efficacy of some natural products and mulching compared to herbicides for weed control in onion fields. *J Plant Prot Res*. 59:479-486.

FAO Statistics, 2021. International Year of Fruit and Vegetable

- Gilardi, G., Minuto, A., Minuto, G., Garibaldi, A. and Gullino, M.L. 2000. Activity of natural soil fumigants against soilborne pathogens. *Colt. Prot.* 29:71–76.
- Herrmann, Ch., Margaret M., Goll A., Phillippo C.J. and Zandstra, B.H. 2017. Post emergence Weed Control in Onion with Bentazon, Flumioxazin, and Oxyfluorfen. *Weed Sci. Soc. Am* 1-12.
- Holm, L.G., Plucknett, D.L., Pancho, J.V. and Herberger, J.P. 1977. The world's worst weeds: distribution and biology. Honolulu. University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA. 609p.
- Isagro, 2016. Dominus label. Dec. 2018. [https:// www.isagro.com/static/upload/10-/10-dominus](https://www.isagro.com/static/upload/10-/10-dominus).
- Jialin, Yu., Gary E.V. and Nathan, S.B. 2019. Evaluation of allyl Isothiocyanate as soil fumigant for tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) production. *Plant Dis.* 103: 2764-2770.
- Khalghani, J. 2019. Program and Strategic Document for the Development of Plant Medicinal Research - Country, Strategic Rese Program. (In Persian)
- Khokhar, K.M., Mahmood T., Shakeel M. and Farooq Chaudhry, M. 2006. Evaluation of integrated weed management practices for onion in Pakistan. *Crop Prot.* 25: 968–972.
- Kropff, M.J. and Spitters, C.T.J. 1991. A simple model of crop loss by weed competition from early observation of the weeds. *Weed Res.* 31: 97-105.
- Lebedinskii, I.V. 1994. Herbicides on onions. *Zashchita Rastenii.* 6:31.
- Mburu, D.N., Drennan, D.S.H. and Michieka R.W. 1997. Weed control in onion using pre-emergence herbicides applied at low doses plus supplementary hand-weeding, p. 187-194. *In: Proceedings of the Weed Sci Society for East Africa*
- Michael, W., Edenfield, B., Brecke, J., Daniel, L., Joan, C., Dusky, A. and Shilling D.G. 2005. Purple Nutsedge (*Cyperus rotundus*) Control with Glyphosate in Soybean and Cotton. *Weed Technol.* 19: 947–953.
- Minz, A., Horo P, Barla S, Upasani, R.R. and Rajak, R. 2018. Herbicides effect on growth, yield and quality of onion. *Ind J Weed Sci.* 50:186–188.
- Miles, J.E., Kawabata, O. and Nishimoto, R.K. 2002. Modelling purple nutsedge sprouting under soil solarization. *Weed Sci.* 50:64–71.
- Mishra, H.P., Singh, S.J. and Mishra, S.S. 1986. Effect of herbicides on weed control efficiency and production potential in onion (*Allium cepa* L.). *Indian J. Weed Sci.* 18: 187-191.
- Noble, R.R., Harvey, S.G. and Sams. C.E. 2002. Toxicity of Indian mustard and allyl isothiocyanates to masked chafer beetle larvae. *Plant Health Prog.* doi: 10.1094/PHP-2002-0610-01-RS
- Peachey, E., Felix, J. and Boydston, R.A. 2008. Dry bulb onion tolerance to sequential applications of bentazon applied to control yellow nutsedge (*Cyperus esculentus*) in the Pacific Northwest. *Proc. Weed sci .Soc. Am* 48:33.
- Qasem, J.R. 2006. Chemical weed control in seedbed sown onion (*Allium cepa* L.). *Crop Prot.* 25:618–622.
- Rafiee sarbijan nasab, F., Mohammaddoust Chamanabad H. R., Aein, A. and Alebrahim, M. T. 2019. Evaluation of *Cyperus rotundus* management practices in Jiroft onion fields, Asgheri, A. *Iranian J of Weed Sci .Vol 15, No 2, 55-63 (In Persian)*
- Rafiee sarbijan nasab, F., Mohammaddoust Chamanabad H. R., Aein, A. and Alebrahim M. T. 2020. Evaluation of Chemical Control of Purple Nutsedge (*Cyperus rotundus* L.) in Onion (*Allium cepa* L.) Fields in South Kerman. *Journal of Plant Prot Vol. 34, No. 1, P. 125-136. (In Persian)*

- Rameshwar, G., Sharma, V., Vishal, D. and Singh, G. 2001. Crop-weed competition study in onion (*Allium cepa* L.) under dry temperate high hills condition of Himachal Pradesh. *Indian Journal of Weed Sci*, 33, 168–170
- Ransom, C. V., Rice, C. A. and Ishida, J. K. 2004. Yellow nutsedge competition in dry bulb onion production. Oregon State University, Malheur Experiment Station Special Report 1055: 97-99.
- Roozkhosh, M., Eslami, S.V. and Jami Al-Ahmadi, M. 2017. Effect of plastic mulch and burial depth on purple nutsedge (*Cyperus rotundus*) emergence and growth. *Archives Agronomy and Soil Science*, 63:1454–1464
- Sankar, V., Thangasamy, A. and Lawande, K. E. 2015. Weed management studies in onion (*Allium cepa* L.) Cv N2- 4-1 during Rabi season. *International Journal of Tropic Agric(IJTDH)*. 33 (2): 627-631.
- Smith, R. 2007. Dry Bulb Onion Weed Control Studies. Monterey, CA: University of California Cooperative Extension.
- Sandral, G.A. Dear, B.S., Pratley, J.E. and Cullis, B.R. 1997. Herbicide dose rate response curve in subterranean clover determined by a bioassay. *Aust. J. Exp. Agric.* 37:67-74.
- Tel, F., Scaife, A. and Aikman, D.P. 1996. Growth of lettuce, onion, and red beet. 2: Growth modeling. *Ann. Bot.* 78:129-143
- Total, R., Collet, L. Heyer, J. and Keller, M. 2018. Yield losses in vegetable and arable crops caused by yellow nutsedge (*Cyperus esculentus*) in farmers fields in Switzerland. **Proceedings 28th German Conference on Weed Biology and Weed control, February 27 - March 1. Braunschweig, Germany**
- Vig, A.P., Rampal, G., Thind, T.S., and Arora, S. 2009. Bio-protective effects of glucosinolates- A review. *LWT-Food. Sci. Technol.* 42: 1561-1572.
- Williams, K.E., Williams, B.J. and Burns, A.B. 2005. Penoxsulam a new herbicide for weed management in rice. Annual report LSU AgCenter.
- Wu, H., Wang, C.J., Bian, X.W., Zeng, S.Y., Lin, K.C. Wu, B. and Zhang, X. 2011. Nematicidal efficacy of isothiocyanates against root-knot nematode *Meloidogyne javanica* in cucumber. *Crop Prot.* 30:33–37.
- Zand, E., Nezamabadi, N., Baghestani, MA. Shimi, P. and Mousavi, SK. 2019. Guide to chemical control of Iranian Weeds (6th edition), Mashhad Academic Jihad Publications. Pp.216 (In Persian)

The effect of different herbicides on weed control of purple nutsedge (*Cypreus rotundus* L.) in Onion (*Alium cepa* L.)

Abstract:

Purple nutsedge (*Cyperus rotundus* L.) is one of the most problematic weeds in onion (*Allium cepa* L.) fields in southern Kerman, and so far is no registered herbicide to control purple nutsedge not reported in onion. The experimental design was a randomized complete block design with nine treatments and three replications in Jiroft Agro-Industrial Farms in onion. The treatments were included allyl isothiocyanate (dominus) and Dimethyl tetrachloroterephthalate (Dacthal) as pre planting herbicides, Bentazone + MCPA (Basagran M60), Penoxsulam (Rezlan), Ioxynil (Totril), Oxadiazon (Ronstar), Glyphosate + 2,4-D + MCPA (Roundup + U, 46 Combi fluid) as post emergence herbicides as well as Weed free control and weed infested control by transplanting method was evaluated. The results showed that there was a significant difference between the treatments on traits of stem density, tuber density, dry weight of above and below ground organs, neck diameter, average onion weight and yield of onion. **Among the tested treatments, allyl isothiocyanate herbicide with 70.661- 70.542 tons ha⁻¹ was selected as the best experimental treatment in during experment two years.** weed infested treatment with 8.333 tons ha⁻¹ and 7.261 tons ha⁻¹ caused 89.53% and 89.73% reduction in onion yield compared to weed free condition during the first and second year, respectively. **Therefore, the density and dry weight of purple nutsedge reduced 100% with application allyl isothiocyanate (280 L. ha⁻¹ dominus).**

Keywords: Onion, Sedge, Yield, Bioherbicide, Transplanting